

**סוניטיניב תרו 12.5 מ"ג**  
**סוניטיניב תרו 25 מ"ג**  
**סוניטיניב תרו 37.5 מ"ג**  
**סוניטיניב תרו 50 מ"ג**  
**כמוסות קשות**

**חומר פעיל**

סוניטיניב 12.5 מ"ג, 25 מ"ג, 37.5 מ"ג, 50 מ"ג      sunitinib 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

תרופה זו מיועדת למבוגרים מעל גיל 18.

**1. למה מיועדת התרופה?**

- לטיפול בסרטן רקמת חיבור של מערכת העיכול (Gastrointestinal stromal tumor – GIST) לאחר התקדמות המחלה בעת טיפול באימטיניב מסילט או במקרה של אי-סבילות לאימטיניב מסילט.
- לטיפול בסרטן גרורתי של תאי כליה (Advanced renal cell carcinoma – aRCC)
- לטיפול בגידול ממין נורואנדוקריני של הלב, גרורתי או שלא ניתן לנתח (Pancreatic – pNET – neuroendocrine tumors).

**קבוצה תרפויטית:**

מעכב מכוון של רצפטור טירוזין קינאז.

**2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול בסוניטיניב תרו, ספר לרופא אם:**

- **יש לך לחץ דם גבוה.** סוניטיניב תרו יכולה לעלות את לחץ הדם. ייתכן שהרופא יבדוק את לחץ הדם במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו וייתן לך טיפול בתרופות להורדת לחץ דם במידת הצורך.
- **יש לך או היו לך מחלת דם, בעיות דם או חבורות.** טיפול עם סוניטיניב תרו יכול להעלות את הסיכון לדימום או לגרום לשינויים במספר של תאים מסוימים בדם אשר יכול לגרום לאנמיה או להשפיע על יכולת הקרישה של הדם. אם אתה לוקח וארפארין או אצנוקומרול, תרופות לדילול דם אשר מונעות מהדם להיקרש, ייתכן סיכון מוגבר יותר לדימום. ספר לרופא אם יש לך דימומים במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו.
- **יש לך בעיות בלב.** סוניטיניב תרו יכולה לגרום לבעיות בלב. ספר לרופא אם אתה מרגיש עייפות מוגברת, קוצר נשימה או נפחות ברגליים ובקרסוליים.

- **יש לך שינויים לא תקינים בקצב הלב.** סוניטיניב תרו יכולה לגרום להפרעות בקצב הלב. ייתכן שהרופא יבצע אק"ג על מנת להעריך את הבעיות האלה במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו. ספר לרופא אם אתה מרגיש סחרחורת, תחושת עילפון או פעימות לב לא תקינות במהלך נטילת סוניטיניב תרו.
- **היו לך לאחרונה בעיות עם קרישי דם בוורידים או בעורקים (סוגים של כלי דם), כולל אירוע מוחי, התקף לב, תסחיף או פקקת.** פנה מייד לרופא אם יש לך תסמינים כגון כאב בחזה או לחץ, כאב בזרועות, בגב, בצוואר או בלסת, קוצר נשימה, נימול או חולשה בצד אחד של הגוף, קושי בדיבור, כאב ראש או סחרחורת במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו.
- **יש לך או היה לך נזק בכלי הדם הקטנים, תופעה הקרויה מיקרואנגיופתיה תרומבוטית, TMA** (thrombotic microangiopathy). ספר לרופא אם אתה מפתח חום, עייפות, חבורות, דימום, נפיחות, בלבול, איבוד ראייה ופרקוסים.
- **יש לך או הייתה לך מפרצת** (הרחבה והיחלשות של דופן כלי הדם) או קרע בדופן כלי הדם.
- **יש לך בעיות בבלוטת התריס.** סוניטיניב תרו יכולה לגרום לבעיות בבלוטת התריס. ספר לרופא אם אתה מתעייף ביתר קלות, בדרך כלל מרגיש שקר לך יותר מאשר אנשים אחרים או שהקול שלך נהיה עמוק יותר במהלך נטילת סוניטיניב תרו. יש לבדוק את תפקוד בלוטת התריס לפני ובמהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו. אם בלוטת התריס לא מייצרת מספיק הורמוני בלוטת תריס, ייתכן שתקבל טיפול עם תחליף הורמונלי להורמוני הבלוטה.
- **יש לך או היו לך הפרעות בבלבב או בכיס המרה.** ספר לרופא אם אתה מפתח אחד מהתסמינים או הסימנים הבאים: כאבים באזור הבטן (בטן עליונה), בחילות, הקאות וחום. זה יכול להיגרם כתוצאה מדלקת של הבלבב או כיס המרה.
- **יש לך או היו לך בעיות בכבד.** ספר לרופא אם אתה מפתח אחד מהתסמינים או הסימנים הבאים של בעיות בכבד במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו: גרד, עיניים צהובות או עור צהוב, שתן כהה וכאב או אי נוחות בחלק הימני העליון של אזור הבטן. הרופא יבצע בדיקות דם לבדיקת תפקודי הכבד לפני ומהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו ולפי הצורך הקליני.
- **יש לך או היו לך בעיות בכליות.** הרופא ינטר את תפקודי הכליות.
- **אתה עתיד לעבור או עברת לאחרונה ניתוח.** סוניטיניב תרו יכולה להשפיע על אופן ריפוי הפצעים. בדרך כלל אתה תפסיק את הטיפול בסוניטיניב תרו אם יש לך ניתוח. הרופא יחליט מתי להתחיל שוב נטילת סוניטיניב תרו.
- **ייתכן שיומלץ לך לעבור בדיקה דנטלית לפני התחלת הטיפול עם סוניטיניב תרו.**
  - ספר מייד לרופא ולרופא שיניים אם יש לך או היה לך כאב בפה, בשיניים ו/או בלסת, נפיחות או פצעים בפה, נימול או תחושת כבדות בלסת או תחושת התנדנדות שן.
  - אם אתה צריך לעבור טיפול דנטלי פולשני או ניתוח דנטלי ספר לרופא שיניים שאתה מטופל עם סוניטיניב תרו, במיוחד אם אתה גם לוקח או לקחת ביספוספונטים במתן ורידי. ביספוספונטים הן תרופות המשמשות למניעת סיבוכים בעצם אשר ייתכן שניתנו למצב רפואי אחר.
- **יש לך או היו לך הפרעות עוריות או תת עוריות.** במהלך נטילת סוניטיניב תרו פיודרמה גנגרנוזום ( pyoderma gangrenosum כיב עורי כואב) או חיתולית נימקית (necrotizing fasciitis, זיהום של העור/רקמות רכות אשר מתפשט במהירות ויכול להיות מסכן חיים) יכולות להופיע. יש לפנות מייד לרופא אם מופיעים תסמינים של זיהום סביב עור פצוע, כולל חום, כאב, אדמומיות, נפיחות או ניקוז מוגלה או דם. אירוע זה בדרך כלל הפיך לאחר הפסקת סוניטיניב תרו. פריחות עוריות חמורות (תסמונת סטיבנס ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס, אריתמה מולטיפורמה) דווחו עם השימוש בסוניטיניב תרו, מופיעות תחילה ככתמים אדומים דמויי מטרה או טלאים מעגליים לעיתים קרובות עם שלפוחיות מרכזיות בגו. הפריחה עשויה להתקדם לשלפוחיות ממושטות או קילוף של העור ויכולה להיות מסכנת חיים. פנה מייד לרופא אם אתה מפתח פריחה או תסמינים אלה.
- **יש לך או היו לך פרקוסים.** ספר לרופא בהקדם האפשרי אם יש לך לחץ דם גבוה, כאב ראש או אובדן ראייה.
- **יש לך סוכרת.** יש לבדוק את רמות הסוכר בדם בחולים סוכרתיים באופן קבוע על מנת להעריך אם יש להתאים את המינון של התרופות לטיפול בסוכרת כדי למזער את הסיכון לרמת סוכר נמוכה בדם. יש לעדכן את הרופא בהקדם האפשרי אם אתה חווה סימנים ותסמינים של רמות נמוכות של סוכר בדם (עייפות, דפיקות לב, הזעה, רעב ואובדן הכרה).

## ילדים ומתבגרים

סוניטיניב תרו אינה מיועדת לאנשים מתחת לגיל 18.

## תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות שבשילוב עם סוניטיניב תרו מעלות את ריכוזה בדם:

קטוקונאזול, איטראקונאזול (משמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים), אריתרומיצין, קלריתרומיצין (אנטיביוטיקות), ריטונאביר (משמשת לטיפול בנגיף ה-HIV).

תרופות שבשילוב עם סוניטיניב תרו מורידות את ריכוזה בדם:

דקסמטזון (קורטיקוסטרואיד המשמש לטיפול במצבים שונים כמו אלרגיה/הפרעות נשימה או מחלות עור), פניטואין, קרבמזפין, פנוברביטל (משמשות לטיפול באפילפסיה ומחלות נוירולוגיות אחרות), ריפאמפין (אנטיביוטיקה), הצמח היפריקום (St. John's wort) (משמש לטיפול בדיכאון וחרדה).  
וארפארין (לטיפול בקרישיות יתר) - יש להיות במעקב רפואי אחר רמות מדדי קרישת דם.  
תרופות להורדת כולסטרול ממשפחת הסטטינים ותרופות ממשפחת הביספוספונטים (כגון אלנדרונט) במתן תוך-ורידי טרם או במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו.

## שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרופה עם או בלי אוכל. יש לבלוע את התרופה עם מעט מים. אין לשתות מיץ אשכוליות או לאכול אשכוליות בזמן הטיפול בתרופה. צריכת אשכוליות עלולה לשנות את ריכוז התרופה בגוף.

## היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שיתכן שאת בהיריון או מתכננת להרות, פני לרופא לקבלת ייעוץ לפני נטילת התרופה. אם את עלולה להרות, יש להשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו. יש ליידע את הרופא אם את מניקה. אין להניק במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו.

## נהיגה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות ולגרום לסחרחורת וישנוניות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות.

## מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן לכל כמסה, כלומר נחשבת "נטולת נתרן".

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.  
מומלץ ליטול את התרופה באותה שעה בכל יום.  
**אין לעבור על המנה המומלצת.**  
אין מידע לגבי פתיחה ופיזור תוכן הכמסה.

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,** פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש,** יש לדלג על המנה ולקחת את המנה הבאה ביום למוחרת בשעה הקבועה, אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה!

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה.** הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסוניטיניב תרו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. יש לפנות מייד לרופא אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות (ראה גם פרק 2 סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"):

**בעיות בלב.** ספר לרופא אם אתה מרגיש עייפות מוגברת, קוצר נשימה או שיש לך נפיחות ברגליים ובקרסוליים. אלה יכולים להיות תסמינים של בעיות בלב אשר יכולות לכלול אי-ספיקת לב ובעיות בשריר הלב (קרדיומיופתיה).  
**בעיות בריאות או בנשימה.** ספר לרופא אם אתה מפתח שיעול, כאב בחזה, הופעה פתאומית של קוצר נשימה או שיעול דמי. אלה עשויים להיות תסמינים של מצב הנקרא תסחיף ריאתי המתרחש כאשר קרישי דם נודדים לריאות.  
**הפרעות כליתיות.** ספר לרופא אם אתה חווה תדירות משתנה או היעדר מתן שתן שעלולים להיות תסמינים של אי-ספיקת כליות.

**דימום.** ספר לרופא אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים או דימום חמור במהלך הטיפול עם סוניטיניב תרו: בטן כואבת ונפוחה, הקאה דמית, צואה שחורה דביקה, דם בשתן, כאב ראש או שינוי במצב הנפשי, שיעול דמי או כיח דמי מהריאות או דרכי הנשימה.

**הרס הגידול המוביל לחור במעי.** ספר לרופא אם יש לך כאב בטן חמור, חום, בחילה, הקאות, דם בצואה או שינויים ביציאות.

#### תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד - תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך 10: שלשול, עצירות, כאב בטן/נפיחות, בחילה, אובדן תיאבון/ירידה בתיאבון, סחרחורת, חום, דלקות ו/או פצעים ו/או יובש בפה, הפרעות עיכול, הקאות, גירויים או כאבים בפה, שינויים בטעם, פריחה אלרגית חריפה, שינוי צבע עור/הצהבת עור, פיגמנטציה על העור, שינוי צבע שיער, עייפות קיצונית, חולשה, כאב ראש, נדודי שינה, כאבי גב, כאבי מפרקים, כאבים בגפיים, שיעול, ירידה בפעילות בלוטת התריס, ירידה ברמת הטסיות, תאי הדם האדומים ו/או הלבנים, נפיחות הנגרמת עקב נוזלים תחת העור או סביב העיניים, דימום מהאף, קוצר נשימה, לחץ דם גבוה, פריחה בכפות הידיים וכפות הרגליים, פריחה, יובש של העור.

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10:

קרישי דם בכלי הדם, מחסור באספקת דם לשריר הלב עקב היצרות או חסימה בעורקים הכליליים, כאב בחזה, ירידה בכמות הדם המוזרקת מהלב בכל פעימה, אצירת נוזלים כולל סביב הריאות, תחושת חולי דמוית שפעת, זיהומים, סיבוך של זיהום חמור (זיהום הנמצא בדם) אשר יכול לגרום לנזק לרקמה, לכשל מערכתי ולמוות. ירידה ברמת הסוכר בדם (ראה פרק 2 סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"), דיכאון, טחורים, כאבים בחלחולת, דימום מהחניכיים, קושי או אי-יכולת לבלוע, כאבים ו/או תחושת צריבה בלשון, דלקת בושט ובריריות, גזים בקיבה או במעי, ירידה במשקל, כאבי שרירים ועצמות, חולשת שרירים, עייפות שרירים, התכווצות שרירים פתאומית (ספאזם), יובש באף, גודש באף, דמיעת יתר, תחושה לא רגילה בעור, התקלפות העור ודלקת, שלפוחיות על גבי העור, גרד, אקנה, התייבשות, גלי חום, צבע חריג לשתן, שינוי בצבע הציפורניים, נשירת שיער, רמות גבוהות של חומצה אורית בדם, אובדן חלבונים בשתן (יכול להוביל לנפיחות), תוצאות חריגות בבדיקות דם כולל רמת אנזימי כבד ולבלב, תחושה לא רגילה בגפיים, עלייה/ירידה בתחושתיות, בעיקר למגע, צרבת, צמרמורת.

תופעות לוואי המופיעות שאינן שכיחות – תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 100:

זיהום מסכן חיים ברקמות רכות כולל באזורים אנוגינטיים (ראה פרק 2 סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"). אירוע מוחי, התקף לב הנגרם עקב ירידה או הפרעה באספקת דם ללב, שינויים בפעילות החשמלית או הפרעה בקצב הלב, נוזלים סביב הלב (pericardial effusion), אי-ספיקת כבד, כאב בטן עקב דלקת בלב. הרס הגידול הגורם לניקוב של המעי, דלקת (אדמומיות ונפיחות) בכיס המרה (עם או בלי אבנים בכיס המרה), מעבר לא תקין בין חללי הגוף או העור. כאב בפה, בשיניים ו/או בלסת, נפיחות או פצעים בפה, נימול או תחושת כבדות בלסת או תחושת התנדנדות שן, יכולים להיות סימנים ותסמינים של נזק בעצם הלסת (ראה בפרק 2 סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"). ייצור יתר של הורמוני בלוטת התריס (תירוואיד) המעלים את כמות האנרגיה שהגוף צורך במנוחה, קושי בהחלמת פצעים לאחר ניתוח, עלייה ברמת האנזים בדם (קראטין פוספוקינאז) מהשריר, תגובה חריפה לאלרגנים כולל נזלת אלרגית (קדחת השחת), פריחה בעור, גרד בעור, סרפדת, נפיחות של חלקים בגוף וקשיי נשימה. דלקת של המעי הגס (קוליטיס, קוליטיס איסכמית).

תופעות לוואי נדירות – תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 1,000: תגובות חמורות בעור ו/או בריריות (תסמונת "סטיבנס-ג'ונסון", טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס, אריתמה מולטיפורמה), כיב עורי כואב (פיודרמה גנגרנוזום), תמס שריר (רבדומיוליזיס) אשר יכול להוביל לבעיות כליה. תמס עקב גידול סרטני: סיבוכים מטבוליים אשר ייתכן שיתרחשו במהלך הטיפול בסרטן, עקב פירוק תאים סרטניים. תופעות הנכללות בקבוצה זו הן בחילה, קוצר נשימה, קצב לב לא סדיר, התכווצות שרירים, פרכוסים, עייפות ושתן עכור המלווים בשינויים בתוצאות בדיקות דם (רמות גבוהות של אשלגן, חומצה אורית ופוספט ורמות נמוכות של סידן בדם) אשר יכולים להוביל לשינויים בתפקודי הכליה ואי-ספיקת כליות, הפטיטיס – דלקת בכבד, שינויים אבנורמליים במוח אשר יכולים לגרום לאוסף של תסמינים כולל כאבי ראש, בלבול, פרכוסים ואובדן ראייה. דלקת בבלוטת התריס, נזק בכלי הדם הקטנים, תופעה הקרויה TMA (thrombotic microangiopathy).

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות מהמידע הקיים): הרחבה והיחלשות של דופן כלי הדם או קרע בדופן כלי הדם (מפרצת ודיסקציה של העורקים), חוסר אנרגיה, בלבול, ישנוניות, חוסר הכרה/תרדמת – תסמינים אלה יכולים להיות סימנים של רעילות מוחית הנגרמת על ידי רמות גבוהות של אמוניה בדם (hyperammonaemic encephalopathy).

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
  - אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון**
- יש לאחסן את התרופה מתחת ל-25°C.

## 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

סוניטיניב 12.5 מ"ג:

Cellulose microcrystalline, mannitol, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hard gelatin capsule shell: red iron oxide, titanium dioxide, gelatin and printing white ink (containing shellac, titanium dioxide, propylene glycol).

סוניטיניב 25 מ"ג:

Cellulose microcrystalline, mannitol, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hard gelatin capsule shell: black iron oxide, red iron oxide, yellow iron oxide, titanium dioxide, gelatin, and printing white ink (containing shellac, titanium dioxide, propylene glycol).

סוניטיניב 37.5 מ"ג:

Cellulose microcrystalline, mannitol, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hard gelatin capsule shell: yellow iron oxide, titanium dioxide, gelatin, and printing black ink (containing shellac, black iron oxide, propylene glycol, ammonium hydroxide).

סוניטיניב 50 מ"ג:

Cellulose microcrystalline, mannitol, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hard gelatin capsule shell: black iron oxide, red iron oxide, yellow iron oxide, titanium dioxide, gelatin, and printing white ink (containing shellac, titanium dioxide, propylene glycol).

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

סוניטיניב תרו 12.5 מ"ג: כמוסה בצבע כתום שעליה מוטבע בדיו לבן "12.5 mg", מכילה גרגירים בצבע צהוב-כתום.  
סוניטיניב תרו 25 מ"ג: כמוסה בעלת כיפה בצבע קרמל וגוף בצבע כתום שעליו מוטבע בדיו לבן "25 mg", מכילה גרגירים בצבע צהוב-כתום.  
סוניטיניב תרו 37.5 מ"ג: כמוסה בצבע צהוב שעליה מוטבע בדיו שחור "37.5 mg", מכילה גרגירים בצבע צהוב-כתום.  
סוניטיניב תרו 50 מ"ג: כמוסה בצבע קרמל שעליה מוטבע בדיו לבן "50 mg", מכילה גרגירים בצבע צהוב-כתום.

התכשיר משווק באריזת בליסטר המכילה 28 כמוסות.

**שם היבואן, בעל הרישום וכתובתו:** תרו אינטרנשיונל בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761

נערך ביוני 2024.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

סוניטיניב תרו 12.5 מ"ג: 167-94-36017-00

סוניטיניב תרו 25 מ"ג: 167-95-36030-00

סוניטיניב תרו 37.5 מ"ג: 167-96-36031-00

סוניטיניב תרו 50 מ"ג: 167-97-36032-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.