

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986 תרופה זו משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טנובמד אינובמד

טבליות מצופות

חומרים פעילים:

כל טבלייה מצופה מכילת:

אמטריציטאבין (emtricitabine) 200 מ"ג
טנופוביר דיסופרוקסיל (tenofovir disoproxil) 245 מ"ג
(מקביל ל-300 מ"ג טנופוביר דיסופרוקסיל נומרמא [tenofovir disoproxil fumarate])

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוסף". כמו כן, ראה "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בסעיף 2 של עלון זה.

קריא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה להם כי מצעלם ההרפואי דומה.

התרופה מיועדת למבוגרים מעל גיל 18.

בנוסף לעלון, לטנובמד אינובמד קיימת חוברת מידע בטיחותי למטופל. חוברת זו מכילה מידע בטיחותי חשוב, בשלך לפע, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בטנובמד אינובמד ולהפעל על פניו. יש לעיין בחוברת מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את החוברת לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

טנובמד אינובמד בני 18 שנים ועולה, בשילוב עם תרופות אנטירטרוויראליות נוספות.

קבוצה תרפויטית: מעכבי טרנסקריפטאז הופכי נוגדי נגיפים.

טנובמד אינובמד מכילה שני חומרים פעילים, אמטריציטאבין וטנופוביר דיסופרוקסיל. שני חומרים פעילים אלה הם תרופות נוגדות נגיפי רטרו המשמשות לטיפול ביהודה ב- HIV. אמטריציטאבין היא מעכב טרנסקריפטאז הופכי נוקלאוטידי וטנופוביר היא מעכב טרנסקריפטאז הופכי נוקלאוטידי. עם זאת, שתי התרופות מוכרות בדרך כלל כמעכבי טרנסקריפטאז הופכי נוקלאוטידי (NRTIs) ופועלות היא הפרעה לפעילות הרגילה של אנזים (טרנסקריפטאז הופכי) אשר חיוני לתהליך השכפול של נגיף ה- HIV.

• **טנובמד אינובמד משמשת לטיפול ביהוהם הכשל הנגיפי 1 (HIV-1), למבוגרים בני 18 שנים ומעלה.**

- יש להשתמש תמיד בטנובמד אינובמד בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול ביהוהם ב- HIV.

- ניתן לטול טנובמד אינובמד במקום ליטול בופרד אמטריציטאבין וטנופוביר דיסופרוקסיל כאשר מדובר באותם מינונים.

תרופה זו אינה מרפאת זיהום ב- HIV. בעת נטילת טנובמד אינובמד אתה עדיין עלול לפתח זיהומים או מחלות חמורות הקשורים לזיהום ב- HIV.

• **טנובמד אינובמד גם משמשת להפחתת הסיכון להדבקות ב- HIV-1 במבוגרים,** כאשר נטולים את התרופה כטיפול יומי, בשילוב עם התנהגות מינית בטוחה:

ראה סעיף 2, רשימת אמצעי הזהירות שיש נקוט כנגד הדבקות ב- HIV-1.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה אלרגי** לאמטריציטאבין, טנופוביר, טנופוביר דיסופרוקסיל, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (רשומים בסעיף 6 ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").

אם אחד הדברים הללו חל לגביך, עליך לספר על כך לרופא מיד.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש בטנובמד אינובמד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות בטנובמד אינובמד יכולה לעזור לך בהפחתת הסיכון בהדבקות ב- HIV רק אם טרם נדבקת.

לפני תחילת הטיפול בטנובמד אינובמד, עליך לא להיות נשא של HIV על מנת להפחית את הסיכון להדבקות ב- HIV. עליך להיבדק על מנת לוודא שאינך כבר נשא של HIV. אל תיטול טנובמד אינובמד להפחתת הסיכון אלא כי ודאת כי אינך נשא של HIV. נשאי HIV חייבים לטיל טנובמד אינובמד בשילוב עם תרופות אחרות.

• **בדיקות רבות לנשאות HIV עלולות שלא לאבחן הדקה שהתרחשה לאחרונה.** במידה והגן חולה במחלה דמדית שפעת, ייתכן כי נדבקת לאחרונה ב- HIV.

הסימנים היכולים להעיד על הדבקות ב- HIV הינם:

- עייפות
- חום
- כאבי שרירים או מפרקים
- כאבי ראש
- הקאות או לשלולים
- פריחה
- זיעת לילה
- בלוטות לימפה מוגדלות בצוואר או במפשעה

דווח לרופא שלך על כל מחלה דמויית שפעת – בין אם במהלך החודש הקודם להתחלת הטיפול בטנובמד אינובמד או בכל עת במהלך נטילת טנובמד אינובמד.

אזהרות ואמצעי זהירות

בזמן נטילת טנובמד אינובמד על מנת להקטין את הסיכון בהדבקות ב- HIV:

טול טנובמד אינובמד כל יום **על מנת להקטין את הסיכון, לא רק שנאתה חושב שאתה בסיכון להדבקות ב- HIV.** אל תחסיר אף מנה של טנובמד אינובמד, או תפסיק לטיל את התרופה. החסרה של מנה עלולה להגדיל את הסיכון שלך להדבק ב- HIV.

• הבדק באופן שיגרתי ל- HIV.

דווח מיד לרופא אם אתה חושש שנדבקת ב- HIV. ייתכן שהרופא יערך בדיקות נוספות על מנת לוודא כי אינך נשא של HIV.

• **נטילת טנובמד אינובמד בלבד אינה מבטיחה אי הדבקות בניגף.** לפיכך עליך לנקוט בפעולות הבאות:

- הקפד על התנהגות מינית בטוחה. השתמש בקונדום על מנת לצמצם את המגע עם נוזל הורע, נוזלים וגנינאליים אם דם.

- אל תחלוק ציוד אישי היכול להכיל דם או נוזלי גוף, כגון מברשות שיניים וסכני גילוח.

- אל תחלוק או תעשה שימוש חוזר במחטים או אביזרי הזרקה או ציוד רפואי.

- היבדק למחלות נוספות המועברות במגע מיני, כמו געבת וזיבה. זיהומים אלה מאפשרים שיתוף קלות לנגיף ה- HIV להדביק אותך.

היוועץ ברופאך **אם יש לך שאלות נוספות על איך למנוע הדבקות ב- HIV או לגבי הדבקת אנשים אחרים ב- HIV.**

בזמן נטילת טנובמד אינובמד לטיפול ב- HIV או להפחתת הסיכון להדבק ב- HIV:

• **טנובמד אינובמד עלולה לפגוע בכליות.** לפני תחילת ובמשך הטיפול, הרופא עשוי להפנותך לבדיקות דם כדי להעריך את תפקוד הכליות. ספר לרופא אם היתית לך מחלת כליות, או אם הבדיקות הצביעו על בעיות בכליות. אם יש לך בעיות בכליות, הרופא עשוי להמליץ לך להפסיק ליטול טנובמד אינובמד, או אם נשא HIV הרופא עשוי להנחותך ליטול טנובמד אינובמד בטווח הממוצעת של טנובמד אינובמד אינו מומלץ כאשר קיימת מחלת כליות חמורה או למי שמתטפל בדיאליזה.

• **ספר לרופא שלך אם אתה הנך סובל מאוסטאופורוזיס, יש לך היסטוריה של שבירים בעצמות או אם הונג חווה שבירות בעצמות שלך.**

בעיות בעצמות (המופיעות ככאבי עצמות תמששים או חממרים אשר לפעמים גורמים לשברים) עלולות להיות המופיע עם בגלל נזק לתאי אבובית הכליה (ראה סעיף 4, "תופעות לוואי"). ספר לרופא שלך אם יש לך כאבי עצמות או שברים בעצמות.

טנופוביר דיסופרוקסיל עלול גם לגרום לירידת מסת עצם. אובדן העצם המשמעותי ביותר נצפה בניסויים קליניים בקרב מטופלים שטופלו ל- HIV עם טנופוביר דיסופרוקסיל בשילוב עם מעכב פרוטאז מואץ.

בכלליות, ההשפעה של טנופוביר דיסופרוקסיל על בריאות העצם לטווח רחוק וסיכון לשבר עתידי במבוגרים הינן בלתי ודאיות.

- שוחח עם הרופא אם יש לך עבר של מחלת כבד, כולל דלקת כבד.** לחולים ב- HIV וגם במחלת כבד (כולל דלקת כבד כרונית B או C), המטופלים בתרופות נוגדות נגיפי רטרו, נתונים בסיכון רב יותר לפתח סיבוכים חמורים בכבד העלולים להיות קטלניים. אם יש לך דלקת כבד B או C, הרופא ישקול בקפידה מה משטר הטיפול הטוב ביותר עבורך.

- דע את מצבך מבחינת הזיהום בנגיף דלקת כבד B (HBV)** לפני שתתחיל לטיל טנובמד אינובמד. עלולות להיות סיכונים ב- B, קיים סיכון רציני לבעיות כבד בעת הפסקת טנובמד אינובמד, בין אם יש לך ובין אם אין לך HIV. חשוב לא להפסיק ליטול טנובמד אינובמד בלי להיוועץ ברופא: ראה בסעיף 3, "אל תפסיק ליטול טנובמד אינובמד".

- היוועץ ברופא אם גילך מעל 65 שנים.** טנובמד אינובמד לא נחקרה בטופולים שגילים מעל 65 שנים.

• **היוועץ ברופא אם אתה נטילת אנטי-סבילות ללקטוז** (ראה "טנובמד אינובמד מכילה לקטוז" בהמשך סעיף זה).

ילדים ומתבגרים

נטובמד אינובמד אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מחתת לגיל 18 שנים.

אינטראקציות/התנגדות בין תרופות

אל תרכיבים של טנובמד אינובמד (אמטריציטאבין וטנופוביר דיסופרוקסיל) או כל תרופה נוגדת נגיפים אחרת המכילה טנופוביר אלפנאמיד, לאמיבדין או אדפוביר דיפיבוסקיל.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותרופות טיבוה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

נטילת טנובמד אינובמד יחד עם תרופות עלולות לגרום בכליות שלך: חשוב במיוחד לספר לרופא אם אתה נוטל אחת מבין התרופות הבאות, כולל:

- אמינוגליקוזידים (לטיפול ביהוהם חיידקי)
- אמפותריצין B (לטיפול ביהוהם סטרייטי)
- פוסקרנט (לטיפול ביהוהם נגיפי)
- גנציקלוביר (לטיפול ביהוהם נגיפי)
- פנטמידין (לטיפול ביהוהם נגיפי)
- נקומיצין (לטיפול ביהוהם חיידקי)
- אינטרלוקיין-2 (טיפול בסרטן)
- סיסטרוביר (לטיפול ביהוהם נגיפי)

תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (NSAIDs), לשיכון כאבי עצמות או שרירים)

אם אתה נוטל עוד תרופה נוגדת נגיפים הנקראת מעכב פרוטאז לטיפול ב- HIV, הרופא עשוי להפנותך לבדיקות דם כדי לעקוב בקפידה אחר תפקוד הכליות.

חשוב גם שתספר לרופא אם הנך נוטל לדיספוסוויר/סופוסובוביר, סופוסובוביר/לפטסביר או סופוסובוביר/לפטסביר/וקסילפריבר לטיפול ביהוהם דלקת כבד C.

נטילת טנובמד אינובמד עם תרופות אחרות המכילות דיאנזחין (לטיפול ביהוהם ב- HIV): נטילת טנובמד אינובמד עם תרופות נוגדות נגיפים אחרות המכילות דיאנזחין עלולה להעלות את רמת הדיאנזחין בדם ועולה להפחית לקט פסירת תאי CD4. לעתים קרובות דווח על דלקת של הכלבל וחממת אפסית (גורמי של חומצה לקטית בדם), שלפעמים גורמות לדיאנזחין. בעת נטילה עוד-זמנית של תרופות המכילות טנופוביר דיסופרוקסיל ודיאנזחין, הרופא ישקול בקפידה האם לטפל בכ בשילוב של טנופוביר ודיאנזחין.

ספר לרופא אם אתה נוטל את אחת מהתרופות האלה. אם אתה נוטל או אם נטלת לאחרונה תרופות אחרות כלשהן, או אם ייתכן שטילת תרופות אחרות כלשהן, ספר על כך לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון

- כאשר ניתן, יש לטול טנובמד אינובמד עם מזון.

היריון, הנקה ופוריות

אם הנך הרה או מניקה, חושבת שיתכן שתהי הרה, או מתכננת להרות, היוועצי ברופא או ברוקח לפני נטילה של תרופה כלשהי.

אם נטלת טנובמד אינובמד במהלך ההיריון, ייתכן שהרופא יבקש ממך לעבור בדיקות דם סדיריות ובדיקות אבחון אחרות כדי לעקוב אחר התפתחות לידך. בילדים שאמהותיהם נטלו בהיריון מעכבי טרנסקריפטאז הופכי נוקלאוטידי (NRTIs), התועבה מההגנה מפני HIV עלתה על הסיכון לתלופות לוואי.

- אין להיניק במהלך טיפול בטנובמד אינובמד.** הסיבה לכך היא שהחומרים הפעילים בתרופה זו עוברים חלב אם.
- הנקה אינה מומלצת בנשים החיות עם נגיף ה- HIV כיוון שיהוהם ה- HIV עלול לעבור לתינוק דרך חלב האם.
- אם הנך מניקה או שוקלת הנקה, עלייך **להיוועץ ברופא שלך בהקדם האפשרי.**

נהיגה ושימוש במכונות

טנובמד אינובמד עלולה לגרום לסחרחורת. אם אתה חש סחרחורת בעת נטילת טנובמד אינובמד, **אין לנהוג או להפעיל כליים או מכונות.**

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טנובמד אינובמד מכילה לקטוז

תרופה זו מכילה לקטוז אנהידרוס ולקטוז מוגדלגן אשר הינם סוגים של סוכר. אם נאמר לך על ידי הרופא או הדיאטטית כי עליך לנטל או שאינך יכול לעכל סוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

טנובמד אינובמד מכילה נתרן
תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) טבלייה, ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

• **יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.** עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע לזמיון ואופן הטיפול בתכשרם. **המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.**

המינון המומלץ של טנובמד אינובמד לטיפול ב- HIV או להפחתת הסיכון להדבקות ב- HIV הינו:

- מבוגרים:** טבלייה אחת ליום. כאשר ניתן, יש ליטול את טנובמד אינובמד עם מזון.

- אין לעבור על המנה המומלצת.**

במקרה של קושי בבליעה, ניתן לרסק את הטבלייה באמצעות קצה כפית. לאחר מכן לערבב את האבק ב-100 מ"ל (חצי כוס) מים, מיץ פפויים או מיץ ענבים, ולשתות מיד.

- טול תמיד את המינון שעליו המליץ הרופא.** כך תודא שהתרופה שלך יעילה ללחלוטין, ותפחית את הסיכון להתפתחות תנגדות לטיפול. אל תעשה את המינון שלך להרבה מהרפוא.

- אם אתה מטופל בשל זיהום ב- HIV** הרופא שלך ירשום טנובמד אינובמד עם תרופות נוגדות נגיפי רטרו אחרות. להנחיות לגבי אופן הנטילה של תרופות נוגדות נגיפי רטרו אחרות אנא עיין בעלונים לצרכן של תרופות אחרות אלה להדרכה כיצד יש ליטול תרופות אלה.

אם אתה מבוגר הנוטל טנובמד אינובמד להפחתת הסיכון להדבקות ב- HIV, אם טול טנובמד אינובמד בכל יום ולא כשאתה חושב שאתה נמצא בסיכון להדבקות ב- HIV.

פנה לרופא שלך בכל שאלה לגבי מניעת הדבקות ב- HIV או מניעת הדבקה עם אנשים אחרים ב- HIV.

אם נטלת טנובמד אינובמד במינון גבוה מהנדרש

אם נטלת בטעות טנובמד אינובמד במינון גבוה מהדרש, נטה לרופא או לחדר המיון הקרוב ביותר והיוועץ בהם. הבא את מרשדת הטבליות עמך כדי שתוכל לתאר בקלות מה נטלת.

אם שכחתי ליטול את התרופה

• **אם הבחנת בכך בנהן 12 שעות** מהעשה שבה אתה בדרך כלל נוטל טנובמד אינובמד, טול את הטבלייה בהקדם האפשרי, עדיף עם מזון.

לאחר מכן טול את המנה הבאה בשעה הרגילה.

• **אם הבחנת בכך 12 שעות או יותר** לאחר השעה שבה אתה בדרך כלל נוטל טנובמד אינובמד, אל תיטול את המנה שהחמצת. המתן וקח את המנה הבאה בשעה הרגילה, עדיף עם מזון.

אם הקאת פחות משעה אחת אחרי נטילת טנובמד אינובמד, טול טבלייה נוספת. אם הקאת יותר משעה אחת אחרי נטילת טנובמד אינובמד, אין צורך לטיל טבלייה נוספת.

אל תפסיק ליטול טנובמד אינובמד

• **אם אתה נוטל טנובמד אינובמד לטיפול ב- HIV,** הפסקת נטילת הטבליות עלולה להפחית את היעילות של הטיפול נגד HIV שעליו המליץ הרופא.

• **אם אתה נוטל טנובמד אינובמד להפחתת הסיכון להדבקות ב- HIV,** אל תפסיק ליטול טנובמד אינובמד או להחסיר אף מנה. הפסקת השימוש בטנובמד אינובמד או החמצת מנה, עלולה להגדיל את הסיכון בהדבקות ב- HIV.

אל תפסיק ליטול טנובמד אינובמד בלי להיוועץ ברופא.

• **אם יש לך זיהום מסוג הפטיטיס B,** חשוב במיוחד לא להפסיק את הטיפול בטנובמד אינובמד בלי להיוועץ קודם ברופא. אחרי הפסקת הטיפול ייתכן שתצטרך לעבור בדיקות דם במשך מספר חודשים. בחלק מהמטופלים עם מחלת כבד מתקדמת או שחמת לא מומלץ להפסיק את הטיפול מכיוון שהדבר עלול לגרום להחמרת דלקת הכבד, העלולה לסכן את חייהם.

ספר מיד לרופא על תסמינים חדשים או יוצאי דופן שהופיעו אחרי שהפסקת את הטיפול, במיוחד תסמינים שאתה מקשר לזיהום מסוג הפטיטיס B.

אין ליטול תרופות בחושיך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

• **אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,** היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו כל תרופה, השימוש בטנובמד אינובמד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשמשים, ייתכן לא כל אחד מהן אותן. אל תיבהל למקרא רשימת התופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

ספר לרופא על כל אחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי חמורות אפשריות: ספר מיד לרופא

- זמזום לקטיה** (עודה חומצה לקטית בדם) היא תופעת לוואי נדירה. עם זאת, היא עלולת לסכן את החיים. חמצת לקטיה מופיעה לעיתים קרובות יותר בנשים, במיוחד אם יש להן עודף משקל, ובאנשים עם מחלת כבד. סימנים אפשריים של חמצת לקטיית:
 - נשימה עמוקה והמירה
 - ישנוניות
 - בחילות, הקאות
 - כאבי בטן

אל אתה סבור שיתכן שיש לך חמצת לקטיה, פנה מיד לטיפול רפואי.

• **אם יש לך דלקת או לזיהום.** בחלק מהמטופלים עם זיהום מתקדם ב- HIV (איידס) גבר על זיהומי תורפה (זיהומים המופיעים באנשים עם מערכת חיסון חלשה), סימנים ותסמינים של דלקת מייחומים קודמים עלולים להופיע זמן קצר אחרי תחילת טיפול נוגד- HIV. הסברה היא שתסמינים אלה גורמים בשל שיפור בתגובה החיסונית של הגוף. המאפשר לחגף הילחם בזיהומים שהיו קיימים ללא תסמינים ברורים.

• **מחלות אוטואימוניות,** מצב שבו מערכת החיסון תוקפת רקמות בריאות בגוף, הטיפול להופיע גם לאחר התחלת נטילה של תרופות לטיפול ביהוהם ב- HIV. מחלות אוטואימוניות עלולות להתפתח חודשים רבים לאחר תחילת הטיפול. שים לב לכל תסמיני זיהום או תסמינים אחרים, כמו:

- חולשת שרירים

• חולשת המרחייה

- הקוף

• פגיעות לב, רעד או פעילות יתר (היפרקטיביות)

אם תבחין בסימנים אלה או בסימן כלשהו לדלקת או לזיהום, פנה מיד לטיפול רפואי.

תופעות לוואי אפשריות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמופיעות ביותר משתמש אחד מעשרה

- שלשול, בחילות, הקאות
- סחרחורת, כאב ראש
- פריחה
- הרגשת חולשה

ייתכן שבבדיקות ייראו גם:

- ירידה ברמת הורקן בדם
- עלייה ברמת הקריאטיך קינאז

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100

כאבים, כאבי בטן

- נודיט שניה, חולמת חריגים

• בעיות בעיכול הגורמות לאי נוחות אחרי ארוחות, תחושת נפיחות, גזים בבטן

• פרייחות (כולל נקודות אדומות או כתמים גדולים אדומים, לפעמים עם שלפוחיות ונפיחות של העור), העלולות להיות תגובות אלרגיות, גרד, שינויים בצבע העור כולל היווצרות כתמים כהים בעור

• תגובות אלרגיות אחרות, כמו צפצפוסים, נפיחות או תחושת סחרור קלה אובדן מסת עצם

ייתכן שבבדיקות ייראו גם:

• ספירה נמוכה של תאי דם לבנים (ספירה מופחתת של תאי דם לבנים עלולה להגביר את הנטייה לזיהומים)

• רמה גבוהה של טריגליצרידים (חומצות שומן), מהה או סוכר בדם

• בעיות בכבד ובכלבלב

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100

כאבים בבטן הנגרמים מדלקת של הכלבלב
נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון

• אמניה (ספירה נמוכה של תאי דם אדומים)

• פירוק שרירים, כאבי שרירים או חולשת שרירים העלולים להופיע עקב נזק לתאי אבובית הכליה

ייתכן שבבדיקות ייראו גם:

• ירידה ברמות האשלגן בדם

- עלייה ברמות הקריאטינין בדם
- שינויים בשתן

תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב- 1-10