

עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אלפראוליקס 3000, 2000, 1000, 500, 250 י"ל

אבקה וממס להכנת תמייסה להזרקה

שם התרופה צורתה וחוואה:
כל בקבוקן אבקה מכך:

Coagulation factor IX (HUMAN- RFIXFC) 250 IU

פקטור קריישה 9 הומני רקוביננט 250 י"ל

Coagulation factor IX (HUMAN- RFIXFC) 500 IU

פקטור קריישה 9 הומני רקוביננט 500 י"ל

Coagulation factor IX (HUMAN- RFIXFC) 1000 IU

פקטור קריישה 9 הומני רקוביננט 1000 י"ל

Coagulation factor IX (HUMAN- RFIXFC) 2000 IU

פקטור קריישה 9 הומני רקוביננט 2000 י"ל

Coagulation factor IX (HUMAN- RFIXFC) 3000 IU

פקטור קריישה 9 הומני רקוביננט 3000 י"ל

לאחר המסה במיט להזרקה:

1 מ"ל של אלפראוליקס 250 י"ל מכיל בקירוב 50 י"ל (250 י"ל / 5 מ"ל) של פקטורי קריישה 9 הומני רקוביננט

1 מ"ל של אלפראוליקס 500 י"ל מכיל בקירוב 100 י"ל (500 י"ל / 5 מ"ל) של פקטורי קריישה 9 הומני רקוביננט

1 מ"ל של אלפראוליקס 1000 י"ל מכיל בקירוב 200 י"ל (1000 י"ל / 5 מ"ל) של פקטורי קריישה 9 הומני רקוביננט

1 מ"ל של אלפראוליקס 2000 י"ל מכיל בקירוב 400 י"ל (2000 י"ל / 5 מ"ל) של פקטורי קריישה 9 הומני רקוביננט

1 מ"ל של אלפראוליקס 3000 י"ל מכיל בקירוב 600 י"ל (3000 י"ל / 5 מ"ל) של פקטורי קריישה 9 הומני רקוביננט

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את **עלון עד סופו** בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתהך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אלפראוליקס מיועדת לטיפול ומניעת דימום בחוליים הסובלים מהמוּפְּילָה מסוג B (חסר מולד בפקטור קריישה 9).

קבוצה טרפיותית: פקטורי קריישה

אלפראוליקס מכילה את החומר הפעיל פקטורי קריישה 9 הומני-רקביננט. פקטורי קריישה 9 הינו חלבון המיוצר באופן טבעי בדם ועצירת דימום. אלפראוליקס מיוצרת בטכנולוגיה רקוביננטית ללא הוספה של מרכיבים מן האדם או מן החי בתהיליך הייצור.

בחולי המוּפְּילָה מסוג B, פקטורי 9 חסר או אינו עובד כראוי. אלפראוליקס ניתנת על מנת להתגבר על החסר של פקטורי 9. אלפראוליקס מעלה את הרמה של פקטורי קריישה 9 בדם, ומתקנת באופן דמני את הנטייה לדימום. מבנה חלבון התרופה מעלה את משך הזמן בו התרופה פועלת.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל. פקטורי קריישה 9 הומני רקוביננט, או לפחות אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

לרשימת המרכיבים הלא פעילים, ראה סעיף 6 "מידע נוסף"

אחרות מיוחדות הקשורות לשימוש בתרופה

פנה לרופא, רוקח או אחوات לפני התחלת השימוש באלוֹפְּרָאַולִיקָס:

- קיימת אפשרות נמוכה לתגובה אלרגית חמורה פתאומית (תגובהה אנאפְּילְקְטִית) לאלוֹפְּרָאַולִיקָס. סימנים של תגובה אלרגית עלולים לכלול גרד כללי, סרפדת, חרפת, לחץ בחזה, קשיי נשימה ולחץ דם נמוך. אם מופיעים כאלה אחד מהתסמינים הבאים, הפסיק את הטיפול מיד ופנה לרופא. בשל הסיכון לתגובה אלרגית עם פקטורי 9, הטיפול הראשונים עם אלפראוליקס צריכים להתבצע תחת השגחה רפואיית, במקום המספק טיפול רפואי מתאים במרקחה של תגובה אלרגית.

- פנה לרופא אם הדימום שלך לא נשלט תחת המינון של אלפראוליקס שאתה מקבל, כיון שיכולות להיות לך מספר סיבות. למשל, היפותריה של נוגדים (הידוזים גם כמעכבים) לפקטורי 9 הינו סביר ידווע שעלול להתחש במהלך הטיפול בהמוּפְּילָה B. הנוגדים מונעים מהטיפול לעבוד כמו שצריך. זה יבדק על ידי הרופא שלך. אין להעלות את

המינון הכללי של **אלפרוליקס** על מנת לשנות בדימום ללא התיעצות עם הרופא.

מטופלים עם מעכבר פקטור 9 עשויים להיות בסיכון מוגבר לאנפילקסיס (Anaphylaxis) במהלך טיפול עתידי בפקטור 9. לכן, אם מופיעים אצלם סימנים של תגובה אלרגית כמו אלו המתוארים לעיל, עליך להיבדק לנוכחות של המעכבר.

תכשיי פקטור 9 עשויים להגביר את הסיכון להיווצרות קריישי דם לא רצויים בגוף, במיוחד אם יש לך גורמי סיכון לפתח קריישי דם. תסמינים להיווצרות קרייש דם לא רצוי עשויים לכלול: כאב ו/או רגשות לאורך הוויד, נפיחות בלתי צפיה של זרוע או רגל או קוצר נשימה פתאומי או קשה נשימה.

לפני הטיפול באלפרוליקס, ספר לרופא אם:

- הנר סובל ממחלה לב או נמצא בסיכון לחילות במחלת לב. יש לנוקוט במשנה זהירות בעת שימוש בפקטור 9.
- אתה זקוק להתקן גישה לויריד מרכזי (CVAD), יש לשקל את הסיכונים הכרוכים בו- CVAD, כגון: זיהומים מקומיים, הימצאות חידקים בדם והיווצרות פקיק בתוך כלי הדם (תרומבויזט) באזרוח החדרת הפקטור.

תיעוד

מומלץ לתעד את השם ומספר האצווה של התכשיר בכל פעם שנעשה שימוש באלפרוליקס.
אינטראקטיות/ תגובות בין תרופות
אם אתה לוקח או לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הירין, הנקה ופוריות
אם את בהירין או מניקה, חשוב שתהן בהירין או מתכנתת הירין, יש להיעועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

הניגזה ושימוש במכוונות
אלפרוליקס לא משפיעה על יכולת נהוג או להשתמש במכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
נתラン – התרופה מכילה פחota מ- אומון 1 (23 מ"ג) נתラン בכל בקבוקון, ולכן נחשבת כתרופה "לא נתラン". במקרה של טיפול ביוטר מבקבוקון בלבד, יש לקחת בחשבון את הכמות הכוללת של הנתラン.

3. כיצד משתמש בתרופה?

התרופה מיועדת לכל הגילאים.

התחלת הטיפול עם **אלפרוליקס** תעשה ע"י רופא המנוסה בטיפול בחולי המופilia. יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח במידה ואיינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

אלפרוליקס מיועד להזרקה תוך ורידית, הניתנת על ידך או מישחו אחר לאחר קבלת הקשרה מתאימה. מספר היחידות של פקטור קריישה 9 מटבطة ביחידות ביגלאומיות (U). המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. הרופא יחשב את המינון הנדרש כתלות באמן נדרש טיפול בדיםום או מניעת דיסמוס וכתלות במצב הרפואה. פנה לרופא אם אתה חושב שהדיםום שלך אינו נשלט על ידי המינון שאתה מקבל. הרופא יבצע בדיקות מעבדה מתאימות על מנת לודוד שהמינון שניית לך מספק רמות הולמות של פקטור 9 בדם.

טיפול בדימום

המינון של **אלפרוליקס** מחושב כתלות במשקל גופר והרמתה של פקטור 9 שיש להציג. רמות המטרה של פקטור 9 יהיו תלויות בחומרת הדימום ובמיומו.

מניעת דימום

המינון של **אלפרוליקס** הוא בדרך כלל 50 י"ל לקילוגרם משקל גופך הנitin פעם בשבוע או 100 י"ל לקילוגרם משקל גופך הנitin כל 10 ימים. הרופא עשוי להתאים עבורך את המינון או תדירות המטן. במקרים מסוימים, במיוחד בחולים צעירים יותר, יתכן שהייה נדרש במרוחבי מטען קיצוני יותר או במינונים גבוהים יותר.

קשהים

קיים ניסיון מועט בשימוש בחולים מעל גיל 65 שנה.

ילדים ומתבגרים

ניתן להשתמש באלפרוליקס בילדים ומתבגרים בכל הגילאים. עבור ילדים מתחת לגיל 12, יתכן שהייה נדרש במינונים גבוהים יותר או זריקות תכופות יותר. המינון הוא בדרך כלל 60-50 י"ל לקילוגרם משקל גופך הנitin כל 7 ימים.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אם נטילת בטעות מינון גבוהה יותר עליך לפנות לרופא בהקדם האפשרי. יש להשתמש באלפרוליקס תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח במידה ואינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

אם שחתת ליטול את התרופה בזמן המיעוד, אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה מיד והמשך במרוחחים הרגלים כפי שהומלץ על ידי הרופא שלך. התיעץ עם הרופא או הרוקח אם אין לך בטוח.

יש להתמיד טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה, יתכן שלא תהיה מוגן מפני דימום או שדים מוגן נכון לא יפסק.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהנתק גוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנתק זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. **תופעות לוואי:**

כמו לכל תרופה, השימוש באלפרוליקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחות מהן.

אם מופיעה תגובה אלרגית חמורה פתאומית (תגובה אנafilקטית), הפסיק מיידית את ההזרקה. יש לפנות לרופא באופן מיידי אם מופעים אחד מהסתמים הבאים של תגובה אלרגית: נפיחות פנים, פריחה, גרד כללי, סרפהת, חרלה, לחץ בחזה, קשי נשימה, צריבה ועיצוץ במקום ההזרקה, צמרמות, הסמקה, כאב ראש, תחושת חולץ כללית, בחילה, אי שקט, דופק מהיר ולחץ דם נמוך.

בילדים שלא טולו בעבר בתכשירים המכילים פקטור 9, התופעה של היוצרות מעכבים (ראה סעיף 2 "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה") הינה שכיחה (מופיעה ב- 1-10 משתמשים מתוך 100). במקרה זה, התרופה עלולה להפסיק לפעול כראוי, וכך עלול לסבול מדימום מתמיד. אם זה קורה, עליך לפנות לרופא מיד.

תופעות הלואן הבאות עלולות להתרחש עם התרופה.

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שימושיות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:

כאב ראש, חסור תחושה או עקצוץ בפה, כאבים בידי הגוף המלואים עם דם בשתן (חסימה בדרכי השתן) ואדמנויות באטר ההזרקה. ילדים שלא טולו בעבר עם תרופות פקטור 9: היוצרות מעכבי פקטור 9, רגישות יתר.

תופעות לוואי שאין שכיחות (rare) תופעות שימושיות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000:

חרחרות, שינויים בטעם, ריח רע מהפה, תחושת עייפות, כאב באטר ההזרקה, דופק מהיר, דם בשתן (המטוריה), כאבים בידי הגוף (עווית כליתית), לחץ דם נמוך וירידה בתיאבון.

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

תגובה אלרגית פתאומית חמורה ותגובה אלרגית מסכנת חיים (הלם אלרגי, שוק אנafilקטטי).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן חמירה, או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לkishor: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. **איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date. exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום

האחרון של אותו חודש. אין להשתמש בתרופה שאוחסנה מחוץ למקרר בטמפרטורה של עד 30 מעלות צלזיוס מעל 6 חודשים.

תנאי אחסון:

- יש לשמר בקירור (2-8°C). אין להקפי.
- יש לשמר באזירה המקורית על מנת להגן על התכשיט מפני חסיפה לאו.
- במהלך חי המדף, ניתן לשמר את התרופה בטמפרטורה עד 30 מעלות צלזיוס לתקופה בודדת של עד 6 חודשים.
- לאחר הוצאה מקרור, לא ניתן להחזיר למקרר. אין להשתמש מעבר לתאריך התפוגה או 6 חודשים לאחר הוצאה מקרור, המוקדם מביניהם. חובה לצין על גבי האזירה את תאריך ההוצאה מהמקרר והאחסן בטמפרטורת החדר.
- יש להשתמש בתכשיט מיד לאחר הכנתו (המסת האבקה). אם לא ניתן להשתמש מיידית אז יש להשתמש בתכשיט עד 6 שעות בתנאי אחסון של עד 30°C. אין לשמר את התמייסה המוכנה במקרר. יש להגן על התמייסה המוכנה מחסיפה ישירה לאור השמש. לאחר 6 שעות יש להשמיד את התמייסה המוכנה אם לא נעשה בה שימוש. מבחינה מיקרוביאלית – יש להשתמש בתכשיט מייד לאחר המסתו.
- התמייסה המוכנה תהיה שקופה וחסרת צבע עד גוון פנינה (גוון חלב). אין להשתמש בתרופה אם אתה מבחין שהיא עכורה או מכילה חלקיקים נראים לעין.
- התכשיט מיועד לשימוש בודד בלבד.
- יש להשליך שאריות של תמייסה שלא נעשה בה שימוש. אין להשליך תרופות באמצעות שפכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד יש לזרוק תרופות שאין משתמש בהן יותר. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

• נסוף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Mannitol, Sucrose, Histidine, Polysorbate 20, Sodium hydroxide (for pH adjustment) and Hydrochloric acid (for pH adjustment).

ממס: 5 מ"ל סודיום כלורייד ומים להזרקה

אם אתה תחת דיאטה דלת נתラン, ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

• כיצד נראהית התרופה ומה תוכן האזירה:

אלפּוֹלִיקָס משוקת כאבקה וממס להכנת תמייסה להזרקה.
האבקה בצבע לבן עד בז' (off-white) בבקבוקון. הממס הינו תמייסה שקופה, חסרת צבע במזרק מוקן מראש.
התמייסה המתקבלת לאחר המסתה הינה שקופה וחסרת צבע עד גוון פנינה (גוון חלב).

כל אזירה של **אלפּוֹלִיקָס** מכילה בקבוקון עם אבקה, מזרק מוקן מראש עם ממס, מוט בוכנה, מתאם לבקבוקון, סט אינפוזיה, 2 ספוגיות אלכוהול, 2 פלסטרים ופְּדַגְּה.

הפריטים הדורשים להמסה ולהזרקה מסופקים עם כל אריזת תכשיט.

- **בעל הרישום וכתובתו:** מגאפארם בע"מ, התדחר 15, רעננה, ישראל.
- **שם היצן וכתובתו:** סווידיש אורפן ביוטירום AB (SOBI), שטוקהולם, שוודיה
- **נערך במאי 2024.**

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אלפּוֹלִיקָס 250 יב"ל
171-47-37091-00

אלפּוֹלִיקָס 500 יב"ל
171-48-36890-00

אלפּוֹלִיקָס 1000 יב"ל
171-49-36891-00


אלפּוֹלִיקָס 2000 יב"ל
171-50-36892-00

אלפּוֹלִיקָס 3000 יב"ל
171-51-36893-00

- לשם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נסוח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות שימוש מפורטות להכנה והזרקה של אלפּוּרְוִילִיקָס
להלן הנחיות המתארות כיצד להכין ולהשתמש באלוּפּוּרְוִילִיקָס. אנא קרא הנחיות אלו במלואן לפני השימוש באלוּפּוּרְוִילִיקָס.

אלפּוּרְוִילִיקָס ניתנת בהזרקה תוך ורידית לאחר המסתה עם הממס המגע בمزרק מוכן מראש. כל אריזה מכילה:



- | |
|---------------------------------|
| 1 בקבוקון אבקה (A) |
| 5 מ"ל ממס בmezrik מוכן מראש (B) |
| 1 מוט בוכנה (C) |
| 1 מתאם לבקבוקון (D) |
| 1 סט אינפוזיה (E) |
| 2 ספוגיות אלכוהול (F) |
| 2 פלסטרים (G) |
| 1 פד גזה (H) |


אין לערבע תרופה זו עם תמייסות אחרות להזרקה או לעירוי.

רחץ את ידך לפני פתיחת האריזה.


הכנה:

1. בדוק את השם והחזק של האrizה על מנת לוודא שהיא מכילה את התרופה הנכונה. בודק את תאריך התטוגה על אריזת הקרטון. אין להשתמש אם תאריך התטוגה המופיע על האריזה חלף.
2. אם אלפּוּרְוִילִיקָס אוחסנה במקמר, אפשר לבקבוקון של אלפּוּרְוִילִיקָס (A) ולזרק עם הממס (B) להגעה לטמפרטורת החדר לפני השימוש. אין להשתמש במקור חום חיצונו.
3. הנח את הבקבוקון על משטח ישר ונקי. הסר את פקק הפלסטייק מעל הבקבוקון.
4. נגב את החלק העליון של הבקבוקון עם אחת מספוגיות האלכוהול (F) המשופקות עם האrizה, והנח לו להתייבש בוורior לפני השימוש. אל תיגע בחילק העליון של הבקבוקון אל תאפשר מגע של כל משטח או חוץ עם החלק העליון של הבקבוקון לאחר הניגוב.
5. קלף את ציפוי הנייר מתאמת הבקבוקון (D). אל תוציא את המתאים מאיזת הפלסטייק. אל תיגע בחילק הפנימי של אריזת המסתה.
6. הנח את הבקבוקון על משטח ישר. החזק את המתאים דרך איזת הפלסטייק שלו, והנח אותו באוף אנסי (זווית ישרה) על החלק העליון של הבקבוקון. לחץ כלפי מטה בחזקה עד שהמתאים יכנס למיקומו בנקישה על פתח הבקבוקון, כך שחדוד (יתד) המתאים יחדור את פקק הבקבוקון.
7. חבר את מוט הבוכנה (C) למזרק הממולא עם הממס על ידי הכנסת קצת מוט הבוכנה לתוך הפתחocabna של המזרק. סובב את מוט הבוכנה בחזקה עם כיוון השעון עד שהוא מחובר היטב למזרק.


8. החזק את גוף המזרק, שבור את מכסה הפלסטי הלבן בקצה של המזרק על ידי כיפוף המכסה עד שיינתק. הנח את המכסה בצד על ידי הנחתו עם החלק העליון כלפי מטה על משטח שטוח. אל תיגע בחלק הפנימי של המכסה או בקצה המזרק.




9. הסר את האריזה מהמתאים והשלך לפח.




10. חבר את מזרק הממס למתאים הבקבוקן על ידי הכנסת קצה המזרק לתוך פתח המתאים. דחף בחזקה את המזרק וסובב עם כיוון השעון עד שהוא מחובר היטב.



11. לחץ באיטיות על מוט הבוכנה כדי להזריק את כל הממס לבקבוקן האבקה.




12. כשהמזרק עדין מחובר למתאים ומוט הבוכנה לחוץ כלפי מטה, ערבע בעדינות את הבקבוקן עד אשר כל האבקה מתמוססת. אל תנעה.




13. לפני השימוש, בוחן חוזית את התמיסה הסופית שהתקבלה. התמיסה צריכה להיראות שקופה וחסרת צבע עד גוון פנינה (גוון חלב). אין להשתמש בתמיסה אם היא עכורה או מכילה חלקיקים נראים לעין.

14. וודאי בוכנת המזרק עדין לחוצה באופן מלא כלפי מטה, הפור את הבקבוקן. משור באיטיות את מוט הבוכנה כדי לשאוב בחזרה את כל התמיסה דרך מתקן הבקבוקן לתוך המזרק.



הערה: אם אתה משתמש ביוטר מבקבוקן אחד של **אלפרוליקס** לכל הזרקה, יש למחול כל בקבוקן בנפרד לפי ההוראות המתוארכות מעלה (שלבים 1 עד 13). הסר את מזרק הממס, והשאר את מתאם הבקבוקן במקומו. ניתן להשתמש במזרק ייחד גדול lock luer כדי לשאוב חזרה את התמיסה המוכנה בכל אחד מהבקבוקנים הנפרדים.

15. נתק את המזרק ממתאם הבקבוקן על ידי משיכה וסיבוב בעדינות של הבקבוקן נגד כיוון השעון.



16. השלך את הבקבוקן ואת המתאים.


הערה: אם אין משתמש בתמיסת מיידית, יש להחזיר את מכסה המזרק בזיהירות על קצה המזרק. אין לגעת בקצה המזרק או בחלק הפנימי של המכסה.

לאחר ההכנה, ניתן לאחסן את **אלפּוֹרְלִיקָט** בטמפרטורת החדר עד 6 שעות מוגן מאור שימוש ישיר.
לאחר 6 שעות, יש לזרוק את התמיסת המוכנה.


אופן מתן (זריקה למثان תוך וריד):

יש להשתמש בערכת העירוי (E) המסופקת באירוע זה.

1. פתח את אריזת ערכת העירוי והסר את המכסה בקצה הצינור. חבר את המזרק עם התמיסת המוכנה לקצה צינור ערכת העירוי על ידי סיבוב עם כיוון השעון.




2. במידת הצורך יש להניח חוסם עורקים ולהיכין את מקום ההזרקה על ידי ניקוי העור עם ספוגית האלכוהול השנייה המצורפת בחבילה.



3. הסר את האויר בצינור ערכת העירוי על ידי לחיצה איטית על מוט הבוכנה עד שהנוزل יגיע למוחט של ערכת העירוי. אין לדוחוף את התמיסת דרך המוחט. הסר את כיסוי הפלסטיκ השקוף מהמוחט.

4. הכנס את המוחט של ערכת העירוי לווריד לפי הנחיות הרופא או האחות והסר את חסם העורקים. אם אתה מעדיף, אתה יכול להשתמש באחד מהഫלסטרים (G) המסופקים באירוע זה כדי להחזיק את כיסוי הפלסטיκ של המוחט במקום באתר ההזרקה. הזרק את התמיסת המוכנה לווריד במספר דקודות. הרופא עשוי לשנות את קצב ההזרקה המומלץ לך בהתאם לנוחות שאתה חשים.

5. לאחר הזרקת התכשיר אל תור הוריד, והסרת המוחט, קפל את מגן המוחט והצמד אותו על המוחט.



6. יש להשליך לתוך מיכל פסולת רפואי מותאים את המוחט המשומשת, כל תמייסה שנייה בשימוש, המזרק והבקבוקון הריק, מכיוון שימושים אלה עלולים לגרום לאירועים אחרים אם לא יושלמו כראוי.