

## עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

### **רפנידאט אל.אי 10, 20, 30, 40, 60 מ"ג כמוסות בשחרור מושהה**

כל כמוסה בשחרור מושהה מכילה מתילפנידאט הידרוכלוריד (Methylphenidate hydrochloride) 10, 20, 30, 40 או 60 מ"ג בהतאמה. חומרם בלתוי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוספים" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חילוק המרכיבים של התרופה".  
**קרא בעיון את העلون עד סופו** לפני **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **שימוש לרעה, שימוש שגוי והתכמכרות**

בעת שימוש ברפנידאט אל.אי יש סיכוי גבוהה של שימוש לרעה ושימוש שגוי וזה עשוי להוביל לבעיות של שימוש בחומרים הколоלוות התמכרכות. שימוש לרעה ושימוש שגוי בחומרים המעוררים את מערכת העצבים המרכזית, כולל **רפנידאט אל.אי**, עשויים להוביל למינון יתר ולמוות, והסיכון לכך עולה עם מנת גדלות יותר או בדרך מתן שאין מאושרו, כגון הסנפה או הזרקה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

טיפול בהפרעות קשב וריכוז (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

**קבוצה רפואיית:** מעורר מערכת העצבים המרכזית.

כמוסות **רפנידאט אל.אי** מכילות את המרכיב הפעיל מתילפנידאט הידרוכלוריד. מתילפנידאט הידרוכלוריד הוא סטימולנט (מעורר) של מערכת העצבים המרכזית.  
**כמוסות רפנידאט אל.אי** משמשות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז (ADHD) או הפרעה היפרקטניתית שהיא הפרעת התנהגות ילדים, במתבגרים ובמבוגרים. קרוב ל-3% מהילדים סובלים מהפרעה זו, אשר אינה מאפשרת להם לשבת ברוגע או להתריך במשימות למשך זמן כלשהו. ילדים עם הפרעה זו עלול להיות קשיי לימודים ובהכנות שיעורי בית. לעיתים קרובות עשוי להיות קשה להתנהלה מולם/להתמודד איתם בבית הספר ובבית.  
 מבוגרים עם ADHD מתקשים לעיתים קרובות להתרחק. לעיתים קרובות הם מרגשים חסרי מנוחה, חסרי סבלנות, עם רמת קשב נמוכה והם משתמשים בקהלות. הם עשויים להתקשות בארגון חייהם הפרטיים ובעבודה.

משערם כי מתילפנידאט פועל על ידי ייסות כימיים מסוימים במוח המשפיעים על ההתנהגות. הוא מסייע למקד את תשומת הלב, לחסום הסחות דעת ומאפשר לאנשים אימפרוטיביים לחשב לפני מעשה. אם הטיפול מצליח, הוא משפר את יכולת הקשב הטבעית של האדם.

תרופה זו ריא חלק מתוכניות טיפולית הכוללת בדרך כלל גם טיפול פסיכולוגי, חינוכי וחברתי. אם יש לך כל שאלה על אופן הפעולה של **רפנידאט אל.אי** או מדובר תרופה זו נרשמה לך או לידך, פנה לרופא שלך.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

##### **אין להשתמש בתרופה:**

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (מתילפנידאט) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). חלק מההANTI-ALKYLANTS של תגובה אלרגית עשויים לכלול קוצר נשימה, צפצופים או קשיי נשימה; נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או של חלקי הגוף של הגוף; פריחה, גירוד או תפרחת עורית (חרפת).

**אין ליטול רפנידאט אל.אי אם אתה סובל מהרכיבים הרפואיים הבאים:**

- תקופות של חרדה, מתח או אי שקט

- תסמנות טורט (מצב של תנעות הגוף ודיבור שאינם נשלטים או טיקים) או אם יש לך היסטוריה משפחתית של הפרעה זו
  - לחץ תוך עיני מגבר (גלאוקומה)
  - פעילות יתר של בלוטת התירס (тирואיד) או בעיות אחרות בבלוטת התירס
  - בעיות לב כגון התקף לב, דופק לא סדיר, כאבים בחזה (אנגינה פקטורייס), אי ספיקת לב, מחלת לב או בעיה מולדת בלב
  - לחץ דם גבוה מאוד (יתר לחץ דם) או היצרות של כלי דם עורקים (חסימת עורקים, אשר עלולה לגרום לכאב בذرעות וברגליים)
  - גידול נדיר של בלוטת האדרנלן ("וורתת הכליה") הידוע בשם פאוכרומוציטומה
- אם אתה לא בטוח אם אתה סובל מאחד מהמצבי הרפואיים שפורטו לעלה, שאל את הרופא.**

אין ליטול רפואיdae אל. אִי אם אתה נוטל תרופה מקבוצת מעכבי מונומאמין אוקסידייז (MAO) או אם נטלת מעכבי MAO במהלך 14 הימים לפני התחלת הטיפול ברפינויdae אל. אִי (ראה גם סעיף "תגובהות בין תרופתיות"). נטילת רפואיdae אל. אִי יחד עם תרופה מקבוצת מעכבי MAO עלולה לגרום לתגובה חריפה הכוללת עלייה פתאומית בחום הגוף, לחץ דם גבוה בצורה קיצונית וועויתות חמורות.

#### **שאל את הרופא אם אתה לא בטוח אם נטלת אחת מתרופות אלו.**

#### **ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

ספר לרופא אם אתה אלרגי לכל תרופה אחרת, מזון, חומר צבע או משמרות. הרופא ירצה לדעת האם אתה נוטה לפתח אלרגיות.

- שימוש לרעה, שימוש שגוי והתמכרות**
- בעת שימוש ברפינויdae אל. אִי יש סיכון גבוה של שימוש לרעה ושימוש שגוי זה עשוי להוביל לביעות של שימוש בחומרים הכלולים בתמכרות. שימוש לרעה ושימוש שגוי ברפינויdae אל. אִי, בתרופות אחרות המכילות מתילפנידאט, ובתרופות המכילות אמפטמין, עשויים להוביל למינון יתר ולמוות. הסיכון למינון יתר ולמוות עולה עם מנוג גדלות יותר של רפינויdae אל. אִי או כאשר משתמשים ברפינויdae אל. אִי בדרכים שאינן מאושרו, כגון הסנפה או הזרקה.
- על הרופא לבדוק את הסיכון שלך או של ילדר לשימוש לרעה, לשימוש שגוי ולהתמכרות לפני שימושים טיפול ברפינויdae אל. אִי והוא יטהר אותך או את ילדר במהלך הטיפול.
  - **רפינויdae אל. אִי** עשויה להוביל לתולות גופנית לאחר שימוש ממושך, גם אם נלקחה בהתאם להנחיות הרופא.
  - אל תיתן רפואיdae אל. אִי לפחות אחד אחר: מתילפנידאט עלול לשמש כמטרה לאנשים העשויים שימוש לרעה בתרופות מרשם או בסמי רחוב. אחסן את התרופה במקום בטוח כדי להגן עליה מגיבבה. אל תיתן את התרופה שלך לפחות לאחד אחר אף פעם כי זה עלול לגרום לממוות או להזיק להם. מכירה או נתינה של רפואיdae אל. אִי לאחרים עלול להזיק להם ומוגדת לחוק.
  - אחסן את התרופה במקום בטוח והשלך בצורה נאותה כל תרופה שלא הייתה בשימוש (ראה סעיף 5 "איך לאחסן את התרופה?").
  - ספר לרופא שלך אם אי פעם אתה או ילדר השתמשת לרעה או שפיתחתם תלות באלכוהול, בתרופות מרשם או בסמי רחוב.

#### **לפני הטיפול ברפינויdae אל. אִי ספר לרופא אם אתה סובל מאחד מההתנהגוויות או מאחד מהמצבי הרפואיים המפורטים:**

- פגמים לב (כגון אי תקיןות מבנה של הלב [structural cardiac abnormality])
- טיקים (עוויות שרירים המתרחשת בדרך כלל בפנים או בכתפיים) או אם לאחדיך או לאחיזותיך יש טיקים
- ההיסטוריה המשפחתית של מוות פתאומי או דופק לא סדיר
- התקשות של העורקים
- כל בעיית לב אחרת עצשוית או קודמת
- אי תקיןות של כלי הדם במוח, למשל היכלשות כלי הדם (מפרצת), שbez מוחי או דלקת כלי הדם (וסקוליטיס)
- דיכאון חרום, הפרעה דו-קוטבית או מחלות נשש אחרות

- התנהגות או מחשבות אובדן
- אפילפסיה (פרכוים, עוויות או התקפים)
- לחץدم גבוה
- הפרעות נשחיריפות הגורמות לחשיבה ותפיסה חריגות (פסיכוזה) או לתחושא בלתי רגילה של ריגוש, פעולות יתר וחוסר איפוק (acute mania) – הרופא יאמר לך אם אתה סובל ממצבים אלה
- תסמים פסיכוטים כגון ראייה או הרגשת דברים שאינם קיימים במציאות (הזיות)
- התנהגות תוקפנית
- יש לך או שאתה מפתח בעיות עיניים, כולל לחץ מוגבר בעין, גלאוקומה או בעיות בראש מקרוב (רוחק ראייה)
- אם יש לך אחד מהמצבים המפורטים לעיל, יתכן שהרופא ירצה לך נקוט באמצעות זהירות מיוחדם.

#### **ازהרות נוספת**

- **רפנידיאט אל.אי.** עשוי לתת תוצאה חיובית שגיה בבדיקות לשימוש בתרופות, כולל בדיקות הנערכות בספורט
- בחלק מהילדים המקבילים **רפנידיאט אל.אי.** לטוח ארכוך עשוי להיות האטה בגדרה, אך בדרך כלל הם יפכו על כך כאשר הטיפול יפסיק (ראה גם סעיפים: "משך הטיפול" ו-"בדיקות ומעקב")
- במטופלים מסוימים **רפנידיאט אל.אי.** עשוי לגרום לאין נוחות בבטן, לאיבוד התיאבון ולקשי שינה, במיוחד בהתחלה הטיפול. הרופא יכול לסייע להפחית תסמים אלה על ידי הקטנת המנה של **רפנידיאט אל.אי.** או שינוי זמני ניתילת התרופה
- אם במהלך הטיפול **רפנידיאט אל.אי.** או לאחר הפסקת הטיפול יש לך זקיפות כאבות שנובעת כתוצאה או תדידות, יתכן שאתה זקוק לטיפול רפואי דחוף. זה עשוי לקרות בכל קבוצת גיל. **אם זה קורה, פנה מיד לרופא**
- אם אתה נוטל **רפנידיאט אל.אי.** עם תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף (תרופות סרוטונרגיות, למשל סרטרין וונלפאקסין המשמשות לטיפול בדיכאון) אתה חווית שילוב של התסמים הבאים: חסור מנוחה, רעדות, התכווצויות שרירים פתאומיות, חום גבוה לא רגיל, בחילות והקאות, הפסק את הטיפול **רפנידיאט אל.אי.** ובתרופות אלה פנה מיד לרופא שלך אם אתה עומד לעבור ניתוח, יש לידע את הרופא כי אתה נוטל **רפנידיאט אל.אי.** אין לך תחת **רפנידיאט אל.אי.** ביום הניתוח אם משתמשים בסוג מסוים של מאלחש מאחר שקיים סיכון לעלייה פתאומית בלבד הדם במהלך הניתוח

#### **ילדים וمتבגרים**

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6.

#### **בדיקות ומעקב**

יש להקפיד להגיע לפגישות המעקב אצל הרופא כדי שניתן יהיה לעקב אחר התקדמות הטיפול. הרופא יבדוק את לחץ הדם שלך וירורך בדיקות דם מדי פעם לפחות תופעות לוואו. אם ילך לא גדול לגובה או לא גבוהה במשקל צפוי, יתכן שיידרשו הפסיקות במתן **רפנידיאט אל.אי.**

#### **תגובה בין תרופתיות**

אם אתה לוקחת או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוחק.

תרופות מסוימות ו**רפנידיאט אל.אי.** הניטלות ייחדי, עלולות להפריע זו לזו. תרופות אלה כוללות:

- תרופות המעלות את לחץ הדם
- נוגדי קריישה הניטלים דרך הפה או אורפרין (תרופות המשמשות למניעת קריישי דם)
- אגוניסטים לרצפטור מסוג אלפא 2 כגון קלונידין (המשמשים לטיפול בלחץ דם גבוה)
- תרופות לטיפול בדיכאון, כגון נוגדי דיכאון טריציקליים ומעכבי מונואמין אוקסידאז (MAO). ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה אם"
- נוגדי פרכוים מסוימים (תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה או בתקפים)
- פנילבוטאצין (טיפול בכאבים או בחום)
- גואנטידין
- מאלחשים

- תרופות המשפיעות על רמת הדופמין בגוף (תרופות דופמינרגיות המשמשות לטיפול במקרים או בסיסיcosa)
- תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף (תרופות סרוטונרגיות, למשל אלה המשמשות לטיפול בדיכאון כמו סרטרין ונולפאקסין)

"יתכן שהיה צריך לשנות את המינון של התרופות שלך או שתצטרכך לקחת תרופות אחרות. היועץ ברופא. אם לא סיררת לרופא על תרופות נוספות שאתה נוטל, היועץ בו לפני נטילת **רפנידאט אל.אי.** אם אתה עומד להתחלט לטיפול בתרופה חדשה,ذكر לרופא שלך, לרופא השני או לרוקח כי אתה מטופל ב**רפנידאט אל.אי.**".

### **שימוש בתרופה ומדוזן**

ניתן ליטול כמוסות **רפנידאט אל.אי.** עם או בלי מזון.

**שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**  
אין לצרוך אלכוהול בתקופת הטיפול ב**רפנידאט אל.אי.** יש לזכור שמאכלים מסוימים ותרופות מסוימות מכילים אלכוהול.  
צריכת אלכוהול עלולה לגרום להחמרה בחלק מתופעות הלויי של **רפנידאט אל.אי.**, כגון סחרחוות ונמנום.

**הירין והנקה**  
**הירין**  
אין להשתמש ב**רפנידאט אל.אי.** במהלך הירין אלא אם הרופא הורה על כך במפורט. תרופה זו עלולה להשפיע על העובר אם את נטילת אותה בעת ההירין.  
אם הרית בתקופת הטיפול ב**רפנידאט אל.אי.**, היועצי ברופא. הרופא יוכל לדון איתך בסיכונים ובתועלת של נטילת התרופה במהלך הירין.  
**הנקה**  
אין להניך במהלך טיפול ב**רפנידאט אל.אי.** החומר הפעיל ב**רפנידאט אל.אי.** יכול לעבור לחלב אם.

**נהיגה ושימוש במכונות**  
בתקופת הטיפול ב**רפנידאט אל.אי.** יש להיזהר בנהיגה, הפעלת מכונות או ביצוע משימות בהן נדרש ערנות עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליו.  
תרופה זו עלולה לגרום להזיות, סחרחוות, נמנום, ראייה מעורפלת או תופעות לוואי אחרות במערכת העצבים המרכזית אשר עלולות לפגום ביכולת הרכיב אוניברסיטט או תופעות מהירות או מתסמים אלו, אין להניך ברכב, להפעיל מכונות או לבצע כל פעילות המכובדת מהתגובה מהירנות או פעילות אשר עלולה להיות מסוכנת.  
באשר לילדים, יש להזהיר מרכיבה על אופניים או משחקים בקרבת הכביש וכדומה.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
תרופה זו מכילה סוכרוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך סבירות לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**  
יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.  
**מינון:**

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד על פי צרכי המטופל ותגובתו לטיפול.  
אין לשנות את המינון מבלי להתייעץ עם הרופא.  
אם אתה סבור שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלהה מדי, יש להתייעץ עם הרופא המטפל.  
**אין לעبور על המנה המומלצת.**

**משך הטיפול:**  
יש להמשיך וליטול **רפנידאט אל.אי.** במשך הזמן עליו הורה הרופא.

תרופה זו מסיימת בוויסות התסמים, אך אינה מרפאת. הרופא יבדוק את השיפור במצבך כדי לוודא שהתרופה פועלת כנדרש וידון איתך בשאלתך עד מתי יש להמשיך בטיפול. משך הטיפול ב-ADHD שונה בין מטופל למטופל. במהלך הטיפול ב-ADHD, יתכן שהרופא יורה על הפסקת נטילת **רפנידאט אל.אי.** בפרק זמן מסוימים (למשל בסוף השבוע או בחופשות בית הספר) כדי לראות אם נטילתה עדין נדרשת. הפסיקות אלה בטיפול עוזרות גם להימנע מההאטה בגידלה אשר מתרחשת לעיתים כאשר ילדים נוטלים תרופה זו לאחר זמן).


#### **צורת הנטיילה:**

- ניתן ליטול **רפנידאט אל.אי.** עם או בלי מזון.
- יש לבלווע את הcapsule בשלהותה פעמי אחד ביום, בבוקר, עם כוס מים מלאה. אין לכתוש, למלען או ללחוץ את הcapsule, מאחר שהיא עלול לפגוע במנגנון שחרור התרופה.
- אם המטופל לא יכול לבלווע את הcapsule, ניתן לפתח את הcapsule בזיהירות ולפזר את תוכנה (צדוריות קטנות) על כמות קטנה של מזון רך (כגון רסק תפוחים):
- יש לוודא שהמזון אינו חם שכן הדבר עלול להשפיע על התכונות המייחודות של הצדוריות הנמצאות בcapsule.
- יש לאכול באופן מיידי את תערובת התרופה/מזון בשלהותה.
- אין לשמר את התערובת לשימוש עתידי.

אם הcapsules גורמות לך אי נוחות בטנית, ניתן ליטול אותן עם מזון, אך יש להקפיד וליטול אותן תמיד באותו אופן (כלומר: תמיד עם מזון או תמיד ללא מזון). בדרך זו ההשפעה תמיד תהיה זהה.

#### **הנחיות לפתיחה אריזת המגש:**

- תרופה זו זמינה באפשרות מגש קשות-פתיחה לילדים, הנינתנת לקילוף. שים לב בבקשתה להוראות הפתיחה הבאות של אריזת המגש:
- אין לדחוף את הcapsule החוצה מאrizת המגש לאחר שפעולה זו תמערך את הcapsule.
  - החזק את אריזת המגש כך שניר הכסף המודפס יונפה כלפי מעלה וכופף אותו לאחרו לאורק הקו המנוח. כופף את אריזת המגש בכיוון הפוך וקרע לאורק הקו המנוח.



- משורמנה בודדת על ידי קריעה לאורק הקו המנוח באrizת המגש וקלף לאחרו את ניר הכסף על מנת לחשוף את הcapsule.



#### **אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר**

חלק מהתסמים של מנת יתר הם: הקאה, אי שקט, כאב ראש, רעדות, עוויתות שרירים, דופק לא סדייר, הסמקה, חום, הצעה, אישונים מורחבים, קשי נשימה, בלבול, פרכוים ועוויתות שרירים המלולות בחום ובשתן אדום-חום.

אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בעליל מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. עשה זאת גם אם אין סימנים להרעלת או אי נוחות.

#### **אם שכחת ליטול את התרופה**

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד ונזכרת לפני אמצע היום, יש ליטול מנת מייד כשנזכרת ולהזכיר ללוח הזמן הרגיל ביום לאחר מכן. אם לא זכרת לנקחת לפני אמצע היום, דלג על המנה שנשכח וקח את המנה הבאה בבוקר שלמחרת, כרגע. אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על המנה שנשכח. אם תעשה כך אתה עלול להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי.

אם קשה לך לזכור מתי לקחת את התרופה שלך, היועץ ברוקח.  
יש להתמיד בטיפול כפי שהוא מולץ לך על ידי הרופא.

#### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה מבל' להיעזר ברופא. אם אתה מפסיק בפתאומיות את הטיפול, יתכן שיחסור מצבך הרפואי טרם הטיפול השׂפענה תופעות לוואי כגון דיכאון. כדי להימנע מכך, יתכן שהרופא יורה על הקטנת המנה היומית באופן הדרגתى לפני הפסקת הטיפול לחולטי. יש צורך בהשגחה רפואית לאחר הפסקת הטיפול.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה **זקוק להם**.  
אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בnageן לשימוש בתרופה, היועץ רפואי או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי

דוחה לרופא בהקדם האפשרי אם אין לך מרגיש טוב בזמן הטיפול ברפנדיאט אל.אי. כמו בכל תרופה, השימוש ברפנדיאט אל.אי. עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן, יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

##### יש לדוח מיד לרופא או לפנות לחדר מיון במקרים הבאים:

- סימנים של אלרגיה כגון: התנפחות של הפנים והגרון, השפתיים או הלשון, קוצר נשימה, צפצופים או קושי בנשימה. אלה סימנים של תגובה אלרגית חמורה חולשה או שיתוק של הגפיים או הפנים, קושי לדבר או התעלפות בלתי מוסברת פריחה בעור, גירוד, כתמים אדומים על העור, שלפוחיות או קילופי עור עליה פתאומית בחום הגוף, הדעה, דופק מהיר, כאב בחזה, כאב בבחן, קשין שרירים ותונודות בלחץ הדם אשר עלולות להוביל לתרדמת (קומה) מצב תמידי של נוכחות תסמים דמוני שפעת כגון צמרמוורות, חום, כאב גרון ונזלת, בלוטות נפוחות, כאבי שרירים או מפרקים דימום או חבורות עוריות לא רגליים עיפויות לא רגילה, קוצר נשימה במהלך פעילות גופנית, סחרורות, עור חיוך טלטלול לא רצוני של הגוף (סימנים של רעד) כגון עוינות, טלטלול או תנועות התਪתלות בלתי נשלטות פרכוסים (התקפים) או התעלפות בלתי מוסברת כאב או תעוקה בחזה דופק מהיר או לא סדי' הצהבה של העור או העיניים, גoon כהה לשתן או גoon בהיר לצואה הבלבול, אשליות או חזיות (ראייה או תחושה של דברים שאינם קיימים) התרגשות, פעולנות יתר והתנהגות נטולת עכבות כאב ראש חמוץ או קבוע דבר או תנועות גוף בלתי נשלטים (תסמונת טורט) זקפה ממושכת הגורמת לאי נוחות של הפני (סימן לפראפאזם) מחשבות או ניסיונות להרוג את עצמן (חשיבה אובדנית או ניסיון התאבדות כולל התאבדות בפועל) האצבעות בידים וברגליים חסרות תחושה, מרגישות קרות, מעקצחות ומשנות צבע (מלבן לכחול, ואז לאדם) בחשיפה לקור (תופעת רינו, קור היקפי) עוינות וטלטלול בלתי נשלטים (דיסקינזיה) ירידת חריגה ברמות של תא דם מכל הסוגים. זה קשור لأنמיה, ירידת בטסיות וירידה בתאי דם לבנים. זה יכול להוביל לעליות, סיכון מגבר לדימום /או סיכון מגבר לזמןם. זה עשוי להיות חמוץ או מס肯 חיים (פנציטופניה)

תופעות הלואן שמצוינו מעלה עלולות להיות חמורות. יתכן שייהיה צורך בהשגחה רפואית דחופה.

#### תופעות לוואי נוספת

דוחה לרופא אם אתה מבחין באחת מהתופעות הבאות והיא מדאייה אותן:

**תופעות לוואי שכיחות מודגש** (תופעות שמאופייניות ביותר משמשים אחד מעשרה):

- בחילה
- איבוד התיאבון
- כאב גרון ונזלת עצבנות
- נדודי שינה
- יובש בפה

**תופעות לוואי שכיחות** (תופעות שמאופייניות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- הקאה או כאב בטן
- אי נוחות בטן או קשיי עיכול
- תחושת חרדה או דאגה
- תחושת מתח מוגבר
- אי שקט
- הפרעות שינה
- כאב ראש
- שיעול
- נמנום
- סחרחות
- חוסר מנוחה
- נשירת שיער
- תפרחת עורית (חרלה)
- כאבי מפרקים
- כאבי שיניים
- הצעת יתר
- קצב לב לא נורמלי
- מודעות לפחותות הלב
- מצקה רגשית מופרצת או התרגשות
- ירידה במשקל
- תחושת דיכאון
- תחושת תוקפנות
- חריקת שיניים מופרצת

**תופעות לוואי שאין שכיחות** (תופעות שמאופייניות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- צביתה (נעילת) לסתות - עווית בשיריה הלסת המקשה עלפתית הפה
- ירידה (נעילת) במשקל והאטיה בגדייה בילדים
- ראייה מטושטשת או הפרעות במיקוד הראייה

**תופעות לוואי נדירות מודגש** (תופעות שמאופייניות בפחות משמשים אחד מתוך 10,000):

- מצב רוח ירוד, חולף
- עוויתות שרירים
- אנמיה (ירידה במספר תאי דם אדומים), לויוקופניה (ירידה במספר תאי דם לבנים), תרומבולוציטופניה (ירידה במספר הטעניות)

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה** (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- גmagom
- הרתבת לילה בילדים
- כאב בחזה, עייפות
- חוסר יכולת לפתח או לשמר זקפה, התנפחות השדים בוגרים

- דלקת של דרכי האף והגרון
- התנפחות של האזניים (סימן של תגובה אלרגית)
- רגונות, תוקפנות, שינויים במצב רוח, התנהגות או חשיבה לא תקינה, כאס, מודעות יתר לסבירה, תחושת ריגוש לא רגילה, פעלנות יתר וחוסר מעצרים (מאניה), חוסר התמצאות ("דיסאוריינטציה"), שינוי בדחף המין, חוסר רגש או תחושה, חזרה על מעשים שוב ושוב, אובססיה לדבר אחד, בלבול, התמכרות
- חולשת שרירים זמנית, אובדן תחושה בעור או אובדן תפקודים אחרים בגוף עקב מחסור זמן באספקת דם למוח (reversible ischemic neurological deficit), מיגרנה
- ראייה כפולה, אישונים מורחבים, קשיי בראיה
- הפסיקת דופק, התקף לב
- כאב גרון, קוצר נשימה
- שלשול, עצירות
- אדמומיות של העור, כתמים אדומים וגדולים על העור המופיעים תוך מספר שעות מלキחת התרופה
- כאבי שרירים, עוטותות שרירים
- לחץ תוך עיני מגבר

**תופעות לוואי נספנות שהתרחשו עם טיפול אחרות המכילות את אותו החומר הפעיל כמו רפ niedאט אל.אי.:**

- דם בשתן
- מוות פתאומי
- רחשים לא רגילים מהלב

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמלה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקורי לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטווים ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרית תאריך התפוגה (EXPIRY DATE) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל-25°C.

#### **6. מידע נוסף**

**נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Sugar spheres, methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:1), ammonio methacrylate copolymer (type B), povidone, talc, triethyl citrate, gelatin, titanium dioxide (E171), red ink (shellac glaze (E904), propylene glycol (E1520), red iron oxide (E172), strong ammonia solution (E527), potassium hydroxide (E525))

בנוסף, **רפ niedאט אל.אי** 10 מ"ג, 40 מ"ג, 30 מ"ג ו-60 מ"ג מכילות iron oxide yellow (E172).

#### **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:**

כמוסות **רפ niedאט אל.אי** 10 מ"ג, 20 מ"ג, 30 מ"ג, 40 מ"ג, 60 מ"ג מכילות כדוריות בגוון לבן ולבנבן.

**רפ niedאט אל.אי 10 מ"ג:** כמוסה עם מכסה צהוב כהה אטום וגוף לבן אטום, על המכסה מודפס RUB" בצבע אדום ועל הגוף מודפס "M10" בצבע אדום.

**רפנידאט אל.אי 20 מ"ג:** כמוסה בצלע לבן אטום, על המכסה מודפס "RUB" בצלע אדום ועל הגוף מודפס "M20" בצלע אדום.

**רפנידאט אל.אי 30 מ"ג:** כמוסה בצלע שנחבות אטום, על המכסה מודפס "RUB" בצלע אדום ועל הגוף מודפס "M30" בצלע אדום.

**רפנידאט אל.אי 40 מ"ג:** כמוסה בצלע צהוב כהה אטום, על המכסה מודפס "RUB" בצלע אדום ועל הגוף מודפס "M40" בצלע אדום.

**רפנידאט אל.אי 60 מ"ג:** כמוסה עם מכסה צהוב כהה אטום וגוף שנחבות אטום, על המכסה מודפס "RUB" בצלע אדום ועל הגוף מודפס "M60" בצלע אדום. גודל אריזה מאושר: 30 סנטימטרים.

**היצwan וכתובתו:** לברוטוריוס רוביו ס.א., ברצלונה, ספרד נערך ביולי 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

**רפנידאט אל.אי 10 מ"ג:** 170-55-37007-99

**רפנידאט אל.אי 20 מ"ג:** 170-56-37008-99

**רפנידאט אל.אי 30 מ"ג:** 170-57-37009-99

**רפנידאט אל.אי 40 מ"ג:** 170-58-37010-99

**רפנידאט אל.אי 60 מ"ג:** 170-59-37011-99

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**בעל רישום:** דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל