

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## ספטידין

### תמיסה

הרכב:

כלורהקסידין דיגלוקונט  $0.5\% w/v$   
(Chlorhexidine Digluconate  $0.5\% w/v$ )  
אלכוהול  $70\% v/v$  (Alcohol  $70\% v/v$ )  
מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלול זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה עד פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היועץ ברוקה אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי מהיר של הידיים, גם לפני פעולות רפואיות חודרניות.

**קבוצה תרופוטיית:** חומרים אנטיספטיים.

### 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים כלורהקסידין דיגלוקונט ו/או לאלכוהול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- במגע עם העיניים, המוח, קרומי המוח, באוזן התיכונה או באוזן החיצונית כאשר עור התוף מחורר.
- בהרדקה.
- אחרות היוגף (לדוגמה: אף, אוזניים).

**זהירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- ספטידין מכיל כלורהקסידין. כלורהקסידין ידוע כגורם לרגישות יתר, כולל תגובות אלרגיות כלליות והלם אנפילקטי. השכיחות של רגישות

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בספטידין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק מיד את השימוש בתרופה ולפנות לרקבת טיפול רפואי אם מופיעות התופעות הבאות:**

- כלורהקסידין יכול לעתים נדירות מאוד לגרום לרגישות יתר כולל הלם אנפילקטי (התנפחות של הגרון או השפתיים, לחץ דם נמוך) ותגובות אלרגיות (לדוגמה דלקת העור, גרד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפדת, גירוי בעור, שלפוחיות).

• ייתכן כויות כימיות ביילודים ובתינוקות.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

### חבאתי אסחון:

- יש לאחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ- $25^{\circ}\text{C}$ .
- סגור היטב.
- זהירות! חומר דליק, שמור מפני אש.
- לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש בתרופה עד תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:**

Purified water, Glycerin, Propylene Glycol, Brilliant Blue.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
תמיסה בצבע כחול.

תכולה: 500 מ"ל, 1000 מ"ל.

ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

**יצרן ובעל הרישום:**

בן שמעון פלורישי בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ב. משגב 2017400, ישראל.

עלון זה נערך ב-06/2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

108-58-29253-00

לשם הפשוטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.