

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات) 1986

يُسمح هذا الدواء بدون وصفة طبيب

سيبتادين

محلول

التركيبة:

كلورهيكسيدين ديجلوكونات 0.5% w/v
(Chlorhexidine Digluconate 0.5% w/v)
كحول 70% v/v (Alcohol 70% v/v)
المركبات غير الفعالة ومسببات الحساسية في الدواء – انظر

البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة باهتمام حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات الواردة في البند

3 "كيف تستعمل الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي

إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة

الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو إذا لم تحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لتطهير اليدين السريع، أيضاً قبل العمليات

الطبية الغزوية.

الفصيلة العلاجية: مواد مطهرة.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادتين الفعالتين كلورهيكسيدين ديجلوكونات و/أو الكحول أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- يتماشى مع العينين، الدماغ، أغشية الدماغ، في الأذن الوسطى أو في الأذن الخارجية عندما يكون الغشاء الطبلي (طبلة الأذن) متقوفاً.
- بالتحقق.
- في فتحات الجسم (على سبيل المثال: الأنف، الأذنين).

تذكريات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- يحتوي سيبتادين على كلورهيكسيدين. معلوم أن كلورهيكسيدين يسبب فرط الحساسية، بما في ذلك ردود الفعل التحسسية العامة والصدمة التأقية. مدى شيوع فرط الحساسية لكلورهيكسيدين غير معلوم. لا يجوز

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سيبتادين إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة

الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف فوراً عن استعمال الدواء والتوجه لتلقي

العلاج الطبي إذا ظهرت الأعراض التالية:

- في أحيان نادرة جداً يمكن أن يسبب كلورهيكسيدين فرط الحساسية، بما في ذلك الصدمة التأقية (انتفاخ الحلق أو التنفيس، ضغط دم منخفض) وردود الفعل التحسسية (على سبيل المثال التهاب الجلد، حكة، احمرار، إيكزيما، طفح جلدي، شرى، تبيح الجلد، حويصلات).
- يُحتمل حدوث حروق كيميائية لدى المواليد الجدد والأطفال الرضع.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو

إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة،

فعلبك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج

الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

(www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة

المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول

إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين في مكان بارد، في درجة حرارة دون 25°C.
- يجب إغلاقه بإحكام.
- تنبيه! مادة قابلة للاشتعال، تحفظ بعيداً عن النار.
- بعد الفتح لأول مرة، يمكن استعمال الدواء حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادتين الفعالتين، يحتوي الدواء أيضاً على: Purified water, Glycerin, Propylene Glycol, Brilliant Blue.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

محلول أزرق اللون.

المحتوى: 500 ملل، 1000 ملل.

قد لا تسوق جميع أحجام العبوة.

المصنع وصاحب الامتياز:

بن شمعون فلوريس م.ب.ص، المنطقة الصناعية ميسجاف،

بريد متجول ميسجاف 2017400، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في 06/2024 وفقاً لإرشادات وزارة

الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة

الصحة: 108-58-29253-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة

بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص

لكلا الجنسين.