

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא
תרופה זו חייבת במרשם רופא בילדים בגיל 6 עד 12 שנים

לופamide

כמוסות

החומר הפעיל:

כל כמוסה מכילה: לופרמייד הידרוכולוריד 2 מ"ג (Loperamide hydrochloride 2 mg) (סעיף 2).
לרשותם המרכיבים הנוספים ראה סעיף 6. ראה גם 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' בסעיף 2.

קרוא בעיון את העלון עד סוף בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6. עליך לשימוש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון לעלון זה (סעיף 3). הייעוץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמנני המחלת (סימפטומים) מחמורים או אינם משתפרים לאחר 48 שעות.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשילטה והקלת על תסמנינים של שלשול חריף במבוגרים, מתבגרים וילדים מעל גיל 6 שנים.

קבוצה רפואיית: האטת תנועות המעיים (Antispasmodic).

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המופיעים בסעיף 6).
- אין לשימוש בתרופה לילדים מתחת לגיל 6 שנים.
- יש לך חום גבוה או דם בצוואר (סימנים של דיזינטירה חריפה).
- אתה סובל מדלקת בעור כגן דלקת כיבית (ulcerative colitis).
- אתה סובל מעיצירות או נפיחות באזורי הבطن (ביחוד ילדים עם התיבשות חמורה).
- יש לך שלשול הנגרם מטיפול אנטיביוטי.
- יש לך זיהום בעור הנגרם מחידק כגן סלמוני, שיגלה או קמפיקולובקטר.
- אתה נוטל תרופות המפחיתות את פעולות המעיים.

אחרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

• לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:

- אתה סובל ממחלה כבד.
 - אתה סובל שלשול הנמשך יותר מ- 48 שעות.
 - יש לך סבל מלבול לוכדים מסוימים.
 - אתה סובל שלשול חמור, היהת וגופך מאבד יותר נזלים, סוכרים ומלחים מהרגיל.
 - אם אתה בהריון הייעוץ ברופא לפני נטילת לופמייד.
 - אין ליטול תרופה זו בתקופת ההנקה.
- תרופה מטפלת בשלשול, אך לא בסיבות למצבך. כביש לך שלשול, גופך מאבד נזלים ומלחים רבים. על מנת להחזירם לרמות הרגילות מומלץ לשחות יותר נזלים. שאל את הרוקח לגבי תמייסות מיניות ייעודיות המכילות סוכר ומלחים. המלצה זו חשובה במיוחד בילדים ואוכלוסייה פגיעה או קשישים.
- התיעץ עם רופא אם יש לך היסטוריה של שימוש לרעה בתרופה.

- לופרמייד הוא סוג של אופיאיד הפעול ישירות על המעיים כאשר משתמשים בו כפי שהומלץ, אך עשוי לגרום לתופעות אופיאידיות אחרות כאשר עושים בו שימוש לא ראוי במינונים גבוהים. התמכרות נפתחה עם אופיאידים קבועה.
- דוח על שימוש לרעה ושימוש לא ראוי בלופרמייד, החומר הפעיל בלופמייד כמוסות. יש ליטול את התרופה רק למטרה לה היא נועדה (ראה סעיף 1). בשום אופן אין לעבור על המנה המקסימלית (ראה סעיף 3). בעיות לבבות חמורות (שכנותות תסמנינים של קצב לב מהיר או לא סדי) דוחו במטופליים שנטלו יותר מדי לופרמייד (החומרים הפעיל בתרופה).

- פסק מיד ליטול לופמייד והתייעץ עם הרופא שלך:
- אם אתה סובל מאידס ומבחן בונפיות בבטן.
 - אם אתה מבחין בקושי בעשיות צרכים (עצירות), בבטן נפocha ו/או כאב.
 - עליך לספר לרופא אם מצבך אינו משתפר או מחמיר לאחר יומיים או אם השלשול חוזרשוב ושוב.
- ילדים בגיל 6 עד 12 שנים:**
השימוש בלופמייד תחת מרשם רופא ופיקוח רפואי.

תגובהות בין תרופה/יות:

- אם אתה לוקח, או אם **לקחת לאחרונה**, **תרופות אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:
- קינידין (תרופה לטיפול בהפרעת קצב הלב או מלהה)
 - ריטונאבר (תרופה נוגדת נגיף ה- HIV)
 - קטוקונזול או אטרاكונזול (תרופות לטיפול בזיהומיים פטריאטיביים)
 - גמfibrozil (תרופה להפחחת רמת שומנים בدم)
 - דסמורטן (תרופה לטיפול בהשתנה מוגברת)
 - **תרופות אחרות המאיימות או מאטות את תנענות המעיים** (למשל **תרופות אנטיקולינרגיות**)

הרין והנקה:

אם את בהריון, חושבת שאת בהריון או מתכנתת הרין, יש להיעזר ברופא או ברוקח לפני נטילת לפמид. **הנקה:** אין ליטול תרופה זו בתקופת ההנקה. **כמויות קטנות של התרופה עלולות לחדר לחלב אם.** הייעץ ברופא בוגר בטיפול הולם עבורך.

נהיגה ושימוש במכונות:

התרופה עלולה לגרום לעייפות, לשינויים ולסחרחות, אתה עלול לחוש פחות ערני, לחוש תחושת עילפון ואף להתעלף. אין להנוג או להפעיל מכונות במידה ואתה חש תופעות אלו. **באשר לילדים,** יש להזהיר מרכיבת על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל כמותה מכללה כ-87 מ"ג לפחות. אם יש לך סבירות לSOCרים מסוימים, יש לידע את הרופא לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד תשמש בתרופה?

יש לשמש בתרופה לפי הוראות הרופא או הרוקח. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגר למינון ואופן הטיפול בתרופה.

יש לבלווע את הכמוסה עם מעט מים. אין מידע לגבי פתיחה ופיזור תוכן הכמוסה.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

ילדים החל מגיל 12 שנים, מתבגרים ומבוגרים: התחל את הטיפול בנטילת 2 כמוסות (4 מ"ג). אם יש צורך, המשך בנטילת כמותה אחת (2 מ"ג) לאחר כל יציאה נוזלית. המנה היומית המרבית הינה 8 כמוסות ליום (16 מ"ג).

ילדים בגיל 6 עד 12 שנים: המינון יקבע על ידי הרופא בלבד. **תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6.** יש להפסיק את השימוש בלופמייד כאשר הצואה חוזרת להיות רגילה, אם אין פועלות מעיים במשך 12 שעות או אם יש לך עצירות.

בכל אופן, אין ליטול לפמид מעל ל- 48 שעות. אם אין השפעה לאחר תקופה זו, הפסק את הטיפול והתייעץ עם רופא. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

אם נטלה בעוטות מינון גבוה יותר:

אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לחדר מינון של בית-חולים והבא את אריזת התרופה איתך. **תסמנין מינון יתר יכולם לכלול:** עלייה בקצב הלב, דופק לא סדיר, שינויים בדופק (لتסמינים אלה פוטנציאלי להיות בעלי השלכות חמורות ומסכנות חיים), יתכן ותרגיש נמנום, נזקשות שרירים או חוסר תיאום בתנועות הגוף, קשיי נשימה וקושי במתן שתן (אכזרית שתן). התגובה בילדים למנות גבוחות של לפמид הינה חזקה יותר בהשוואה למבוגרים. אם ליד מנת יתר או סובל מהתסמינים מעלה, פנה לרופא מיד.

אם שכחת ליטול את התרופה:

יש ליטול את התרופה רק במידה הצורך בהתאם להנחיות המופיעות לעיל.

אם שכחת ליטול את התרופה, יש ליטול את התרופה לאחר היציאה הנוזלית הבאה. אין ליטול מנה כפולה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל תרופה. **הרכב משקפיים** אם אתה זקוק להם. **אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בלופמייד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול אף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בלופמייד ולפנות מיד לרופא אם אתה חש באחת מתופעות הלואוי הבאות:

- תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000):
- . תגבות אלרגיות, עילפוא, התנפחות הפנים, האגרן והשפתים; צפופים לא מוסברים, קשיי נשימה, חರלה.
 - . התנפחות חמורה של הבطن או כאב בטן, עצירות חמורה.
 - . פריחה חמורה או גירוי חמור בעור עם אדומותיות, קילוף ו/או שלפוחיות (טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס). הופעת שלפוחיות בפה, בעיניים ובאיברי המין.
 - . אם אתה חווית חוויה אובדן הכרה או ירידת ברמת ההכרה (טלפון, תחושת טלפון או חוסר ערנות), נזקשות שרירים וחוסר תיאום בתנועות גוף.

תופעות לוואי שכיחות אין יהודעה (לא ניתן להעריך את שכיחות מהנתונים הנוכחיים):
cab בבטן העליונה, כאב בطن המקרים לגב, רגשות למגע בבטן, חום, דופק מהיר, בחילות, הקאות – תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של דלקת בלבלב (דלקת לבב חריפה).

יש להפסיק את השימוש בלופמיד ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם אתה חש באחת מתופעות הלואאי הבאות:
תופעות לוואי שאין שכיחות (מופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- . גירוד או סרפדת (חרלה)
- . כאב בטן או בטן נפוצה

תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- . קושי במתן שתן
- . עצירות חמורה
- . כיווץ אישונים (מיוזיס)
- . מתח שרירים (היפרטוניה)
- . תנעויות לא מתואמות (הפרעה בקואורדינציה)

תופעות לוואי נוספת נספota

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100):

- . בחילות, עצירות או גזם
- . כאב ראש
- . סחרחות

תופעות לוואי שאין שכיחות (מופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- . נמנום או ישנוויות
- . הקאות, בעיות עיכול
- . פריחה
- . יובש בפה

תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- . עיפות
- . בעיות בתיאום בתנועות הגוף.

ראה גם תת סעיף 'אם נטלה בטעות מינון יתר' בסעיף 3.
חלק מהתופעות עלולות להיגרם מהשלשללים, למשל חוסר נוחות באזור הבطن, בחילות, הקאות, גזם, יובש בפה, תחושת עיפות, ישנוויות וסחרחות.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואאי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעילון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי"
שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת, יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידיך תמנע הרעללה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין להשתמש בתרופה זו או אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותן חודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל- 25°C .
- אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם :

Lactose, pregelatinized maize starch, magnesium stearate, dioctyl sodium sulphosuccinate, titanium dioxide (E171), indigo carmine (E132), iron oxide black (E172), iron oxide yellow (E172), erythrosine (E127), gelatin.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?
כמוסות בצבע כחול/צהוב ובתוכן אבקה לבנה, באירוע מגשיות של 10 כמוסות.

היצן ובעל הרישום: מעבדות רפא בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301, ישראל.


שוק בלעדיה ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 99-37078-48-168-48

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
ערוך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

024004-

لمزيد נוסף על التصوير ولعلونين معודכנים בשפות עברית, ערבית
ואנגלית, سirkoo את הקוד הבא:

For further information about the medicinal product and
for updated consumer leaflets in English, Hebrew and
Arabic, please scan the following code:



ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשת לקבל עלון מודפס
לצורך בשפה האנגלית בכתבota הדואר
האלקטרוני RA@rafa.co.il או בטלפון מספר 02-5893939.

To receive a printed patient package insert in English
you may address a request to the registration owner by
email at RA@rafa.co.il or by calling 02-5893939.