

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

איןפנרייקס א.פ.ו. איז'אי.בי.

אבקה ותרחיף להכנת תרחיף להזרקה

כל מנה (0.5 מ"ל) מכילה:

(טוקסואיד דיפטריה)	diphtheria toxoid tetanus toxoid (T) pertussis toxoid (PT) filamentous haemagglutinin (FHA) pertactin (PRN)	– NLT 30 IU – NLT 40 IU – 25 mcg – 25 mcg – 8 mcg
(נגיף פוליו לא פעיל מסוג 1)	inactivated Polio Virus type 1	– 40 DU
(נגיף פוליו לא פעיל מסוג 2)	inactivated Polio Virus type 2	– 8 DU
(נגיף פוליו לא פעיל מסוג 3)	inactivated Polio Virus type 3	– 32 DU
(המופילוס אינפלואנזה מסוג B)	haemophilus influenzae type b polysaccharide (PRP) conjugated to tetanus toxoid as carrier protein	– 10 mcg – approximately 25 mcg

לרשימת החומרים הבaltı פיעלים ואלרגנים בתכשיר, ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פונה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

חיסון פועל נגד דיפטריה (קרמת), טטנוס (פלצת), שעתה, פוליו והמופילוס אינפלואנזה מסוג B, בתינוקות החל מגיל חודשים עד 5 שנים. מנת דחף עבור ילדים שחוSON בעבר בחיסון דיפטריה-טטנוס-פוליו, פוליו ואנטיגנים של המופילוס אינפלואנזה מסוג B.

קבוצה רפואיית: חיסונים משולבים חידקיים ונגיפים (Bacterial and viral vaccines combined)

כיצד החיסון עובד?
החיסון עוזר לגוף הילד לייצר הגנה משלו (נגדנים). הדבר יגן עליו בפני מחלות אלה.
איןפנרייקס א.פ.ו. איז'אי.בי. יגן רק בפני הווירוסים הנגאים על ידי הפתוגנים עוברים החיסון פותח.
כמו כל חיסון, איןפנרייקס א.פ.ו. איז'אי.בי. עשוי לא להגן באופן מלא על כל הילדים שחוSON.
ילדים עם מערכת חיסון מוחלשת (למשל עקב זיהום בנגיף ה-HIV [כשל החיסוני האנושי]) עשויים לא לקבל את מלאו התועלת של החיסון.
החיסון אינו יכול לגרום למחלת הפניה הוא מגן על ילך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש באינפנרייקס א.פ.ו. א.ץ.א.בי אם:

- ילדר רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6) או לנומיצין, פולימיקסין (סוגי אנטיביוטיקות) או לפורמאלדהייד. סימנים של תגובה אלרגית יכולים לכלול גרד בעור, פריחה, קוצר נשימה ונפיחות של הפנים והלשון.
- ילדר חוווה בעיות של מערכת העצבים תוך 7 ימים לאחר חיסון קודם נגד מחלת השעלת.
- ילדר זיהום חמוץ עם חום גבוה (מעל ל 38°C). זיהום קל כגון התקరות לא אמרות להוות בעיה. אולם דבר עם הרופא תחילת.

אין לתת את החיסון אם אחד מהרשומים מעלה נוגע לילדר. אם אין בטופ, דבר עם הרופא או הרוקח לפני שילדר מקבל את החיסון.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני שילדר מתחסן באינפנרייקס א.פ.ו. א.ץ.א.בי, ספר לרופא אם:

- לאחר חיסון קודם עם אינפנרייקס א.פ.ו. א.ץ.א.בי או חיסון אחר נגד מחלת השעלת, ילדר סבל מביעות כלשהן, ביחס:
 - חום גבוה (מעל 40 מעלות צלזיום) בתוך 48 שעות מההתחסנות.
 - התמוטטות או מצב דמי הלם בתוך 48 שעות מההתחסנות.
 - בכיר מתensus הנמשך 3 שעות או יותר בתוך 48 שעות מההתחסנות.
 - פרכוסים/התקפים עם או ללא חום גבוה, בתוך 3 ימים מההתחסנות.

• ילדר סובל ממחלה לא מאובנת או מתקדמת של המוח או מאפילפסיה שאינה בשליטה. לאחר שהמחלה תהיה בשליטה, ניתן החיסון.

• ילדר יש נתיה לפרכוסים/התקפים כתוצאה מחום או אם קיימת היסטוריה משפחתית לכך.

• ילדר יש בעיה של דימום או שנוצרות לו חבורות בקלות.

אם אחד מהרשומים מעלה נוגע לילדר (או אם אין בטופ), דבר עם הרופא או הרוקח לפני שילדר מקבל אינפנרייקס א.פ.ו. א.ץ.א.בי.

התעלפות עלולה להתחשך לאחר, ואפילו לפני, כל זריקה עם מחלת. لكن דוח לרופא או לאחות אם ילדר התעלף במהלך זריקה קודמת.

אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות

אם ילדר לוקח או אם לוקח לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם ילדר לוקח את אחד מה הבאים:

- תרופות נגד זיהומים המשפיעות על מערכת החיסון. אינפנרייקס א.פ.ו. א.ץ.א.בי עשוי לא לפעול מספיק טוב אם ילדר מטיל תרופות אלה.
- אינפנרייקס א.פ.ו. א.ץ.א.בי יכול להינתן באותו הזמן עם חיסוני ילדות אחרים. לאחר הזרקה אחר ישמש לכל חיסון.

הירון והנקה

התיעצץ עם הרופא או הרוקח לפני לקבלת כל תרופה שהיא.
אינפנרייקס א.פ.ו. א.ץ.א.בי לא ניתן לנשים בהירון או מניקות מאחר שהוא ניתן רק בילדים.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
התכשיר מכיל חומצה פורה-אמינו בנדזאית, פנילאלניין, נתרן ואשלגן
התכשיר מכיל חומצה פורה-אמינו בנזואית. זה עשוי לגרום לתגובה אלרגית ("יתכן
שבاיחור) ובאופן יוצא דופן, לעוות סمفוניות (ברונכוספזם).

תכשיר זה מכיל 0.036 מיקרוגרים פנילאלניין בכל מנתה. פנילאלניין עשוי להזיק אם יש לך
פנילקטונוריה (PKU), הפרעה גנטית נדירה שבה פנילאלניין מצטבר מחר שגוף לא יכול
לסלק אותו כראוי.

התכשיר מכיל פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, כלומר הוא מוגדר כתכשיר "לא
נתרן".

התכשיר מכיל פחות מ-1 מילימול אשלגן (39 מ"ג) למנה, כלומר הוא מוגדר כתכשיר "לא
אשלגן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל עבור ילך הוא בדרך כלל
שלוש זריקות בחצי שנה הראשונה לחץם, בהפרש של פחות בין המנות העוקבות.
הזריקה הראשונה יכולה להיות החל מגיל חדשניים.
ידעו אותך מתי ילך צריך לחזור לצורך הזריקה הבא.
אם זריקות נוספות (דוחף) נדרשות, הרופא יידע אותך. זריקות הדוחף ינתנו לפחות 6
חודשים לאחר מתן הזריקה الأخيرة של סדרת ההתחסנות הראשונית.

אין לעבר על המנה המומלצת.

- אינפנרייקס א.פ.וו. איז'.אי.בי מוזרק תמיד לתוך השיר, לרוב בירך.
- אסור להזריק את החיסון לכלי הדם.

אם הילד שלו מפספס מנתה
אם הילד שלו מפספס זריקה שנקבעה בתוכנית ההתחסנות, חשוב כי תקבע תור נוסף.
ודא כי הילד שלו משלים את כל תוכנית ההתחסנות. אם לא, יתכן כי ילך לא מוגן
באופן מלא כנגד המחלות.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעע שהנק נוטל תרופה. הרכב
משמעותם אם הנrk זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באינפנרייקס א.פ.וו. איז'.אי.בי עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק
מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות הלואוי הבאות עשוויות להתעורר עם חיסון זה:

תגובה אלרגית
אם ילך תגובה אלרגית, פנה **לרופא מיד**. הסימנים עשויים לכלול:

- נפיחות של הפנים
- לחץ דם נמוך

- קשיי נשימה
- הכהלה של העור
- אובדן הכרה

סימנים אלה מתחילה בדרך כלל זמן קצר מאוד לאחר קבלת הזריקה. קח את הילד שלך מיד לרופא אם הם מתרחשים לאחר שאתת עוזב את המרפאה. תגבות אלרגיות נדירות מאוד (עשויות להופיע بعد 1 מכל 10,000 מנות חיסון).

פנה לרופא מיד אם ילך חווה את אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

- התמוטטות
- אובדן הכרה
- מצב חוסר מודעות
- התקפים (פרכוסים)

אם אתה מבחין באחת התופעות המצוינות מעלה, **פנה לרופא מיד**. תופעות אלה נדירות מאוד (עשויות להופיע بعد 1 מכל 10,000 מנות חיסון).

תופעות לוואי אחרות כוללות:

- #### **תופעות לוואי שכיחות מאוד**
- אליה עלולות להופיע ב- **יוטר מ 1 מכל 10** מנות חיסון:
- אובדן תיאבון
 - חום השווה או הגבוה מ-38 מעלות צלזיוס
 - נפיחות, כאב ואדמומיות באזורי ההזרקה
 - בכיה לא רגיל
 - תחושת חוסר מנוחה
 - תחושת רגוניות
 - תחושת ישנוניות

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10** מנות חיסון:

- שלשול או הקאה
- גוש קשה באזורי ההזרקה
- נפיחות גדולה באזורי ההזרקה

תופעות לוואי שאין שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 100** מנות חיסון:

- בלוטות נפוחות בצוואר, בבית השחי או במפשעה (לייפדנוופטי)
- שיעול, זיהום בחזה (ברונכיטיס) או נחלת
- זיהום של דרכי הנשימה העליונות כגון התקרכרות, דלקת שקדים או דלקת גרון
- פריחה, פריחה גושית (חרחלת/סרפנדת)
- עייפות
- נפיחות של הגוף המוזרקת ולעיתים של המפרק הסמוך
- חום השווה או הגבוה מ-39.5 מעלות צלזיוס

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 1,000** מנות חיסון:

- פריחה עורית
- גרד

תופעות לוואי נדירות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 מנוט חיסון:

- בתינוקות שנולדו זמן רב לפני המועד (שבוע 28 של ההריון או מוקדם יותר) עשויים להתרחש מרווחים גדולים יותר מהרגיל בין הנשימות למשך 2 עד 3 ימים לאחר החיסון.
 - הפסיקת נשימה זמנית (אפניאה)
 - נפיחות של כל הגוף המזורקת
 - שלפוחיות באזורי הזרקה

מנות דחף של אינפנרייקס אי.פי.ו. או.אי.בי' עשויות להגדיל את הסיכון לתגובה באזור ההזרקה. הדבר כולל נפיחות באזור ההזרקה, נפיחות של כל הרגל או הזרע המזורקם ולעתים נפיחות בפרק הסמור. תשובות אלה לרוב מתחילהות תוך ימים מהזריקה ונעלמות לאחר ארבעה ימים.

אם הופעה תופעת לוזאי, אם אחת מתופעות הלוזאי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוזאי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אחר משרד הבריאות (www.health.gov.il).
המזהב לסייע במניעת כל תופעות לוואי, זו נא"י גוזה להשתפר.

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את פתרוֹתֶך?

- מונע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
 - אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
 - יש לאחסן במקדר (בין 2°C - 8°C). אין להקפי.
 - יש לאחסן באזינה המקורית על מנת להגן מפני.
 - אין להשליך תרופות לביב או לפסולות הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. עדדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיבים הפעילים התורופה מכילה גם:

Lactose, sodium chloride, medium 199 (containing amino acids (including phenylalanine), mineral salts (including sodium and potassium), vitamins (including para-aminobenzoic acid) and other substances), aluminium (as aluminium hydroxide), water for injection.

- כיצד נראה התגובה ומה תוכן האזיה: מרכיב האינפנרייקס א.פ.ו. (VPI) של החיסון אינפנרייקס א.פ.ו. איז' א.בי הוא תרחב לבן, מעט חלבני, המגיע במרקם המוקן לשימוש (0.5 מ"ל). מרכיב ה- איז' א.בי (Hib) של החיסון הוא אבקה המגיעה בבקבוקן נפרד. שני המרכיבים מעורבים יחד ממש לפני שילדר מקבל את הזריקה.

גדלי אРИזה: 1 - 10 מנות של בקבוקונים + מזרקים מוכנים לשימוש. יתכן כי מוחטים יצורפו לאРИזה.

יתכן שלא כל גDALי הארייזות משוקים.

- בעל הרישום: גלקסוסמיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בל"ג 25, פתח תקווה.
 - יצן: גלקסוסמיתקלין ביולוג'יקלס S.A., ריקנסרט, בלגיה.

- מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 112-53-29413
 - לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
- נערך במאי 2024.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכינותו של קבוצת החברות של GSK.
© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלו.

The following information is intended for healthcare professionals only:

Infanrix-IPV+Hib should not be mixed with other vaccines or medicinal products in the same syringe.


Upon storage of the DTPa-IPV suspension, a white deposit and clear supernatant can be observed in the syringe. This is not a sign of deterioration. The pre-filled syringe should be well shaken to obtain a homogeneous suspension. The DTPa-IPV suspension in the pre-filled syringe, the Hib powder in the vial and the reconstituted vaccine should be inspected visually for any foreign particulate matter and/or abnormal physical appearance prior to administration. In the event of either is observed, the vaccine should be discarded.

The vaccine is reconstituted by adding the entire contents of the pre-filled syringe of DTPa-IPV suspension to the vial containing the Hib powder. The mixture should then be injected immediately. If not used immediately, in-use storage times and conditions prior to use are the responsibility of the user and should normally not be longer than 8 hours at 2°C to 8°C (in a refrigerator).


The full reconstitution instructions are:

1. Shake the pre-filled syringe containing the DTPa-IPV suspension
2. Attach a needle to the pre-filled syringe of DTPa-IPV and inject the contents of the syringe into the Hib vial.
3. With the needle still inserted, shake the Hib vial vigorously and examine for complete dissolution.
4. Withdraw the entire mixture back into the syringe.
5. Replace the needle with an appropriate size needle for injection and administer the vaccine.
6. If the vaccine is not administered immediately, shake the solution vigorously again before injection.

Instructions for the pre-filled syringe



Hold the syringe by the barrel, not by the plunger.
Unscrew the syringe cap by twisting it anticlockwise.



To attach the needle, connect the hub to the Luer Lock Adaptor and rotate a quarter turn clockwise until you feel it lock.
Reconstitute the vaccine as described above.
Do not pull the syringe plunger out of the barrel. If it happens, do not administer the vaccine.

Disposal

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

Infanrix IPV-HIB PT V3C