

ויל' 2024

רופא/ה נכבד/ה,

רוקח/ת נכבד/ה,

חברת סנדוז פרמצבטיקה ישראל בע"מ מבקשת להודיע אתכם על עדכונים בעלון לרופא בעליוגים לצרכן עבורי:

Erelzi[®] 25

etanercept 25 mg / 0.5 ml

Solution for injection in pre-filled syringe

Erelzi[®] 50

etanercept 50 mg / 1 ml

Solution for injection in pre-filled syringe

Solution for injection in pre-filled pen

התווויות המאושרות לתרופות:

Rheumatoid arthritis

Erelzi is indicated for the treatment of active rheumatoid arthritis in adults when the response to disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) including methotrexate (unless contraindicated) has been inadequate. Erelzi can be used in combination with methotrexate in patients who do not respond adequately to methotrexate alone. Reducing signs and symptoms and inhibiting the progression of structural damage in patients with moderately to severely active rheumatoid arthritis. Etanercept, alone or in combination with methotrexate, has been shown to reduce the rate of progression of joint damage as measured by X-ray and to improve physical function.

Juvenile idiopathic arthritis

Treatment of polyarthritis (rheumatoid factor positive or negative) and extended oligoarthritis in children and adolescents from the age of 2 years who have had an inadequate response to, or who have proved intolerant of, methotrexate.

Treatment of psoriatic arthritis in adolescents from the age of 12 years who have had an inadequate response to, or who have proved intolerant of, methotrexate.

Treatment of enthesitis-related arthritis in adolescents from the age of 12 years who have had an inadequate response to, or who have proved intolerant of, conventional therapy.

Psoriatic arthritis

Treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous disease-modifying antirheumatic drug therapy has been inadequate. Etanercept has been shown to improve physical function in patients with psoriatic arthritis, and to reduce the rate of progression of peripheral joint damage as measured by X-ray in patients with polyarticular symmetrical subtypes of the disease.

Axial spondyloarthritis

Ankylosing spondylitis (AS)

Treatment of adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to conventional therapy.

Non-radiographic axial spondyloarthritis

Treatment of adults with severe non-radiographic axial spondyloarthritis with objective signs of inflammation as indicated by elevated C-reactive protein (CRP) and/or magnetic resonance imaging (MRI) evidence, who have had an inadequate response to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

Plaque psoriasis

Treatment of adults patients (18 years or older) with moderate to severe plaque psoriasis who are candidates for systemic therapy or phototherapy.

Paediatric plaque psoriasis

Treatment of chronic severe plaque psoriasis in children and adolescents from the age of 6 years who are inadequately controlled by, or are intolerant to, other systemic therapies or phototherapies.

השינויים העיקריים בעלון לרופא

...

4.8 Undesirable effects

...

Tabulated list of adverse reactions

The following list of adverse reactions is based on experience from clinical trials in adults and on postmarketing experience.

Within the system organ classes, adverse reactions are listed under headings of frequency (number of patients expected to experience the reaction), using the following categories: very common ($\geq 1/10$); common ($\geq 1/100$ to $< 1/10$); uncommon ($\geq 1/1,000$ to $< 1/100$); rare ($\geq 1/10,000$ to $< 1/1,000$); very rare ($< 1/10,000$); not known

System Organ Class	Very Common $\geq 1/10$	Common $\geq 1/100$ to $< 1/10$	Uncommon $\geq 1/1,000$ to $< 1/100$	Rare $\geq 1/10,000$ to $< 1/1,000$	Very Rare $< 1/10,000$	Frequency Not Known (Cannot be Estimated from Available Data)
Renal and urinary disorders				<u>Glomerulonephritis</u>		<u>Glomerulonephritis</u>

...

השינויים העיקריים בעולונים לצרכן: מזרק מוקן לשימוש, עט מוקן לשימוש

1. למה מועד ארלי? (שינוי נסоч ההתויה ללא שינוי תוכן)

ארלי מועדת לטיפול במבוגרים להתוויות הבאות:

- דלקת מפרקים שగונית (rheumatoid arthritis) פעילה במבוגרים בהם טיפול עם תרופות אנטי ריאומטיות המשפיעות על מהלך המחלת (DMARDs), כולל מתוטרקסאט, אינו מספק; ניתן להשתמש בארלי בשילוב עם מתוטרקסאט במטופלים אשר לא הגיעו במצב מספק לטיפול עם מתוטרקסאט בלבד.
 - דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis) פעילה ומתקדמת במבוגרים בהם טיפול עם תרופות אנטי ריאומטיות המשפיעות על מהלך המחלת (DMARDs) אינו מספק.
 - דלקת חוליות (axial spondyloarthritis)
 - דלקת חוליות ללא עדויות רדיוגראפיות (non-radiographic axial spondyloarthritis) פעילה וחריפה
 - במבוגרים שלא הגיעו במספק לטיפול עם תכשירים נוגדי דלקת שאים סטרואידים (Inflammatory Drugs)
 - דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis) חמורה ופעילה, במקרים אשר לא הגיעו במצב מספק לטיפול אחר.
 - ספחת רוביידית (plaque psoriasis) מתחנה או חמורה במקרים אשר מועדים לטיפול סיסטמי (מערכת) או טיפול באור. ארלי מועדת לטיפול בילדים ומתבגרים להתוויות הבאות:
 - דלקת מפרקים אידיאופתית של גיל הילדות (juvenile idiopathic arthritis):
 - רב שיגרון (polyarthritis) [גורם ריאומי חיבובי או שלילי] ואוליגו-ארטריטיס נרחבת (extended oligoarthritis)
 - בילדים ומתבגרים מגיל שנתיים אשר לא הגיעו במצב מספק לטיפול עם מתוטרקסאט או שאינם יכולים לקבל מתוטרקסאט.
 - דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis) בילדים ומתבגרים מגיל 12 אשר לא הגיעו במצב מספק לטיפול עם מתוטרקסאט או שאינם יכולים לקבל מתוטרקסאט.
 - דלקת מפרקים נלוית לאנטזיטיס (enthesitis related arthritis) (בילדים ומתבגרים מגיל 12 אשר לא הגיעו במצב מספק לטיפול או שאינם יכולים לקבל טיפול מוגבל אחר).
 - ספחת רוביידית (plaque psoriasis) חמורה כרונית בילדים ומתבגרים מגיל 6 אשר לא הגיעו במצב מספק, או שאינם יכולים לקבל לטיפול סיסטמי (מערכת), או טיפול באור.
- דלקת מפרקים אידיאופתית של גיל הילדות (juvenile idiopathic arthritis, JIA) בילדים מגיל שנייתם ומעלה ובמתבגרים, דלקת מפרקום ספחתית (arthritis psoriatic) במתבגרים מגיל 12 ובמבוגרים, במלות דלקתיות של חוליות עמוד השדרה: דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis) בדרגה חמורה באמבוגרים ו- BEDROGEL בדרגה חמורה בילדים ולטיפול בספחת רוביידית (plaque psoriasis) בדרגת חמורה בינונית עד קשה באמבוגרים. ובדרגה חמורה בילדים מגיל שש ומעלה ובמתבגרים.

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע بعد 1 מכל 1,000 אנשים):

- תגובה אלרגיות חמורות (כולל נפיחות מקומית חמורה של העור וצפופים)
- לימפומה (סוג של סרטן דם)
- לוקמיה (سرطان המשפיע על מערכת הדם ומה העצם)
- מלנומה (סוג של סרטן עור)
- שילוב של ספירה נמוכה של טסיות, תא דם לבנים ותאי דם אדומים
- הפרעות במערכת העצבים (המלחות בחולשת שרירים חמורה ותסמינים מסוימים הדומים לטרשת נפוצה או לדלקת בעצב הראייה או בחוט השדרה)
- שחפת

- הופעה של אי ספיקת לב גdstית
 - פרכוים
 - זאבת או תסמנות דמוית זאבת (תסמינים כגון פריחה ממושכת, חום, כאבי מפרקים ועייפות)
 - פריחה בעור העולולה להוביל לשלהפוחיות חמורות וקילוף העור
 - לפת (תגובה ליכנואידית - פריחה אדמדמה-סאלגלה מגדרת ואו קווים דמווי חוטים בצעע לבן-אפור על קרום ריר)
 - דלקת של החבד הנגרמת על ידי המערכת החיסונית של הגוף (הפטיטיס אוטואימוני, בחולים המקבלים גם מתוטרקסט
 - תופעת הלואן אינה שכיחה
 - הפרעות במערכת החיסון העוללות לפגוע בריאות, בעור, ובבלוטות הלימפה (סרקואידוזיס)
 - דלקת או הצטלקות של הריאות (בחולים המקבלים גם מתוטרקסט תופעת הלואן של הדלקת או ההצטלקות של הריאות אינה שכיחה)
 - **נק למסננים הזעירים בתור הכלויות הגורם לתפקוד קליתי לקוי (גלומרולונפריטיס, דלקת של פקיעות הכליה)**
- ...

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:

- סרטן עור מסווג קרצינומה על שם מרקל (Merkel cell carcinoma)
 - סר珂ומה על שם קפושי (Kaposi's sarcoma), סרטן נדר הקשור לביןם בנגיף ההרפס האנושי 8. סר珂ומה על שם קפושי מופיעיה לחוב כנוגעים סגולים על העור
 - פעילות מוגברת של תא דם לבנים הקשורים לדלקת (macrophage activation syndrome)
 - חזורה של הפטיטיס B
 - **נק למסננים הזעירים בתור הכלויות הגורם לתפקוד קליתי לקוי (גלומרולונפריטיס, דלקת של פקיעות הכליה)**
 - החמרה במצב הנקרא דרמטומיאוסיטיס (דלקת שרירים וחולשה המלווה בפריחה עורית)
-

בעל הרישום והיבואן וכתובתו:

סנדו זרמצטטיקה ישראל בע"מ, ת.ד. 9015, תל אביב, ישראל. אברטטס-ישראל בע"מ, ת.ד. 7126, תל אביב.

בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם בוצעו שינויים מהותיים בעalon לרופא ובעליונים לצרכן.

מלבד השינויים המפורטים, קיימים בעalon עדכונים נוספים, כולל עדכן בעל הרישום.

במידע נוסף, ניתן לעיין בעalon לצרכן המצורף להודעה זו.

ה.ulon לצורך נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

כמו כן ניתן לקבל את העalon המודפס על ידי פניה לבעל הרישום – סנדו זרמצטטיקה ישראל בע"מ

לעדכונכם בברכה,

מגר' דפנה סנדובסקי,

רוקחתת ממונה,

סנדו זרמצטטיקה ישראל בע"מ