

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986
يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبية

سولودنت غسول للفم محلول لغسل الفم



التركيبية:

كلوروكسيدين ديجلوكونات 0.2% w/v
كلوروكسيدين ديجلوكونات 0.2% w/v
(Chlorhexidine Diguconate 0.2% w/v)
المركبات غير الفعالة ومسيبات الحساسية في الدواء – انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" وفي البند 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة باعتماد حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء مخصص للاستعمال لدى متلقي العلاج الذين يزيد عمرهم عن 12 عامًا. إذا كان العمر دون ذلك فيجب مراجعة الطبيب قبل الاستعمال.
يجب عليك استعمال الدواء وفقًا للتعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟"
في هذه النشرة، استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقم أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

- لإعانة تكوّن اللويحة السنوية (الپلاك).
- للمساعدة في علاج ومنع التهاب اللثة (جينجيفيتيس).
- للمساعدة في الحفاظ على النظافة الصحية للفم.
- للاستعمال بعد الجراحات أو العلاجات السنوية، للتحكم على تعافي اللثة.
- لعلاج الفروخ، والتهابات الناجمة عن استعمال أطعم الأسنان، والتلوث الفطري في الفم.

الفصلية العلاجية: مظهر

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة كلوروكسيدين ديجلوكونات أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد الذين عمرهم دون 12 عامًا إلا بتوصية من الطبيب.
- يجب استعمال الدواء وفقًا لما مخصص له. لا يجوز بلعه. في حالة ملامسة المحلول للعينين أو للأنف، فيجب شطفهما جيدًا بالماء.
- في حالة نشوء رد فعل تحسسي شديد، عليك التوقف عن الاستعمال والتوجه فورًا لتلقي المساعدة. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- لا يجوز الاستعمال مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء" لمزيد من المعلومات.

- لا يجوز تبييض الأقمشة التي لامست غسول الفم.
 - قد يظهر تطايع (تصمغ) مؤقت للأسنان واللسان. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
 - قد يطرأ تغير على الإحساس بالطعم أو مستشعر باحساس بالذئع. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

ليس هناك ما يمنع استعمال الدواء إذا كنت حاملًا أو مرضعًا.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على المركب PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (يسمى أيضًا: Macrogolglycerol Hydroxystearate)، الذي قد يسبب تهيجًا في الجلد.
- يحتوي هذا الدواء على 5.656 ملل من الكحول في كل 100 ملل، وهذا التركيز يعادل 0.05656 ملل/ملل.

3. كيف تستعمل الدواء؟

- عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية استعمال الدواء.
- الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي: مرتان في اليوم.
- التهاب اللثة: يوصى بالاستعمال لمدة شهر.
- الفروخ في الفم والتلوث الفطري في الفم: يجب مواصلة الاستعمال لمدة يومين إضافيين بعد الشفاء.
- التهابات الفم الناجمة عن أطعم الأسنان: يجب تنظيف ونقع أطعم الأسنان في غسول الفم لمدة 15 دقيقة مرتين في اليوم.
- بعد الجراحات السنوية: يجب اتباع تعليمات طبيب الأسنان الخاص بك.

يُنصح بتجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال:

لا يجوز بلعه.

يجب الاستعمال فقط إذا كان قفل السداد موجودًا وبشكله الكامل قبل الفتح.

قد تفل محابن الأسنان بفعالية غسول الفم. بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، انطف فمك جيدًا بالماء وانتظر 5 دقائق قبل استعمال سولودنت غسول للفم. بدلًا من ذلك، بإمكانك استعمال غسول الفم أيضًا في وقت آخر من اليوم.

تعليمات الاستعمال:

- يجب تعبئة كأس القياس الصغيرة حتى خط 10 ملل، وشطف الفم جيدًا بالدواء لمدة دقيقة واحدة وبعد ذلك يجب بصق الدواء.
- إذا استمرت الأعراض، فراجع الطبيب.
- إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء بالخطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.
- لا يجوز تناول الأدوية في المتعة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
- إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سولودنت غسول للفم إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فورًا لتلقي المساعدة الطبية إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

- طفح جلدي
- انتفاخ في الفم أو في الوجه
- صعوبات في التنفس

قد تكون هذه الأعراض أعراضًا لرد فعل تحسسي خطير وندار جدًا.

يجب التوقف عن استعمال الدواء ومراجعة الطبيب إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

- تهيج في الفم
- ألم
- انتفاخ الجانب الداخلي للخدين

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) – أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل 1 من بين 10:

- تطايع (تصمغ) مؤقت للسان ويتلاشى عند إيقاف العلاج.
- أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:
- جفاف في الفم.
- تغير في حساسة الذوق، إحساس بالذئع، تنميل، أو نخز في اللسان عندما تستعمل غسول الفم لأول مرة. يزول ذلك عادة مع الاستمرار بالعلاج.
- إذا استمرت الأعراض – فيجب التوجه إلى الطبيب.
- أعراض جانبية مدى شيعها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيعها بعد):

- تطايع (تصمغ) مؤقت للأسنان وعادة يمكن إزالته عن طريق التنظيف بالفرشاة. يمكن منع حدوث هذا التطايع بواسطة الامتناع عن شرب الشاي، القهوة أو النبيذ الأحمر – خاصة ساعة بعد الاستعمال، وأيضًا عن طريق تنظيف الأسنان اليومي بالفرشاة وبمعجون الأسنان (انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟"). إذا بقي التطايع، فيمكن إزالته بواسطة التنظيف والصلصال لدى طبيب الأسنان أو أخصائية صحة الأسنان.
- بالنسبة لأطعم الأسنان – يمكن تنظيفها بواسطة مادة لتنظيف أطعم الأسنان.
- انتفاخ في غدد اللسان.
- تقشّر الجلد داخل الفم. لاجتتاب حدوث ذلك، يجب تخفيف غسول الفم بكمية مساوية من الماء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فطيق استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج اللوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25°C.
- يجب حفظه في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.
- يمكن استعمال الدواء لما لا يزيد عن 6 أشهر منذ فتح القنينة لأول مرة، ودون تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدوّن على العبوة.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على: Purified Water, Sorbitol Solution, Ethanol 95% (Alcohol 95%), PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Peppermint Oil

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنينة تحتوي على 300 ملل من محلول مطبق. تأتي مع كأس قياس صغيرة. حجم العبوة: 300 ملل.

المصنّع وصاحب الامتياز:

بن شمعون فلوريس برص، المنطقة الصناعية ميسجاف، برید متجول 2017400، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في 07/2024 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

163-01-36040-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.