

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تاكزيرو
300 ملغ / 2 ملل

محلول للحقن تحت الجلد في محقنة جاهزة للاستعمال

التركيب:

تحتوي كل محقنة جاهزة للاستعمال على 300 ملغ لاناديلوماب (lanadelumab 300 mg) في 2 ملل محلول

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر - انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه إلى الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء وُصف من أجلك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الطبية وحالتهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

تاكزيرو معد للاستعمال لدى المتعالجين من عمر سنتين وما فوق لمنع نوبات الوذمة الوعائية المتكررة، لدى المتعالجين الذين لديهم وذمة وعائية وراثية (HAE).

الفصيلة العلاجية: مستحضرات أخرى خاصة بمبحث الدم. أدوية تُستعمل لعلاج الوذمة الوعائية الوراثية.

ما هي الوذمة الوعائية الوراثية (HAE)

HAE هي حالة تنتقل عبر الوراثة لدى العائلات. في هذه الحالة، لا يحتوي دمك على كمية كافية من بروتين يدعى "مثبط C1" أو أن البروتين "المثبط لـ C1" لا يعمل بشكل سليم. تؤدي هذه الحالة إلى ارتفاع مستوى كاليكرين البلازما (plasma kallikrein)، الذي يؤدي أيضا إلى إنتاج مستويات عالية من براديكينين (Bradykinin) في دمك. تسبب مستويات عالية جدا من براديكينين إلى أعراض الوذمة الوعائية (HAE)، مثل تورم وآلم في:

- كفتي اليدين والقدمين
- الوجه، الجفنين، الشفتين أو اللسان
- الحنجرة (Throat)، الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس
- الأعضاء التناسلية

كيف يعمل تاكزيرو

تاكزيرو هو نوع من البروتين يعيق نشاط كاليكرين البلازما (plasma kallikrein). تساعد هذه الحالة على تقليل كمية براديكينين في دمك، وتمنع ظهور أعراض HAE.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة - لاناديلوماب، أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر قائمة المواد غير الفعالة في البند 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

- تحدّث مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال تاكزيرو.
- إذا كان لديك رد فعل تحسسي حاد تجاه تاكزيرو مع أعراض مثل الطفح، الضغط في الصدر، الصفير أثناء التنفس، أو النبض السريع، أخبر فوراً الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

الأطفال والمراهقون

لا يوصى باستخدام هذا المستحضر لدى الأطفال دون عمر سنتين لأنه لم يتم بحثه في هذه الفئة العمرية.

الفحوصات والمتابعة

أخبر الطبيب إذا كنت تستخدم تاكزيرو قبل أن تخضع لفحوص مخبرية لمعرفة إذا كان دمك يتخثر جيدا. وذلك لأن تاكزيرو في دمك قد يؤدي إلى تشويش في فحوص مخبرية معينة وقد يتسبب بالحصول على نتائج غير دقيقة.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. ليست هناك معلومات تشير إلى أن تاكزيرو يؤثر في أدوية أخرى أو أنه يتأثر بأدوية أخرى.

الحمل والإرضاع

إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء باستعمال تاكزيرو. هناك معلومات محدودة حول أمان استعمال تاكزيرو أثناء الحمل والرضاعة.

لتوخي الحذر، يُفضّل تجنّب استعمال لاناديلوماب أثناء الحمل والإرضاع.

الإرضاع

لا تتوفر معلومات بخصوص طرح لاناديلوماب في حليب الأم. تُطرح المستحضرات من هذه الفصيلة في حليب الأم خلال الأيام القريبة من الولادة، وبعد ذلك ينخفض مستواها. ولذلك لا يمكن استبعاد وجود المستحضر في حليب الأم في الأيام القريبة من الولادة. يمكن استعمال لاناديلوماب أثناء الإرضاع في حالة وجود حاجة سريرية.

السياقة واستعمال الماكينات

لهذا الدواء لا يوجد تأثير أو تأثيره ضئيل على القدرة على السياقة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمّة عن قسم من مركّبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليغرام من الصوديوم (23 ملغ) في كل ملل من المحلول، لهذا يُعتبر "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يُسوَّق تاكزيرو في محاقن معدّة للاستعمال لمرة واحدة جاهزة للاستعمال، كمحلول جاهز للاستعمال. يبدأ طبيب خبير بعلاج مرضى HAE بعلاجك، يديره، ويتابعه.

عليك استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. و عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي:

البالغون:

الجرعة الأولية الموصى بها هي 300 ملغ كل أسبوعين. إذا لم تتعرض لنوبة خلال فترة طويلة، فقد يُغيّر الطبيب جرعتك إلى 300 ملغ كل 4 أسابيع، لا سيما إذا كان وزن جسمك منخفضاً.

المراهقون من عمر 12 إلى 18 سنة:

الجرعة الأولية الموصى بها هي 300 ملغ كل أسبوعين. إذا لم تتعرض لنوبة خلال فترة طويلة، فقد يغير طبيبك جرعتك إلى 300 ملغ كل 4 أسابيع، لا سيما إذا كان وزن جسمك منخفضاً.

من عمر 6 إلى 12 سنة:

الجرعة الأولية الموصى بها هي 150 ملغ كل أسبوعين. إذا لم يكن للطفل نوبة خلال فترة طويلة، فقد يغير الطبيب جرعته إلى 150 ملغ كل 4 أسابيع.

من عمر 2 إلى 6 سنوات:

الجرعة الموصى بها هي 150 ملغ كل 4 أسابيع.

كيف يُحقن الدواء

إذا كنت تحقن الدواء وحدك أو إذا حقنهُ مُعالج لك، عليك أنت أو المُعالج أن تقرأ بعناية وتتبع التعليمات في البند 7، "تعليمات الاستعمال".

- تاكزيرو معد للحقن تحت الجلد ("حقنة تحت الجلد").
- للمتعالجين من عمر 12 سنة وما فوق يمكن حقن الدواء بشكل ذاتي أو يمكن أن يحقنه مُعالج لك.
- للمتعالجين من عمر سنتين حتى 12 سنة، يمكن إجراء الحقن من قبل الطاقم الطبي أو عن طريق مُعالج الطفل.
- على الطبيب، الصيدلي أو الممرضة أن يوضحوا لك كيف تحضّر وتحقن الدواء بشكل صحيح قبل أن تستعمل تاكزيرو للمرة الأولى. لا تحقن الدواء لنفسك أو لشخص آخر حتى تتلقى إرشاداً حول كيفية حقن الدواء.
- أدخل الإبرة في النسيج الدهني في البطن، الفخذ أو في الذراع العلوية.
- احقن الدواء في موقع مختلف في كل مرة.
- استعمال كل محقنة جاهزة للاستعمال من تاكزيرو مرة واحدة فقط.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى من المطلوب من تاكزيرو

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع الولد بالخطأ من هذا الدواء، توجهَ حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحباً معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا تم تفويت جرعة من تاكزيرو، احقن الجرعة في أسرع وقت ممكن، يجب جدولة الجرعة التالية وفقاً للتواتر بحيث يكون:

- الفارق مدته 10 أيام، على الأقل، بين جرعة وأخرى لدى المتعالجين الذين يتلقون جرعة كل أسبوعين.
 - الفارق مدته 24 يوماً على الأقل بين جرعة وأخرى لدى المتعالجين الذين يتلقون جرعة كل 4 أسابيع.
- إذا لم تكن متأكدًا متى عليك حقن تاكزيرو بعد الجرعة التي فوتتها، اسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

عليك المواظبة على العلاج كما أوصى الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن العلاج بهذا الدواء من دون استشارة الطبيب.
يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال تاكزيرو أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أي منها.

إذا اختبرت رد فعل تحسسي حاد تجاه تاكزيرو مع أعراض مثل: الطفح، الضغط في الصدر، الصفير أثناء التنفس، أو النبض السريع، توجه إلى الطبيب فوراً.

أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا اختبرت أعراضاً جانبية من الأعراض المفصلة التالية:

أعراض جانبية منتشرة جداً (قد تظهر لدى أكثر من متعالم واحد من بين 10 متعالجين):

- ردود فعل في موقع الحقن - تشتمل الأعراض على ألم، احمرار الجلد، كدمة، انزعاج، تورم، نزيف، حكة، تصلب الجلد، لسع، حُمى في موقع الحقن وطفح.

أعراض جانبية منتشرة (قد تظهر بتواتر حتى متعالم واحد من بين 10 متعالجين):

- ردود فعل أرجية تشتمل على الحكة، الانزعاج، واللسع في اللسان
- دوخة، الشعور بالإغماء
- طفح جلدي مرتفع (بارز)
- ألم في العضلات
- فحوص دم تشير إلى تغييرات في الكبد

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.
يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمارة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد وأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
 - لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين
- يجب تخزين المحقنة الجاهزة للاستعمال في الثلاجة (2°C-8°C). يُمنع التجميد. احتفظ بالمحقنة الجاهزة للاستعمال بعبوة الكرتون الأصلية حفاظاً عليها من الضوء.
 - يمكن تخزين المحقنة الجاهزة للاستعمال بدرجة حرارة أقل من 25°C لفترة محدودة مدتها 14 يوماً، ولكن شريطة ألا تخزنها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. لا تخزن تاكزيرو في الثلاجة ثانية بعد تخزينه بدرجة حرارة الغرفة.
 - عندما تقوم بإخراج محقنة واحدة جاهزة للاستعمال من عبوة تحتوي على عدة محاقن من الثلاجة، يجب عليك إعادة المحاقن الأخرى الجاهزة للاستعمال إلى الثلاجة إلى حين استعمالها.
 - يجب التخلص من المحقنة الجاهزة للاستعمال إذا لم يتم تخزينها في الثلاجة، تم تجميدها أو عدم حفظها في عبوتها الأصلية بحيث تكون محمية من الضوء.
 - يُمنع خض تاكزيرو.
 - يُمنع استعمال هذا الدواء إذا لاحظت علامات تشير إلى أنه طرأت تغييرات على مظهره مثلاً إذ ظهرت جزينات في المحقنة الجاهزة للاستعمال أو طرأت تغييرات على لون محلول الحقن.
 - يُمنع التخلص من أية أدوية في القمامة المنزلية أو مياه الصرف الصحي. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه الوسائل على الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على مواد غير فعالة:

water for injections, L-histidine, sodium chloride, sodium phosphate dibasic (dihydrate), citric acid monohydrate, polysorbate 80.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

يُسوق تاكزيرو كمحلول صاف، عديم اللون حتى لون مائل إلى الأصفر وهو معد للحقن ضمن محقنة جاهزة للاستعمال.

ممکن أن تحتوي عبوة المستحضر على:

- محقنة واحدة جاهزة للاستعمال (2 ملل/محقنة) في عبوة كرتون
- محقنتان جاهزتان للاستعمال (2 ملل/محقنة) في عبوة كرتون
- رزمة تحتوي على 3 علب كرتون، بحيث تحتوي كل عبوة كرتون على محقنتين جاهزتين للاستعمال (2 ملل/محقنة)، في المجلد 6 محاقن جاهزة للاستعمال.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه: تاكيدا إسرائيل م.ض.، شارع إفعال 25، بيتاح تكفا 4951125.


7. تعليمات الاستعمال

قبل حقن تاكزيرو، تأكد من أنك قرأت، فهمت، وتتبع مرحلة تلو الأخرى من التعليمات. اتصل بالطبيب، الصيدلي، أو الممرضة إذا كانت لديك أية أسئلة. لا يوصى بالحقن الذاتي لدى المتعالجين من عمر سنتين إلى 12 سنة.

- يُمنع خضن تاكزيرو.

أجزاء المحقنة الجاهزة للاستعمال تاكزيرو قبل الاستعمال (رسم "أ").


الرسم "أ": محقنة جاهزة للاستعمال من تاكزيرو



مرحلة 1: التحضير للحقن


أ. خذ ضمادة كحولية، طابطة قطنية أو ضمادة شاش، شريط لاصق ووعاء للتخلص من الأغراض الحادة (الرسم "ب"), وضعها جميعها على مسطح نظيف في منطقة مضاءة بشكل جيد. هذه المعدات غير مشمولة في عبوة تاكزيرو.

الرسم "ب": معدات



ب. أخرج عبوة تاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال من الثلاجة.

- يُمنع استعمال محقنة تاكزيرو إذا كان ختم ضبط الفتح مفتوحاً أو معطوباً.
- قبل تحضير الحقنة، أترك المحقنة الجاهزة للاستعمال حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة على الأقل.
- الدواء حسّاس لدرجات الحرارة الحارة. يُمنع استعمال مصادر تسخين مثل الميكروويف أو ماء ساخن من أجل تسخين المحقنة الجاهزة للاستعمال.
- يُمنع نزع غطاء الإبرة إلى أن تصبح جاهزاً لتنفيذ الحقن.



ج. افتح العبوة. أمسك جسم المحقنة وأخرج محقنة تاكزيرو الجاهزة للاستعمال من الصينية (الرسم "ج").

الرسم "ج": أخرج المحقنة الجاهزة للاستعمال



د. اغسل يديك بالماء والصابون (الرسم "د"). جفف يديك تماماً.

الرسم "د": غسل اليدين




- يُمنع لمس أي سطح أو منطقة من الجسم بعد غسل يديك قبل الحقن.

هـ. افحص تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على جسم المحقنة (الرسم "هـ").

- يُمنع استعمال محقنة تاكزيرو الجاهزة للاستعمال إذا كان تاريخ الصلاحية قد انقضى. إذا انتهت صلاحية محقنة تاكزيرو الجاهزة للاستعمال، قم برميها في وعاء للأغراض الحادة واتصل بالطبيب، الممرضة أو الصيدلي.


الرسم هـ: مكان تاريخ الصلاحية



و. افحص المحقنة الجاهزة للاستعمال تاكزيرو لوجود أي علامة لضرر وتأكد من أنّ الدواء عديم اللون حتى لون مائل للأصفر (الرسم "و").

- يُمنع استعمال المنتج إذا تواجد تلف في المحقنة – مثلا، تشقق.
- يُمنع استعمال تاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال إذا غيّر الدواء لونه، إذا كان متعكراً أو إذا تواجد داخله رقائق أو جزيئات.
- من المحتمل أن تلاحظ فقاعات داخل المحقنة الجاهزة للاستعمال تاكزيرو. إنها ظاهرة سليمة التي لا تؤثر على الجرعة.
- إذا لم تتمكن من استعمال المحقنة الجاهزة للاستعمال، توجه إلى الطبيب، الممرضة أو الصيدلي.

الرسم "و": افحص المحقنة الجاهزة للاستعمال




المرحلة 2: اختر وحضّر موقع الحقن

أ. يجب تنفيذ الحقن بالمحقنة الجاهزة للاستعمال في داخل المناطق التالية فقط (الرسم "ز"):

- البطن
 - الفخذ
 - الذراع العلوية (إذا قام الطبيب، الممرضة أو المُعالج بحقنك).
- يُمنع الحقن في منطقة في الجسم التي يكون فيها الجلد متهيجا، أحمرًا، يحتوي على كدمات أو فيه عدوى.
 - موضع موقع الحقن الذي تختاره يجب أن يكون بعيدًا 5 سم، على الأقل، عن أية نُدب أو عن السُرّة.

الرسم "ز": مناطق الحقن



- من المهم الحقن في مواقع حقن مختلفة من أجل الحفاظ على جلدك سليمًا. يجب تنفيذ كل حقنة جديدة بمسافة 3 سم على الأقل عن الموقع السابق الذي حقنت به.

ب. نظف موقع الحقن بضمادة كحولية واسمح للجلد أن يجف تمامًا (الرسم "ح")

- يُمنع التلويح بغرض أو نفخ الهواء على المنطقة النظيفة.
- يُمنع لمس هذه المنطقة مرّة أخرى قبل إعطاء الحقنة.

الرسم "ح": نظّف مكان الحقن




ج. أمسك جيدًا الجزء الأوسط لتاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال بواسطة يد واحدة، وباليد الثانية انزع غطاء الإبرة. تخلص من غطاء الإبرة في وعاء للأغراض الحادة (رسم "ط").

- يُمنع لمس أو دفع المكبس حتى تكون مستعدًا للحقن.
- لتجنب الإصابة من الإبرة يُمنع تغطية المحقنة الجاهزة للاستعمال بالغطاء مرّة أخرى.
- يُمنع استعمال المحقنة الجاهزة للاستعمال إذا سقطت وهي بدون غطاء.

- يُمنع استعمال المحقنة الجاهزة للاستعمال إذا تواجدت على الإبرة علامات تلف أو إذا كانت ملتوية.
- يُمنع لمس الإبرة أو أن تلامس الإبرة أي شيء.

الرسم "ط": انزع غطاء الإبرة



أ. تخلص من غطاء الإبرة في الوعاء للأغراض الحادة.

المرحلة 3: احقن تاكزيرو

أ. أمسك المحقنة الجاهزة للاستعمال بيد واحدة مثل قلم رصاص (الرسم "ي"). امتنع عن لمس الإبرة أو عن دفع المكبس.


الرسم "ي": طريقة إمساك المحقنة الجاهزة للاستعمال



ب. باليد الثانية، أقرص بطفية جلد، ما يقارب 3 سم، في موقع الحقن التنظيف.

- استمر بقرص الجلد حتى الانتهاء من الحقن وإخراج الإبرة (الرسم "ي أ").


الرسم "ي أ": أقرص طفية جلد ذات 3 سم



ج. بحركة واحدة، سريعة وقصيرة، ادفع الإبرة حتى النهاية داخل الجلد بزاوية 45 حتى 90 درجة. احرص على بقاء الإبرة في مكانها (الرسم "ب").

مهم: احقن مباشرة في طبقة الدهن تحت الجلد (الحقن تحت الجلد)


الرسم "ب": أدخل الإبرة



د. اضغط المكبس ببطء حتى يتوقف (الرسم "ج").

هـ. أخرج الإبرة ببطء مع الحفاظ على المحقنة بزاوية ثابتة. حرر طية الجلد بلطف.


الرسم "ج": ادفع المكبس حتى النهاية



مهم: يُمنع اخراج الإبرة حتى يتم حقن الدواء بالكامل وإفراغ جسم المحقنة.

في نهاية الحقن، يمكنك أن ترى أن السدادة موجودة في نهاية جسم المحقنة (الرسم "ي د").

الرسم "ي د": السدادة في نهاية جسم المحقنة



و. ضع طابطة قطنية أو ضمادة شاش على موقع الحقن إذا لزم الأمر، وانتظر مدة 10 ثوانٍ.

- يُمنع فرك منطقة الحقن. من المحتمل ظهور نزيف خفيف لديك. هذه ظاهرة سليمة.
- غط موقع الحقن بشريط لاصق، إذا كانت حاجة لذلك.
- ز. تخلص من تاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال المُستعملة.
- يجب التخلص من تاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال في وعاء للأغراض الحادة فورًا بعد الاستعمال (الرسم "ط و").
- من أجل تجنب خطر الإصابة بوخز من الإبرة، يُمنع تغطية الإبرة بغطاء.
- يُمنع إعادة استعمال المحقنة الجاهزة للاستعمال أو أي معدات أخرى المستعملة للحقن.
- يُمنع لمس الإبرة.

هام: يجب الحفاظ على وعاء القمامة الحادة بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال في كل حين.

الرسم "ط و": ارم في وعاء الأغراض الحادة



تم تحريرها في آذار 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 163-47-35885-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المنكر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.