

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ترزسپاير™

محلول للحقن

للحقن تحت الجلد

التركيب:

يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال (1.91 ملل) على:

تيزيبيلوماب 210 ملغ Tezepelumab 210 mg

للمركبات غير الفعالة، أنظر البند 6 - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ترزسپاير مخصص كعلاج داعم بالإضافة إلى العلاج الحالي للربو الشديد لدى الكبار والمراهقين فوق عمر 12 سنة.

الفصيلة العلاجية:

أدوية لعلاج تضيقات الطرق التنفسية.

ضد وحيد النسيلة ضد البروتين TSLP (*thymic stromal lymphopoietin*)

ما هو ترزسپاير

ترزسپاير عبارة عن دواء يحتوي على المادة الفعالة تيزيبيلوماب، التي تعتبر ضد وحيد النسيلة. إن الضد عبارة عن نوع بروتين مصمم للتعرف والإرتباط بموقع هدف معين في الجسم. موقع الهدف الخاص لـ تيزيبيلوماب هو بروتين يسمى TSLP (*thymic stromal lymphopoietin*). للبروتين TSLP دور هام في المسيرة الإلتهابية في الطرق التنفسية حيث يسبب أعراض وعلامات الربو. بواسطة حجب عمل البروتين TSLP، فإن ترزسپاير يساهم في تقليل المسيرة الإلتهابية وأعراض الربو.

(2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) لـ تيزيبيلوماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في البند 6). تحقق من الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً أو كنت تعتقد أن ذلك قد ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال ترزسپاير:

- ترزسپاير ليس دواء طوارئ. لا تستعمله لعلاج نوبات الربو المفاجئة.
- إذا لم يتحسن الربو لديك أو يتفاقم أثناء العلاج بالدواء، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة.

• **انتبه لأعراض رد الفعل التحسسي.** يمكن أن تسبب أدوية مثل ترسپاير ردود فعل تحسسية خطيرة لدى بعض الأشخاص. تختلف علامات ردود الفعل هذه ويمكن أن تشمل انتفاخ الوجه، اللسان أو الفم لديك، مشاكل في التنفس، نبض سريع، إغماء، دوار، الشعور بدوخة، شرى وطفح. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، **تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.** تحدث مع الطبيب حول كيفية تشخيص علامات مبكرة للحساسية وكيفية التعامل معها إذا ظهرت.

• **انتبه للعلامات المحتملة لحدوث تلوث خطير أثناء إستعمالك ترسپاير مثل:**

- سخونة، أعراض شبيهة بالإنفلوانزا، تعرق ليلي
- سعال لا يتوقف
- جلد مائل للون الأحمر، ساخن ومؤلم أو طفح جلدي مؤلم يترافق بحويصلات.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، **تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.**

إذا **وجد** لديك **حاليًا** تلوث خطير، **تحدث مع طبيبك**، قبل إستعمالك ل ترسپاير.

• **انتبه لأعراض المشاكل القلبية، مثل:**

- آلام في الصدر
- ضيق في التنفس
- شعور عام بعدم الراحة، وعكة أو تضرر جودة الحياة.
- دوار أو إغماء.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، **تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.**

• **إذا **وجد** لديك **تلوث** طفيلي (تسبب به طفيل) أو كنت تقطن في منطقة تنتشر فيها التلوثات الطفيلية (أو إذا كنت مسافرًا إلى مثل هذه المنطقة)، **تحدث مع طبيبك.** قد يضعف ترسپاير من قدرة جسمك على محاربة أنواع معينة من التلوثات الطفيلية.**

الأطفال والمراهقون

ترسپاير غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال دون عمر 12 سنة. لا تتوفر معلومات حول سلامة ونجاعة إستعمال هذا المستحضر لدى أطفال دون عمر 12 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، **إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.** بالأخص إذا كنت تستعمل:

- أخبر الطبيب إذا تلقيت مؤخرًا لقاحًا أو ستلقى لقاحًا في الفترة القريبة.

أدوية إضافية لعلاج الربو

لا تتوقف بشكل مفاجئ عن أدوية الوقاية من الربو بمجرد أن تبدأ العلاج بـ ترسپاير. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتناول الستيروئيدات (تسمى أيضًا كورتيكوستيروئيدات). يجب التوقف عن إستعمال هذه الأدوية بشكل تدريجي، تحت إشراف مباشر من طبيبك وبناءً على إستجابتك ل ترسپاير.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملًا أو مرضعة، إذا كنت تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، **إستشيري طبيبك قبل إستعمال الدواء.**

لا يجوز إستعمال ترسپاير أثناء الحمل إلا إذا أخبرك الطبيب خلاف ذلك. من غير المعروف ما إذا كان ترسپاير من شأنه أن يلحق الضرر بالجنين.

قد ينتقل ترسپاير إلى رضيعك عبر حليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، **يجب إستشارة الطبيب.**

السياقة وإستعمال الماكينات

من غير المحتمل أن يؤثر ترسپاير على قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي ترسپاير على أقل من 1 ميليومول من الصوديوم (23 ملغ) في كل مقدار دوائي قدره 210 ملغ، وبالتالي يعتبر خالياً من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال ترسپاير دائماً حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

الكبار والمراهقون فوق عمر 12 سنة:

المقدار الدوائي الموصى به هو 210 ملغ (حقنة واحدة) كل أربعة أسابيع. يُعطى ترسپاير بالحقن تحت الجلد.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

سيقرر كل من طبيبك أو الممرضة، ما إذا كان بإمكانك حقن الدواء بنفسك أو إذا كان بإمكان شخص آخر يعتني بك القيام بذلك من أجلك. إذا كان الأمر كذلك، فستلقى أنت أو سيتلقى الشخص الذي يُعالجك إرشاداً حول الطريقة الصحيحة لتحضير وحقن الدواء ترسپاير.

قبل إستعمال ترسپاير، عليك قراءة كامل "تعليمات الإستعمال" بالنسبة لـ ترسپاير قلم جاهز للإستعمال.

قم بذلك قبل كل عملية حقن، من الجائز أن المعلومات الواردة في "تعليمات الإستعمال" تحتوي على معلومات جديدة.

لا يجوز مشاركة قلم ترسپاير الجاهز للإستعمال أو إستعمال القلم أكثر من مرة واحدة.

إذا فوّت مقداراً دوائياً من ترسپاير

- إذا نسيت حقن مقداراً دوائياً من ترسپاير، قم بحقن المقدار الدوائي في أسرع وقت ممكن. وبعد ذلك، إحقن حقنتك التالية في الوقت المخطط له.
- إذا لم تلاحظ أنك فوّت مقداراً دوائياً وقد حان وقت المقدار الدوائي التالي بالفعل، إحقن المقدار الدوائي التالي كما هو مخطط له. لا تحقن مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي الذي فوّته.
- إذا لم تكن واثقاً متى عليك حقن ترسپاير، إسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

التوقف عن إستعمال ترسپاير

لا يجوز التوقف عن العلاج بـ ترسپاير دون التحدث عن ذلك أولاً مع الطبيب، الممرضة أو الصيدلي. قد يؤدي إيقاف أو تشويش العلاج بـ ترسپاير إلى عودة أعراض ونوبات الربو.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ترسپاير قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

ردود فعل تحسسية خطيرة

توجه فوراً لتلقي علاج طبي إذا كنت تعتقد أنه ربما يكون لديك رد فعل تحسسي. قد تحدث ردود الفعل هذه خلال ساعات أو أيام بعد الحقن.

غير معروفة (لا يمكن تقدير الوتيرة من البيانات المتوفرة)

- ردود فعل تحسسية، بما في ذلك رد فعل تحسسي خطير (تأق) الأعراض تشمل عادة:

- انتفاخ الوجه، اللسان، أو الفم لديك
- مشاكل في التنفس، نبض سريع
- إغماء، دوار، الشعور بدوخة

أعراض جانبية أخرى

شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين):

- ألم في الحنجرة
- طفح
- آلام في المفاصل
- أعراض في موقع الحقن (مثل إحمرار، إنتفاخ وألم)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو

عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

- يجب الحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية (في البراد). بعد الإخراج من البراد، يمكن حفظ ترسپاير في علبة الكرتون في درجة حرارة الغرفة (20 حتى 25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 30 يومًا. لا يجوز إعادته إلى البراد بعد أن تم تخزين ترسپاير في درجة حرارة الغرفة.
 - يجب حفظ ترسپاير في العلبة الأصلية حتى موعد الاستعمال، لحمايته من الضوء.
 - لا يجوز الخض، التجميد أو التعريض لمصدر حرارة.
 - لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. عند أي حالة من الشك، عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
 - لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.
 - لا تستعمل ترسپاير إذا سقط القلم، تضرر أو في حالة تلف ختم العلبة.
- لا يجوز إلقاء أي دواء إلى المجاري. يجب إستشارة الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على:

L-proline, Acetic acid glacial, Polysorbate 80, Sodium hydroxide, Water for injection

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

ترسپاير عبارة عن محلول شفاف حتى حليبي، عديم اللون حتى مائل للأصفر. يتوفر ترسپاير ضمن علبة تحتوي على قلم واحد جاهز للإستعمال.

المتيح:

أسترازينيكا AB، سودرتالية، السويد.

صاحب الإمتياز والمستورد:

أسترازينيكا (إسرائيل) م.ض.،
شارع عتيري بيدع 1، كفار سابا 4464301.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 171-59-37290

تم تحريرها في آذار 2024.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات الاستعمال للحقن الذاتي

ترزساير™

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للاستعمال

يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال (1.91 ملل) على:

تيزيبيلوماب 210 ملغ Tezepelumab 210 mg

للحقن تحت الجلد

قلم جاهز للاستعمال لمرة واحدة

تحتوي تعليمات الاستعمال هذه على معلومات حول كيفية حقن ترزساير.

قبل استعمال قلم ترزساير، سيوضح أحد أفراد الطاقم الطبي لك أو لشخص يساعدك كيفية استعمال القلم بشكل صحيح.

يجب قراءة 'تعليمات الاستعمال للحقن الذاتي' قبل أن تبدأ باستعمال محقنة ترزساير لأول مرة وفي كل مرة تتلقى فيها حقنة إضافية. قد تكون هناك معلومات جديدة. المعلومات التي تظهر هنا لا تحل محل الحاجة إلى التحدث مع الطبيب المعالج حول حالتك الطبية أو علاجك.

إذا كانت لديك أنت أو للشخص الذي يساعدك أي أسئلة، فيجب التحدث مع الطبيب المعالج.

معلومات مهمة يجب أن تعرفها قبل حقن ترزساير

يجب تخزين ترزساير في البراد في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية في العبوة الأصلية حتى تكون مستعداً لاستعمال الدواء. يمكن الاحتفاظ بـ ترزساير في العبوة الأصلية في درجة حرارة الغرفة (20 حتى 25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 30 يوماً. لا يجوز إعادة إلى البراد بعد تخزين ترزساير في درجة حرارة الغرفة. يجب التخلص من ترزساير الذي تم تخزينه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 30 يوماً (أنظر الخطوة 10).

لا يجوز استعمال قلم ترزساير الجاهز للاستعمال إذا:

- تم تجميد القلم
- سقط القلم أو تلف
- تلف ختم العبوة
- انقضى تاريخ انتهاء صلاحية الدواء.

لا يجوز خض القلم الجاهز للاستعمال.

لا يجوز المشاركة مع أي شخص أو معاودة استعمال القلم الجاهز للاستعمال.

لا يجوز تعريض القلم الجاهز للاستعمال لمصدر حراري.

في حالة حدوث إحدى الحالات الموضحة أعلاه، يجب رمي القلم في حاوية مقاومة للأشياء الحادة ويجب استعمال قلم جديد جاهز للاستعمال.


يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال من تزسپاير على مقدار دوائي واحد من تزسپاير للاستعمال لمرة واحدة فقط.

تجنب التسمم! يجب حفظ تزسپاير وكل دواء آخر بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.

يُعطى تزسپاير قلم جاهز للاستعمال بالحقن تحت الجلد فقط.

القلم الجاهز للاستعمال

لا يجوز نزع السدادة حتى تصل إلى الخطوة 6 من تعليمات الاستعمال هذه وتكون جاهزاً لحقن تزسپاير.



استعد لحقن تزسپاير

الخطوة 1 - نظم المعدات

- 1 قلم تزسپاير جاهز للاستعمال من البراد
- 1 ضمادة كحولية
- 1 قطن أو شاش
- 1 بلاستر صغير الحجم (ممكن)
- 1 حاوية مقاومة للأشياء الحادة (الرجاء أنظر الخطوة 10 - تخلص من القلم المستعمل)




الخطوة 2 - حضر قلم ترسپاير للاستعمال



ضع قلم ترسپاير خارج البراد لمدة 60 دقيقة أو أكثر قبل الحقن (كحد أقصى 30 يومًا)، من أجل أن يسخن قليلاً ويبلغ درجة حرارة الغرفة (بين 20 إلى 25 درجة مئوية).
قم بإبقاء قلم ترسپاير في علبة الكرتون لحمايته من الضوء.
لا يجوز تسخين القلم بأي طريقة أخرى. مثلاً، لا يجوز تسخينه في الميكروويف، بالماء الساخن، بالشمس المباشرة أو وضعه بالقرب من أية مصادر للحرارة.
لا تعد قلم ترسپاير إلى البراد بعد بلوغه درجة حرارة الغرفة. تخلص من قلم ترسپاير إذا مكث خارج البراد لأكثر من 30 يومًا.
لا يجوز نزع السداة حتى الخطوة 6.

الخطوة 3 - أخرج وتحقق من القلم الجاهز للاستعمال من العلبة

أمسك في منتصف القلم الجاهز للاستعمال لإخراج القلم الجاهز للاستعمال من اللوحة.



تاريخ انتهاء
الصلاحية

تحقق من أن القلم الجاهز للاستعمال ليس تالفًا. لا تستعمل القلم الجاهز للاستعمال إذا كان تالفًا.
تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية الذي على القلم الجاهز للاستعمال. لا تستعمل القلم الجاهز للاستعمال إذا انقضى تاريخ انتهاء الصلاحية.

أنظر إلى السائل من خلال نافذة المشاهدة في القلم. يجب أن يكون السائل الموجود في القلم رائقاً وعديم اللون أو مانلاً للأصفر.


لا تستعمل قلم ترسپاير الجاهز للاستعمال إذا كان السائل الموجود في القلم عكراً، إذا كان لونه مختلفاً عن الموصوف أعلاه أو إذا كان يحتوي على جزينات كبيرة. قد تلاحظ فقاعات هواء صغيرة في السائل الموجود في القلم. هذا سليم. ليست هناك حاجة لفعل أي شيء حيال ذلك.

حقن ترسپاير

الخطوة 4 - اختر مكان حقن ترسپاير


إذا كنت تحقن ترسپاير لنفسك، فإن موقع الحقن الموصى به هو الجزء الأمامي من فخذك أو الجزء السفلي من بطنك. لا تحقن لنفسك في الذراع. إذا تم إجراء الحقن من قبل شخص آخر، فيمكنه حقنك في أعلى الذراع، في الفخذ أو في البطن. بالنسبة لكل حقنة، اختر مكان حقن مختلف يبعد 3 سنتيمترات على الأقل من مكان الحقن الأخير.

- لا تحقن في مسافة حتى 5 سنتيمترات من سرتك.
- لا تحقن في مكان يكون فيه جلدك حساساً، مرضوضاً، فيه حراشف أو قاسياً.
- لا تحقن على ندبة أو جلد متضرر.
- لا تحقن من خلال الملابس.




الخطوة 5 - اغسل يديك ونظف مكان الحقن

- اغسل يديك جيداً بالصابون والماء.
- نظف منطقة الحقن بضمادة كحولية بحركات دائرية. دع المنطقة تجف في الهواء.
- لا تلمس المنطقة التي نظفتها قبل الحقن.
- لا تجفف المنطقة بالنفخ أو بأي تهوية.




الخطوة 6 - انزع السدادة

لا تقم بنزع السدادة حتى تكون جاهزاً للحقن.
أمسك جسم القلم بيد واحدة، واسحب بحذر وبشكل مستقيم السدادة بيدك الأخرى.
ضع السدادة جانباً للتخلص منها لاحقاً.
واقى الإبرة البرتقالي مكشوف الآن. واقى الإبرة البرتقالي مخصص لمنعك من لمس الإبرة.
لا تلمس الإبرة أو تضغط على واقى الإبرة البرتقالي بإصبعك.
لا تضع السدادة مرة أخرى على القلم. قد تقوم بتشغيل حقن القلم في وقت مبكر جداً أو قد تلحق ضرراً بالإبرة.




الخطوة 7 - احقن الدواء تزسپاير

اتبع التعليمات التي تلقيتها من فرد الطاقم الطبي حول كيفية الحقن. يمكنك قرص الجلد برفق في منطقة الحقن أو الحقن بدون قرص الجلد في منطقة الحقن.
اتبع التعليمات المفصلة في الصور التالية 1، 2، 3 و-4 من أجل حقن الدواء تزسپاير.
ستسمع أثناء الحقن أول 'نقرة' التي تشير إلى أن الحقن قد بدأ. اضغط وامسك القلم الجاهز للاستعمال لمدة 15 ثانية، حتى تسمع 'النقرة' الثانية.
لا تغير وضعية مسك القلم بعد بدء الحقن.




وضعية القلم في منطقة الحقن

- ضع واقى الإبرة البرتقالي للقلم بشكل مسطح على الجلد (بزاوية 90 درجة).
- تأكد من أنه يمكنك رؤية نافذة المشاهدة.




اضغط للأسفل بقوة حتى لا يكون بإمكانك رؤية واقى الإبرة البرتقالي.

- سوف تسمع 'النفرة' الأولى، هذا سيشير لك أن الحقن قد بدأ.
- سيتحرك المكبس البرتقالي للأسفل في نافذة المشاهدة أثناء الحقن.



امسك نحو الأسفل بقوة لمدة 15 ثانية.


- سوف تسمع 'نفرة' ثانية. سيشير لك هذا إلى انتهاء الحقن.
- سوف يملأ المكبس البرتقالي نافذة المشاهدة.




بعد الانتهاء من الحقن، ارفع قلم تزسباير بشكل مستقيم.

- سينزلق واقى الإبرة البرتقالي للأسفل، يغطي الإبرة وينغلق في مكانه.

الخطوة 8 - افحص نافذة المشاهدة




افحص نافذة المشاهدة للتأكد من حقن كل سائل الدواء. إذا لم يملأ المكبس البرتقالي نافذة المشاهدة بالكامل، فربما لم تحقن المقدار الدوائي من الدواء بالكامل. إذا حدث ذلك، أو إذا كانت لديك أسئلة أخرى، فاتصل بالطبيب المعالج.



الخطوة 9 - افحص موقع الحقن

قد تلاحظ قليلاً من الدم أو السائل في موقع الحقن. هذا سليم. اضغط برفق على مكان الحقن بالقطن أو الشاش حتى يتوقف النزف. لا تفرك منطقة الحقن. إذا لزم الأمر، قم بتغطية موقع الحقن بواسطة بلاستر.



التخلص من القلم

الخطوة 10 - التخلص من القلم المستعمل بأمان

يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال من تزيساير على مقدار دوائي واحد ولا يمكن معاودة استعماله مرة أخرى. لا تعد السدادة مرة أخرى إلى القلم.

ضع القلم المستعمل والسدادة في حاوية مقاومة للأشياء الحادة فوراً بعد الاستعمال. إرم المعدات الإضافية في سلة المهملات المنزلية.
لا يجوز التخلص من القلم المستعمل في سلة المهملات المنزلية.



تخلص من الحاوية المقاومة للأشياء الحادة وفقاً للتعليمات التي قدمها لك الطبيب أو الصيدلي.
لا تتخلص من الحاوية المقاومة للأشياء الحادة، في النفايات المنزلية، ما لم تكن هذه هي الإرشادات الخاصة بمنطقة إقامتك.
لا تقم بإعادة تدوير الحاوية المقاومة للأشياء الحادة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.