

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

מי-חמצן % 3 פלורייש

תמייסה

הרכב:

מי-חמצן w/w 3% (Hydrogen Peroxide 3% w/w)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 " מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווקח.

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשמש בתרופה?" בעalon זה. היועץ ברווקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמנני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי.

קבוצה רפואיית: תכשירים אנטיספטיים (מחטאים).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל מי-חמצן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 " מידע נוספת").
- על עור בריא ובעיניים.
- בחלי גוף סגורים ובפצעים מניטוחים.
- בחזקן.
- לחיטוי כלי ניתוח.

ażhorot miyohdot nognuot leshimosh batrufah:

תרופה זו עלולה להל宾 בדים.

איןטראקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקת, או אם לך חותם אחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרווקח.

הירiox והנקה:

אם את בהירiox, עשוי להיות בהירiox או מניקה, יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש. אין להשתמש בתמיסת מי חמצן בזמן הירiox או במהלך תקופת ההנקה אלא אם כן ניתנה הוראה מהרופא.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח.
אין לעبور על המנה המומלצת.

צורת הנטילה:

אין לבלווע! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:

יש לנגב את האזרור המיועד לחיטוי בצמר גפן ספוג בחומר.

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנרג נוטל תרופה.
הרכיב משקפיים אם הנרג זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש **במי-חמצן 3% פלורייש** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אפילו אחת מהן.

תופעות לוואי אפשריות:

היווצרות כוויות בגין העור ועל רקמות רכות שהופכות לאזרורים לבנים של רקמה מתה. הכאב המתלווה לכך יכולף לאחר כשבה.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Date exp) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C .
- לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש בתרופה עד תאריך התפוגה המופיע על גבי האזינה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Purified Water, Dibasic Sodium Phosphate, Phosphoric Acid

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

התרופה היא תמיישה צוללה וחסרת צבע בעקבות פלסטיון חוממים/לבנים.

גדלי אזינה מאושרים: 50 מ"ל, 100 מ"ל, 1000 מ"ל (1 ליטר).

"יתכן שלא כל גודלי האזינה משוקקים".

היצן ובטל הרישום:

בן שמעון פלאויש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ג. משגב 00 2017400, ישראל.

עלון זה נערך ב-07/2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

00-27020-38-057

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.