

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

زيبيان

أقراص ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص على:

بوپروپیون هیدروکلورید 150 ملغ

(bupropion hydrochloride 150 mg)

للقائمة المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية في المستحضر انظر الفقرة 6 – "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
الدواء غير مخصص لأشخاص دون عمر 18 سنة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

زيبيان مخصص للمساعدة على التوقف عن التدخين بمشاركة برنامج دعم شامل للتوقف عن التدخين.
نجاعة زبيان تكون عظمى في حال التزامك التام بالإقلاع عن التدخين. إستشر الطبيب أو الصيدلي حول العلاجات والدعم الإضافي اللذان يساعدانك على التوقف.

الفصيلة العلاجية:

أدوية مضادة الاكتئاب الأخرى (other antidepressants).

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ بوپروپیون أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6).
 - كنت تتناول أية أدوية أخرى تحوي بوپروپیون (مثل ويلبوترين XR لعلاج الاكتئاب)
 - كان لديك مشكلة طبية تسبب نوبات (اختلالات)، مثل الصرع، أو إذا كانت لديك سابقة لحدوث نوبات
 - لديك أو كان لديك في الماضي اضطراب في الأكل (مثلاً بوليميا أو قهم عصبي)
 - كان لديك مشاكل خطيرة في الكبد، مثل تشمع الكبد
 - كان لديك ورم في الدماغ
 - كنت من الذين يشربون بكثرة بشكل عام وتوقفت للتو عن شرب الكحول، أو تنوى التوقف عن الشرب أثناء تناولك زبيان
 - توقفت مؤخراً عن تناول أدوية للتهيئة أو أدوية لعلاج القلق (خاصة البنزوديازيبين أو أدوية مشابهة)، أو إذا كنت تنوى التوقف عن تناولها أثناء تناولك زبيان
 - لديك اضطراب ثانٍ للقطب (نبالات قصوى في المزاج)، وذلك لأن زبيان قد يؤدي لحدث عوارض هذا المرض
 - كنت تتناول أدوية لعلاج الاكتئاب أو لداء الپارکينسون المسممة مثبطات مونوامين أو كسيداز (MAOIs)، أو إذا تناولتها في الأيام الـ 14 الأخيرة. يمكن لهذه الفترة الزمنية أن تكون أقصر بالنسبة لأنواع معينة من MAOIs – سيومضي الطبيب حول هذا الأمر.
- ← إذا إنطبق عليك واحد مما ذكر، تحدث حالاً مع الطبيب، ولا تتناول زبيان.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو مع الصيدلي قبل إستعمال زبيان، وذلك لأن بعض الحالات تزيد من احتمال ظهور أعراض جانبية لديك (انظر أيضاً الفقرة 4).

متلازمة بروغادا

إذا كانت لديك حالة تسمى متلازمة بروغادا (متلازمة وراثية نادرة تؤثر على نظم القلب) أو إذا حدثت سكتة قلبية

أو موت مفاجئ في عائلتك.

الأطفال والمراهقون

زيبان غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

الكبار

نوبات (إختلاجات)

لقد تبين أن زيبان قد يسبب نوبات (إختلاجات) لدى 1 من بين 1,000 شخص (لمعلومات إضافية، انظر أيضاً "تقاعلات/ردود فعل بين الأدوية" في سياق هذا البند وفي الفقرة 4، "الأعراض الجانبية").
يكون إحتمال حدوث نوبات أكبر إذا:

• كنت تشرب الكثير من الكحول بشكل دائم

• كنت تعاني من السكري والذي من أجله تستعمل إنسولين أو أقراص

• حدثت لديك إصابة رأس شديدة أو سابقة لرضاة في الرأس

إذا كانت لديك نوبة (إختلاج) خلال العلاج:
— توقف عن تناول زيبان ولا تستمر في العلاج. راجع الطبيب.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بأعراض جانبية إذا:

• كانت لديك مشاكل في الكلية أو في الكبد

• تجاوز عمرك 65 سنة

في هذه الحالات، ستضطر لتناول مقداراً دوائياً أخفض (انظر الفقرة 3) وإجتناز فحص بشكل دائم أثناء تناولك زيبان.

إذا كانت لديك مشاكل نفسية

اختبر بعض الأشخاص الذين تناولوا زيبان هذيان أو أوهام - أفكار باطلة (رؤيه، سماع أو الإعتقاد بأمور غير موجودة)، أفكار مضطربة أو تقلبات قصوى في المزاج. من المحتمل حدوث هذه الأعراض بشكل أكبر لدى أشخاص كانت لديهم مشاكل نفسية من قبل.

إذا كنت تشعر بأنك مكتتب أو لديك ميول إنتحارية

يصبح بعض الأشخاص مكتتبين عندما يحاولون التوقف عن التدخين؛ في أحيان متباudeة جدا قد يفكروا بالإنتشار أو يحاولون الإنتحار. لقد أثرت هذه الأعراض على الأشخاص الذين تناولوا زيبان، خاصة في الأسابيع الأولى من العلاج.

إذا كنت تشعر بأنك مكتتب أو تفكّر بالإنتثار:

— اتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى على الفور.

إذا كنت تتناول أدوية للإكتاب

إن استعمال هذه الأدوية سوية مع زيبان قد يؤدي لمتلازمة السيروتونين، الأمر الذي قد يشكل خطراً على الحياة
(انظر "تقاعلات/ردود فعل بين الأدوية" في هذا البند)

ارتفاع ضغط الدم وزيبان

بعض الأشخاص الذين تناولوا زيبان تطور لديهم ضغط دم مرتفع الذي يتطلب العلاج. إذا كان لديك حالياً ضغط دم مرتفع، فهو قد يتفاقم. إن إحتمال حدوث ذلك يكون أكبر إذا كنت تستعمل أيضاً لصقات النيكوتين التي تساعدك في التوقف عن التدخين.

— سيتم فحص ضغط دمك قبل أن تتناول زيبان وأثناء العلاج، وخاصة إذا كان لديك حالياً ضغط دم مرتفع.
يجب أن يتم فحص ضغط دمك كل أسبوع، إذا كنت تستعمل أيضاً لصقات النيكوتين. من الجائز أن تضطر للتوقف عن تناول زيبان، في حال ارتفاع ضغط دمك.

تقاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو من المحتمل أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إبك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

قد تكون أكثر عرضة من المعتمد لحدوث نوبات اختلاجية إذا كنت تتناول:

- أدوية لعلاج الإكتئاب أو لعلاج مشاكل أخرى في مجال الصحة النفسية (أنظر بالإضافة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في بداية الفقرة 2)
- ثيوفيلين لعلاج الربو أو مرض رئوي
- ترامادول، مسكن قوي للالم
- أدوية ضد الملاريا
- المنشطات أو أدوية أخرى للسيطرة على الوزن أو على الشهية للطعام
- الستيرونيدات (عدا الكريمات والمستحلبات لمشاكل العينين والجلد)
- المضادات الحيوية المسماة كوينولونات
- أنواع معينة من مضادات الهيستامين المستعملة بالأخص لمعالجة الحساسية، والتي يمكن أن تسبب الميل إلى النوم
- أدوية لعلاج السكري.

← إذا كنت تتناول أية أدوية من هذه القائمة، تحدث مع الطبيب حالاً قبل أن تتناول زبيان (أنظر الفقرة 3 "يجب على بعض الأشخاص أن يتناولوا مقداراً دوائياً أخفض").

يمكن لأدوية معينة أن تؤثر على طريقة عمل زبيان أو تزيد من شيوع الأعراض الجانبية:

- أدوية للإكتئاب (مثل ديزيرامين، إيميرامين، باروكسيتين، سيتالوپرام، إسيتالوپرام، فينلافاكسين) أو لمشاكل أخرى في مجال الصحة النفسية (مثل رسبيريدون، تيوريدازين).
- قد يتفاعل زبيان مع أدوية معينة تستعمل لعلاج الإكتئاب وقد تشعر بتغيرات في الحالة النفسية (مثلاً عدم الهدوء، هذيان، سبات)، وتتأثيرات أخرى مثل سخونة جسم تتجاوز 38°C ، ارتفاع في نظم القلب، ضغط دم غير مستقر، منعكسات متزايدة، تصلب العضلات، فلة التنافس، وأعراض الجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال).
- أدوية لداء پاركينسون (مثل ليقودوليا، أمانتادين، أو أورفينادين)
- كاربامازيبين، فينيتوين، فالپروات، لعلاج الصرع أو مشاكل نفسية معينة
- بعض الأدوية المستعملة لعلاج السرطان (مثل سيكلوفوسفاميد، إيفوسفاميد)
- كلوبيدوجريل، المستعمل بشكل خاص لمعالجة مرض القلب أو السكتة
- بعض حاجبات بيتا (مثل مينوپرولول)، المستعملة بالأخص لمعالجة ارتفاع ضغط الدم
- أدوية معينة لإضطرابات نظم القلب (مثل پروپافينون، فيليكاينيد)
- ريتونافير أو إيفافيرينز، لمعالجة تلوث HIV.

← إذا كنت تتناول أية أدوية من هذه القائمة، إفحص مع الطبيب. يدرس الطبيب الفوائد والمخاطر من تناول زبيان بالنسبة لك، أو من شأنه أن يقرر تغيير المقدار الدوائي للدواء الآخر الذي تتناوله.

قد يقلل زبيان من نجاعة أدوية أخرى

- إذا كنت تتناول تاموكسيفين المستعمل لعلاج سرطان الثدي

← إذا كان هذا الأمر ينطبق عليك، بلغ الطبيب. من الجائز أن يحتاج الأمر الإنقال لعلاج آخر لإيقاف التدخين.

- إذا كنت تتناول ديچوكسين لعلاج القلب

← إذا إنطبق عليك هذا الأمر، بلغ الطبيب. من شأن الطبيب أن يدرس ملامعة الجرعة الدوائية من ديچوكسين.

من الجائز أن يحتاج الأمر تخفيض المقدار الدوائي لأدوية معينة عند توقفك عن التدخين

عندما تقوم بالتدخين، فإن المواد الكيماوية التي تُمتص في جسمك يمكن أن تضعف نجاعة بعض الأدوية. عند توقفك عن التدخين، من الجائز أن يحتاج الأمر تخفيض المقدار الدوائي لهذه الأدوية؛ وإلا، فأنت قد تقاسي من أعراض جانبية.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى، تحدث مع الطبيب إذا كنت تلاحظ أعراض جديدة تعتقد بأنها قد تكون أعراض جانبية.

استعمال الدواء والغذاء

انظر الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء؟".

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

بعض الأشخاص يجدون أنهم أكثر حساسية للكحول عندما يتناولون زبيان. من الجائز أن يوصيك الطبيب بعدم شرب الكحول أثناء تناول زبيان، أو محاولة شرب القليل قدر المستطاع. إذا كنت معتاداً على شرب كميات كبيرة

من الكحول، لا تتوقف فجأة، ذلك لأن هذا قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة اختلالات.

تأثير على فحوص البول

قد يخلّ زبائن بنتائج بعض فحوصات البول لتشخيص أدوية أخرى. إذا توجب عليك إجراء فحص بول، بلغ الطبيب أو المستشفى بأنك تتناول زبائن.

الحمل والإرضاع

لا تتناول زبائن إذا كنت في فترة الحمل، تعقدين بأنه من المحتمل أن تكوني حامل أو تخططين للحمل. إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. أفادت بعض الأبحاث، ولكن ليس جميعها، بزيادة الخطورة لحدوث عيوب خلقية، خاصة عيوب في القلب، وذلك لدى الرضع الذين تناولت أمهاتهم زبائن. من غير المعروف فيما إذا كانت بسبب إستعمال زبائن.

يمكن أن تنتقل مركبات زبائن إلى حليب الأم. إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول زبائن.

السياحة واستعمال الماكنات

بعض الأعراض الجانبية لـ زبائن، مثل الشعور بدوار أو الشعور بأنك توشك على الإغماء، قد تؤثر على تركيزك وعلى حكمك. في حال تأثرك بها، لا تقم بالسياحة أو تشغيل الماكنات.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائمًا. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الاعتيادي بشكل عام هو:

متى نبدأ وكم نتناول	• يجب بدء تناول زبائن وأنت ما تزال تدخن.		
• يجب تعيين تاريخ محدد للتوقف عن التدخين، يفضل جداً خلال الأسبوع الثاني من تناول الدواء.			
تناول قرصاً واحداً (150 ملغ)، مرة واحدة في اليوم.	الأيام 1 حتى 6	الأسبوع 1	يفضل جداً مواصلة التدخين أثناء تناول زبائن
يجب رفع المقدار الدوائي لـ قرص واحد، مرتين في اليوم، بفواصل قدره 8 ساعات على الأقل بينهما، وليس قريباً لوقت النوم.	اليوم 7		
إستمر بتناول قرص واحد، مرتين في اليوم.		الأسبوع 2	
توقف عن التدخين في هذا الأسبوع، في التاريخ المحدد للتوقف عن التدخين.			
يجب الاستمرار بتناول قرص واحد، مرتين في اليوم حتى 9 أسابيع.		الأسابيع 3 حتى 9	
إذا كنت غير قادر على التوقف عن التدخين بعد 7 أسابيع، يوصيك الطبيب بالتوقف عن تناول زبائن.			
من الجائز أن يشيروا عليك بالتوقف عن تناول زبائن بالتدريج، بعد 7-9 أسابيع.			

يجب على بعض الأشخاص أن يتناولوا مقداراً دوائياً أخفض لأن لديهم احتمال أكبر لظهور أعراض جانبية.

- إذا تجاوزت عمر 65 سنة
- إذا كان لديك مرض في الكبد أو في الكلية
- إذا كنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبات (أنظر "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" و "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية" في الفقرة 2)
- المقدار الدوائي الأعظمي الاعتيادي بالنسبة لك هو قرص واحد من عيار 150 ملغ مرة واحدة في اليوم.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

كيفية تناول الأقراص

يجب تناول أقراص زيبان بفواصل قدره 8 ساعات على الأقل بين مقدار آخر. لا تتناول قرص زيبان قريباً لوقت النوم - فهو قد يسبب صعوبات في النوم.

بإمكان تناول زيبان مع أو بدون طعام.

ابلع أقراص زيبان بأكملها. لا يجوز مضغها، سحقها أو شطرها - إذا قمت بفعل ذلك، فإن الدواء سيتحرر لداخل جسمك بشكل أسرع من اللازم. وهذا الأمر يقوى خطر الإصابة بأعراض جانبية، بما في ذلك نوبات.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت أقراضاً أكثر من اللازم، فمن الجائز أن يزيد إحتمال حدوث نوبة (اختلالات) أو أعراض جانبية أخرى.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء

← لا تتنظر، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، قم بتناول المقدار الدوائي التالي في وقته المعتمد وإنشر الطبيب.

لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

في حال توقفك عن تناول الدواء

من الجائز أن تضطر لتناول زيبان لفترة 7 أسابيع للحصول على تأثيره الكامل.

لا يجوز التوقف عن تناول زيبان بدون استشارة الطبيب قبل التوقف. من الجائز أن تضطر لتخفيف مقدارك الدوائي بشكل تدريجي.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول

فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال زيبان قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة

نوبات (اختلالات)

واحد تقريباً من كل 1,000 شخص الذين يتناولون زيبان لديه خطورة لحدث نوبة.

أعراض لنوبة تشمل تشنجات، وعادة فقدان الوعي. من عانى من نوبة، من الجائز أن يصبح مرتبك بعدها، ويمكن إلا يذكر ما حدث.

إن إحتمال حدوث نوبات يكون أكبر إذا كنت تتناول أكثر من اللازم من زيبان، إذا كنت تتناول أدوية إضافية، أو

إذا كنت معرضاً لخطورة أكبر من المعتمد لحدث نوبات (أنظر الفقرة 2).

← إذا كان لديك نوبة، بلغ الطبيب بعدما تنتعش. لا تعاود تناول زيبان.

ردود فعل تحسسية

في أوقات نادرة (بشيوع قدره حتى 1 من كل 1,000) قد تتطور لدى أشخاص ردود فعل تحسسية شديدة لـ زيبان.

علامات ردود الفعل التحسسية تشمل:

- طفح جدي (يشمل طفح حاك ودرني). قد تتطلب بعض أنواع الطفح علاجاً في المستشفى، خاصة إذا كنت تعاني بالإضافة لذلك أيضاً من ألم في الفم أو في العينين

- صفير غير عادي أو صعوبات في التنفس

- إنتفاخ في الجفنين، الشفتين أو اللسان

- آلام في العضلات أو في المفاصل

- إنهيار أو فقدان الوعي

← إذا وجدت لديك أية علامات لرد فعل تحسسي، اتصل بالطبيب حالاً. لا تتناول أقراص إضافية.

طفح جلدي لـ لوپوس (ذبة) أو تفاقم أعراض لوپوس
شیوع غير معروف - لا يمكن تقدير شیوع العرض من المعلومات المتوفرة عن أشخاص يتناولون زیبیان.
يعتبر لوپوس إضطراب في الجهاز المناعي الذي يؤثر على الجلد وأعضاء أخرى.
← إذا قاسيت من احتدامات لـ لوپوس، طفح جلدي أو آفات (خاصة في المناطق المعرضة للشمس) خلال استعمال زیبیان، اتصل بالطبيب فوراً، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى التوقف عن العلاج.

بشرور طفيلي معهم حاد

(Acute Generalised Exanthematous Pustulosis – AGEP)

شیوع غير معروف - لا يمكن تقدير شیوع العرض من المعلومات المتوفرة عن أشخاص يتناولون زیبیان.
تشمل أعراض AGEP الطفح مع بثور/حواللات مليئة بالقيح.
← إذا كان لديك طفح مع بثور/حواللات مليئة بالقيح، اتصل بالطبيب على الفور، لأنه قد تكون هناك حاجة للتوقف عن العلاج.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً

هذه قد تظهر لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص:

- صعوبات في النوم (تأكد من عدم تناولك لـ زیبیان قريباً لوقت النوم).

أعراض جانبية شائعة

هذه قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:

- الشعور باكتئاب (أنظر أيضاً "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" في الفقرة 2)
- الشعور بقلق أو بعدم هدوء
- صعوبات في التركيز
- الشعور برقة
- صداع
- غثيان، تقيؤ
- ألم أو إضطرابات أخرى في البطن (مثل إمساك)، تغيرات في مذاق الطعام، جفاف في الفم
- سخونة، دوار، تعرق، طفح جلدي (أحياناً بسبب حدوث رد فعل تحسسي)، حكة.

أعراض جانبية غير شائعة

هذه قد تظهر لدى حتى 1 من كل 100 شخص:

- حالات طنين في الأذنين، إضطرابات في الرؤية
- إرتفاع ضغط الدم (خطير أحياناً)، تورّد
- فقدان الشهية للطعام (فهم/أناروکسيا)
- الشعور بضعف
- ألم في الصدر
- الشعور بارتباك
- نبض سريع.

أعراض جانبية نادرة

هذه قد تظهر لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص:

- نوبات (أنظر بداية هذه الفقرة)
- تشنجات، تصلب العضلات، حركات لا إرادية، مشاكل في المشي أو في التنسيق (الرَّنْج)
- ضربات قلب
- إغماء، الشعور بإغماء عند الوقوف بشكل مفاجئ، نظراً لانخفاض ضغط دمك
- الشعور بسخط أو عداية؛ أحلام غريبة (تشمل كوابيس)
- فقدان الذاكرة
- وخز أو خدر

- ردود فعل تحسسية خطيرة؛ طفح مترافق بالام مفصلية وعضلية (أنظر بداية هذه الفقرة)
- التبول بشكل أكثر أو أقل من المعتاد
- طفح جلدي خطير الذي قد يظهر في الفم وفي أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن يشكل خطراً على الحياة
- تفاقم داء الصدفية (بقع سميكة لجلد أحمر)
- إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين (يرقان)، إرتفاع إنزيمات الكبد، التهاب الكبد
- تغيرات في مستويات السكر في الدم
- شعور بالإنفصال عن الواقع أو الغرابة (ضياع/ تبّدّ الشّخصيّة)؛ رؤية أو سماع أمور لا وجود لها (هذيان).

أعراض جانبية نادرة جداً

هذه قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10,000 شخص:

- قلة راحة، عدوانية
- الشعور بأشياء ليست صحيحة أو اعتقاد باطل (توهّم)؛ شكوكية مفرطة (جنون الارتياب)
- عدم السيطرة على التبول (سلس البول، تسرب بول)
- تساقط أو فقدان غير نمطي للشعر (تصلع).

أعراض جانبية شيوّعها غير معروفة

ظهرت أعراض جانبية أخرى لدى عدد قليل من الأشخاص، ولكن شيوّعها الدقيق غير معروف:

- أفكار عن إلحاق الضرر بالذات أو أفكار إنتحارية أثناء تناول زيتان أو حلاوة بعد التوقف عن العلاج (أنظر الفقرة 2، "قبل إستعمال الدواء"). إذا وجدت لديك مثل هذه الأفكار، اتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى بشكل فوري.
- فقدان الصلة بالواقع والخلل بكفاءة الحكم والقدرة على التفكير بصورة واضحة (ذهان)؛ أعراض أخرى قد تشمل هذيان وأو هام
- شعور مفاجئ بخوف رهيب (نوبة هلع)
- تأتأة
- إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (leucopenia) وإنخفاض في عدد الصفائح الدموية (thrombocytopenia)
- إنخفاض في نسبة الصوديوم في الدم (hyponatremia)
- تغير في الحالة النفسية (مثلًا عدم الهدوء، هذيان، سبات)، وتأثيرات أخرى مثل سخونة جسم تتجاوز 38°C، ارتفاع في نظم القلب، ضغط دم غير مستقر ومنعكسات متزايدة، تصلب العضلات، قلة التناسق وأعراض للجهاز الهضمي (مثلًا غثيان، نقيء، إسهال)، أثناء تناول زيتان سوية مع أدوية أخرى لعلاج الإكتئاب (مثل باروكسيتين، سيتالوپرام، إسيتالوپرام، فلوأوكسيتين وفينلافاکسين)

أعراض التوقف عن التدخين

يتأثر الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين في أحياناً متقاربة من الفطام عن النيكوتين. يمكن أن يظهر هذا الأمر أيضاً لدى الأشخاص الذين يتناولون زيتان. علامات الفطام عن النيكوتين تشمل:

- صعوبات في النوم
- رجفة أو تعرق
- الشعور بقلق، عدم هدوء أو إكتئاب، تترافق أحياناً بأفكار إنتحارية.
- تحدث مع الطبيب إذا كانت لديك أية تصرفات بما يتعلق بشعورك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلّغ عن أعراض جانبية

بإمكان التبلّغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلّغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلّغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية وتناول أيدي الأطفال

- وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25°C.
- يجب التخزين في العلبة الأصلية.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية لم تعد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً
لب القرص:

Microcrystalline cellulose, hypromellose 2910, cysteine hydrochloride monohydrate, magnesium stearate.

طلاء القرص:

Hypromellose 2910, titanium dioxide, macrogol 400, carnauba wax.

الحبر:

Iron oxide black, hypromellose.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
أقراص زيبان 150 ملغ هي أقراص بيضاء، مطلية، محببة من كلا الجانبين، دائرية تظهر عليها الطباعة "GX CH7" من جانب واحد، الأقراص معبأة في شرائط (بلسيترات)، ضمن علب كرتون تحوي 10، 30، 60 أو 100 قرص.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز: چلاكسوس ميثلكلادن (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: چلاكسوس ويلكام S.A., بورچوس، إسبانيا.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 118-29919-33-118.
- من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تحريرها في أيار 2024.

إن العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
© 2024 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Zyb PT v14B