

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**ג'נואט®**

**50 מ"ג/ג 500 מ"ג**

**טבליות**

כל טבליה מכילה:

Sitagliptin (as monohydrate phosphate) 50 mg, סיטגליפטין (כמונוהידראט פוספט) 50 מ"ג  
Metformin Hydrochloride 500 mg, מטפורמין הידרוכלוריד 500 מ"ג

**ג'נואט®**

**50 מ"ג/ג 850 מ"ג**

**טבליות**

כל טבליה מכילה:

Sitagliptin (as monohydrate phosphate) 50 mg, סיטגליפטין (כמונוהידראט פוספט) 50 מ"ג  
Metformin Hydrochloride 850 mg, מטפורמין הידרוכלוריד 850 מ"ג

**ג'נואט®**

**50 מ"ג/ג 1000 מ"ג**

**טבליות**

כל טבליה מכילה:

Sitagliptin (as monohydrate phosphate) 50 mg, סיטגליפטין (כמונוהידראט פוספט) 50 מ"ג  
Metformin Hydrochloride 1000 mg, מטפורמין הידרוכלוריד 1000 מ"ג

לרשימה של חומרים בלתי פעילים יש לפנות לסעיף 6 "מידע נוסף". ראה גם סעיף 2.7 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

### **קרא בעיון עלון זה עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.**

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על ג'נואט. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
- תרופה זו אינה מיועדת למתן בילדים מתחת לגיל 18 שנים.

### **1. למה מיועדת ג'נואט?**

#### **1.1 מהי ג'נואט?**

**קבוצה תרפויטית:** סיטגליפטין; מעכב האנזים DPP-4. מטפורמין; ביגואניד.

#### **1.2 למה משמשת ג'נואט?**

ג'נואט הינה טבליה המכילה 2 תרופות מרשם, סיטגליפטין פוספט (ג'נוביה®) ומטפורמין, אשר מורידות את הסוכר בדם. סיטגליפטין, הממתיך לקבוצת תרופות הנקראת מעכבי DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors), ומטפורמין, הממתיך לקבוצת התרופות ביגואנידים, פועלים יחד כדי לשלוט ברמות הסוכר בדם בחולים עם סוכרת מסוג 2, להם מתאים שילוב זה. ג'נואט בשילוב עם דיאטה מומלצת ותוכנית אימון גופני, מיועדת להורדת רמות הסוכר בדם בחולים עם סוכרת מסוג 2.

### **2. לפני השימוש בג'נואט**

#### **2.1 אין להשתמש בג'נואט אם:**

- יש לך סוכרת מסוג 1.
- יש לך תפקוד כלייתי ירוד באופן חמור (הרופא שלך יגדיר מהי רמת הפגיעה בתפקוד הכלייתי שלך).
- יש לך קטואצידוזיס סוכרתי (רמות מוגברות של קטונים בדם או בשתן שלך: סיבוך של סוכרת הכולל רמות סוכר גבוהות בדם, איבוד מהיר של משקל, בחילות או הקאות).

- הינך אלרגי לכל אחד מהמרכיבים בג'נואט (ראה סעיף 6 "מידע נוסף" לרשימה מלאה של המרכיבים בג'נואט). תסמינים של תגובה אלרגית חמורה לג'נואט עלולים לכלול: פריחה, כתמים בולטים אדומים על העור שלך (סרפדת) או נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון והגרון אשר עלולה לגרום לקושי בנשימה או בבליעה.

## 2.2 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בג'נואט

**לפני תחילת הטיפול בג'נואט, ספר לרופא שלך על כל הבעיות הרפואיות שלך, כולל אם:**

- יש לך או היתה לך דלקת של הבלב (פנקראטיטיס). אם היה לך פנקראטיטיס בעבר, לא ידוע אם יש לך סיכוי גבוה יותר ללקות בפנקראטיטיס בזמן נטילת ג'נואט (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי")
  - יש לך בעיות בכליה
  - יש לך בעיות בכבד
  - יש לך או היו אבנים בכיס המרה
  - יש לך רמות גבוהות של טריגליצרידים בדם
  - יש לך אי ספיקת לב
  - הינך שותה אלכוהול לעיתים קרובות מאד, או שותה הרבה אלכוהול תוך זמן קצר. אם הינך או היית מכור לאלכוהול הינך עומד לקבל זריקת צבע או חומרי ניגוד לצורך צילום רנטגן. ייתכן ויהיה צורך להפסיק נטילת ג'נואט לזמן קצר. היוועץ ברופא שלך מתי עליך להפסיק ליטול ג'נואט ומתי עליך להתחיל ליטול ג'נואט שוב. (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי")
  - יש לך רמות נמוכות של ויטמין B<sub>12</sub> בדם
  - הינך בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון (ראי סעיף 2.6 "היריון, הנקה ופוריות")
  - הינך מניקה או מתכננת להניק (ראי סעיף 2.6 "היריון, הנקה ופוריות")
  - הינך אישה שלא עברה את גיל המעבר (טרום גיל המעבר) שאין לה וסת סדירה או כלל (ראי סעיף 2.6 "היריון, הנקה ופוריות")
- הפסק ליטול ג'נואט וצור קשר עם הרופא שלך מיד אם יש לך כאב באיזור הבטן שלך שהינו חמור ושאינו חולף. ייתכן ותרגיש את הכאב עובר מהבטן עד הגב שלך. הכאב יכול להופיע עם או ללא הקאה. אלה עלולים להיות תסמינים של דלקת בבלב.

## 2.3 בדיקות ומעקב

בדוק את הסוכר שלך בדם כפי שהורה לך הרופא.  
הרופא שלך ינטר את הסוכרת שלך על ידי בדיקות דם סדירות, הכוללות בדיקת רמות הסוכר שלך בדם וההמוגלובין A1C שלך.  
הרופא שלך עלול לעשות לך בדיקות דם כדי לבדוק את רמות ויטמין B<sub>12</sub>.

## 2.4 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**  
במיוחד אם אתה לוקח:

- טופירמט (לטיפול בפרקוסים ומיגרנות)
- אצטאזולאמיד (לטיפול בבצקת, גלאוקומה ומחלת ים)
- דולוטגראביר (לטיפול בזיהום של HIV)
- סימטידין (לטיפול באולקוס)
- ראנולזין
- ואנדטניב

ג'נואט עלולה להשפיע על אופן פעולתן של תרופות אחרות, ותרופות אחרות עלולות להשפיע על אופן פעולתה של ג'נואט.  
הכר את התרופות שהינך נוטל. שמור רשימה של התרופות שלך והראה אותה לרופא שלך ולרוקח כשהינך מקבל תרופה חדשה.

## 2.5 שימוש בג'נואט ומזון

יש ליטול ג'נואט עם הארוחות על מנת לסייע בהפחתת הסיכוי שלך לסבול מהפרעות במערכת העיכול.

## 2.6 היריון, הנקה ופוריות

- אם הינך בהיריון או מתכננת להרות: לא ידוע אם ג'נואט תפגע בעובר שלך. אם הינך בהיריון, דברי עם הרופא שלך בנוגע לדרך הטובה ביותר לשלוט ברמות הסוכר שלך בדם בזמן ההיריון
- אם הינך מניקה או מתכננת להניק: לא ידוע אם ג'נואט תעבור לחלב האם שלך. דברי עם הרופא שלך על הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך אם הינך נוטלת ג'נואט
- אם הינך אישה שלא עברה את גיל המעבר (טרום גיל המעבר) שאין לה וסת סדירה או כלל: ג'נואט יכולה לגרום אצל אישה לשחרור ביצית מהשחלה (ביוץ). זה יכול להגדיל את הסיכוי שלך להיכנס להיריון. ספרי לרופא שלך מיד אם הינך נכנסת להיריון בעת נטילת ג'נואט.

## 2.7 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

ג'נואט מכילה נתרן. תרופה זו מכילה פחות מ 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לכל טבליה, כלומר למעשה 'נטולת נתרן'.

### 3. כיצד תשתמש בג'נואט?

יש להשתמש בג'נואט תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

הרופא שלך יאמר לך כמה טבליות ג'נואט ליטול ומתי עליך ליטול אותן.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

הרופא שלך עשוי לשנות את המינון של ג'נואט במידת הצורך.

יש ליטול ג'נואט עם הארוחות על מנת לסייע בהפחתת הסיכוי שלך לסבול מהפרעות במערכת העיכול.

הרופא שלך עשוי לומר לך ליטול ג'נואט יחד עם תרופות מסויימות אחרות לסוכרת. סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה) עלול לקרות לעיתים קרובות יותר כאשר נוטלים ג'נואט עם תרופות מסויימות אחרות לסוכרת (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

תרופה זו אינה מיועדת למתן בילדים מתחת לגיל 18 שנים.

אין מידע לגבי כתישה, חציה, או לעיסה של טבליות אלה. ספר לרופא שלך אם אינך יכול לבלוע את טבליות ג'נואט בשלמותן.

במידה ויש לך ירידה בתפקודי כליות, ייתכן והרופא ירשום לך מינון נמוך יותר.

- אם נטלת יותר מדי ג'נואט, דבר עם הרופא שלך מיד
- אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים ולהביא אריזת התרופה איתך
- אם החמצת נטילת מנה, קח אותה ברגע שנזכרת. אם לא נזכרת עד שהגיע הזמן ליטול את המנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה וחזור ללוח זמני הנטילה הרגיל. אין ליטול 2 מנות של ג'נואט באותו זמן

ייתכן ותצטרך להפסיק ליטול ג'נואט לזמן קצר. צור קשר עם הרופא שלך לקבלת הוראות אם הינך:

- מיושב (איבדת יותר מדי נוזלי גוף). התייבשות יכולה לקרות אם הינך חולה וסובל מהקאות חמורות, שלשולים או חום, או אם הינך שותה הרבה פחות נוזלים מהרגיל
- מתכנן לעבור ניתוח
- עומד לקבל זריקת צבע או חומר ניגוד לצורך צילום רנטגן. (ראה סעיף 2.2 "אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בג'נואט" וסעיף 4 "תופעות לוואי")

כאשר הגוף שלך נמצא תחת סוגים שונים של לחץ כגון חום, טראומה (כגון תאונת דרכים), זיהום או ניתוח, כמות התרופה לסוכרת שהינך זקוק לה עשויה להשתנות. ספר לרופא שלך מיד אם יש לך כל אחד מהמצבים הללו ופעל לפי הוראות הרופא שלך.

המשך בדיאטה שנרשמה לך ובתכנית הפעילות הגופנית בזמן נטילת ג'נואט.

דבר עם הרופא שלך כיצד ניתן למנוע, לזהות ולטפל בסוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה), בסוכר גבוה בדם (היפרגליקמיה), ובבעיות שיש לך בגלל הסוכרת שלך.

המשך ליטול ג'נואט כל עוד הרופא שלך אומר לך לעשות זאת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא שלך.

**אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש במוצר זה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בג'נואט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

ג'נואט עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל:

**4.1 חמצת לקטית. מטפורמין, אחת התרופות בג'נואט, עלולה לגרום למצב נדיר (יכולה להופיע בעד 1 מתוך 10000 משתמשים) אך חמור הנקרא חמצת לקטית (lactic acidosis) (הצטברות של חומצה בדם), אשר עלול לגרום למוות. חמצת לקטית הינה מצב חירום רפואי המחייב טיפול בבית חולים.**

הפסק ליטול את ג'נואט ודבר עם הרופא שלך מיד, אם יש לך כל אחד מהתסמינים הבאים, אשר עלולים להיות סימנים של חמצת לקטית (lactic acidosis):

- הינך מרגיש קור בידיים או בכפות הרגליים שלך
- הינך מרגיש סחרחורת או מסוחרר
- יש לך דופק איטי או לא סדיר
- הינך מרגיש מאד חלש או עייף
- יש לך כאבי שרירים לא רגילים (חריגים)
- יש לך קשיי נשימה
- הינך מרגיש ישנוני או מנומנם
- יש לך כאבים בבטן, בחילות או הקאות

מרבית האנשים שהיתה להם חמצת לקטית עם מטפורמין סובלים מדברים אחרים, אשר בשילוב עם מטפורמין הובילו לחמצת לקטית. ספר לרופא שלך אם יש לך כל אחד מהבאים, מכיוון שיש לך סיכוי גבוה יותר לפתח חמצת לקטית (lactic acidosis) עם ג'נואט אם אתה:

- סובל מבעיות חמורות בכליה או שהכליות שלך מושפעות מבדיקות רנטגן מסויימות שנעשה בהן שימוש בחומר צבע בהזרקה
- סובל מבעיות בכבד
- שותה אלכוהול לעיתים קרובות מאד או שותה כמות אלכוהול גדולה תוך זמן קצר
- סובל מהתייבשות (איבודת כמות גדולה של נוזלי גוף). הדבר עלול לקרות אם הינך חולה עם חום, הקאות או שלשולים. התייבשות יכולה לקרות גם אם אתה מזיע הרבה במהלך פעילות או פעילות גופנית ואינך שותה מספיק נוזלים
- עובר ניתוח
- סובל מהתקף לב, זיהום חמור או שבץ
- בן 65 שנים או יותר

הדרך הטובה ביותר להימנע מבעיה של חמצת לקטית ממטפורמין היא לספר לרופא שלך אם יש לך כל אחת מהבעיות ברשימה למעלה. ייתכן והרופא שלך יחליט להפסיק לך את ג'נואט לזמן מה אם יש לך כל אחד מהדברים הללו.

#### 4.2 פנקראטיטיס (דלקת של הבלב) אשר עלולה להיות חמורה ולהוביל למוות.

בעיות רפואיות מסויימות מעלות את הסיכוי שלך לחלות בפנקראטיטיס. הפסק ליטול ג'נואט וצור קשר עם הרופא שלך מיד אם יש לך כאב באיזור הבטן שלך שהינו חמור ושאינו חולף. ייתכן ותרגיש את הכאב עובר מהבטן עד הגב שלך. הכאב יכול להופיע עם או ללא הקאה. אלה יכולים להיות תסמינים של דלקת בבלב.

#### 4.3 אי ספיקת לב. אי ספיקת לב פירושו שליבך אינו שואב דם בצורה טובה דיה.

לפני שהינך מתחיל ליטול ג'נואט, ספר לרופא שלך אם אי פעם היה לך אי ספיקת לב או יש לך בעיות עם הכליות שלך.

צור קשר עם הרופא שלך באופן מיידי אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים:

- קוצר נשימה מתגבר או בעיה לנשום, במיוחד כאשר אתה שוכב
- נפיחות או אגירת נוזלים, בעיקר בכפות הרגליים, קרסוליים או רגליים
- עליה מהירה במיוחד במשקל
- עייפות לא רגילה

אלו עלולים להיות תסמינים של אי ספיקת לב

#### 4.4 בעיות בכליות (שכיחות אינה ידועה), המצריכות לפעמים דיאליזה.

4.5 ויטמין B<sub>12</sub> נמוך (מחסור בוויטמין B<sub>12</sub>). שימוש במטפורמין לפרקי זמן ארוכים עלול לגרום לירידה בכמות ויטמין B<sub>12</sub> בדם שלך, במיוחד אם היו לך בעבר רמות נמוכות של ויטמין B<sub>12</sub>.

4.6 סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה). שכיח (יכול להופיע בעד 1 מתוך 10 אנשים). אם הינך נוטל ג'נואט עם תרופה נוספת אשר עלולה לגרום לסוכר נמוך בדם, כגון סולפונילאוריאה או אינסולין, הסיכון שלך לסבול מסוכר נמוך בדם הוא גבוה יותר. ייתכן ויהיה צורך להוריד את המנה של התרופה מסוג סולפונילאוריאה או אינסולין בזמן נטילת ג'נואט. סימנים ותסמינים של סוכר נמוך בדם עלולים לכלול: כאב ראש, נמנום, חולשה, סחרחורת, בלבול, רגזנות, רעב, דופק מהיר, הזעה, תחושת עצבנות.

4.7 תגובות אלרגיות חמורות (שכיחות אינה ידועה) יכולות לקרות עם ג'נואט או סיטגליפטין, אחת התרופות הנכללות בג'נואט. תסמינים של תגובה אלרגית חמורה לג'נואט עלולים לכלול: פריחה, כתמים בולטים אדומים על העור שלך (סרפדת) או נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון והגרון אשר עלולה לגרום קושי בנשימה או בבליעה. אם יש לך תסמינים כלשהם של תגובה אלרגית חמורה, הפסק ליטול ג'נואט ודבר עם הרופא שלך מיד או גש לקבל עזרה רפואית דחופה. ייתכן והרופא ירשום לך תרופה לתגובה האלרגית שלך, וירשום תרופה אחרת לסוכרת שלך.

4.8 כאב מפרקים (שכיחות אינה ידועה). אנשים מסויימים הנוטלים תרופות הנקראות מעכבי DPP-4, אחת מהתרופות בג'נואט, עלולים לפתח כאב מפרקים אשר יכול להיות חמור. צור קשר עם הרופא שלך אם הנך סובל מכאב חמור במפרקים.

4.9 תגובות עוריות (שכיחות אינה ידועה). חלק מהאנשים הנוטלים תרופות הנקראות מעכבי DPP-4, אחת מהתרופות בג'נואט, עלולים לפתח תגובה עורית שנקראת bullous pemphigoid שבה ייתכן ויהיה צורך בטיפול בבית חולים. ספר לרופא שלך מיד אם אתה מפתח שלפוחיות או פציעה של השכבה החיצונית של העור שלך (שחיקה). ייתכן והרופא שלך יגיד לך להפסיק לקחת ג'נואט.

תופעות הלוואי השכיחות ביותר (יכולות להופיע ביותר מאדם אחד מתוך 10) של ג'נואט כוללות:

- אף סתום או נוזל וכאבים בגרון

- דלקת בדרכי הנשימה העליונות
- שלשולים
- בחילות והקאות
- גזים, אי-נוחות בבטן, בעיות בעיכול
- חולשה
- כאב ראש
- סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה) כאשר משתמשים בשילוב עם תרופות מסוימות, כגון סולפונילאוריאה או אינסולין

נטילת ג'נואט עם הארוחות יכולה לעזור בהפחתת תופעות הלוואי הבטניות הנפוצות של מטפורמין, אשר קורות בדרך כלל בתחילת הטיפול. אם הינך סובל מבעיות חריגות או פתאומיות בבטן, דבר עם הרופא שלך. בעיות בבטן אשר מתחילות בשלב מאוחר יותר של הטיפול עלולות להיות סימן למשהו חמור יותר.

#### לג'נואט עלולות להיות תופעות לוואי אחרות כולל:

- נפיחות של הידיים או הרגליים. נפיחות של הידיים והרגליים עלולה לקרות אם הינך נוטל ג'נואט בשילוב עם רוזיגליטאזון. רוזיגליטאזון הינה תרופה מסוג אחר לסוכרת
- כאבי מפרקים
- כאבי שרירים
- כאב בזרוע או ברגל
- כאב גב
- גרוד
- שלפוחיות

אלה אינן כל תופעות הלוואי האפשריות של ג'נואט. למידע נוסף, שאל את הרופא שלך. ספר לרופא שלך אם יש לך תופעת לוואי כלשהי המטרידה אותך, או שאינה חולפת.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא שלך.**

#### דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי", שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן ג'נואט?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
- אין להשתמש בג'נואט לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצויין על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש המצויין.
- יש לאחסן ג'נואט מתחת ל-25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

#### 6. מידע נוסף

##### 6.1 מה מכילה ג'נואט?

חומרים פעילים: sitagliptin ו-metformin.

בנוסף למרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, polyvinylpyrrolidone (povidone), sodium stearyl fumarate, and sodium lauryl sulfate.

ציפוי הטבליה מכיל את המרכיבים הבלתי פעילים הבאים:

Polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide, iron oxide red and iron oxide black.

##### 6.2 כיצד נראית ג'נואט ותכולת האריזה

ג'נואט טבליות זמינות בשלושה חוזקים:

ג'נואט 50 מ"ג/500 מ"ג הינן טבליות מצופות, בצבע ורוד בהיר, מוטבעות ב-"575" מצידן האחד וחלקות מצידן השני.

ג'נואט 50 מ"ג/850 מ"ג הינן טבליות מצופות, בצבע ורוד, מוטבעות ב-"515" מצידן האחד וחלקות מצידן השני.

ג'נואט 50 מ"ג/1000 מ"ג הינן טבליות מצופות, בצבע אדום, מוטבעות ב-"577" מצידן האחד וחלקות מצידן השני.

גדלי אריזות:

ג'נואט 50 מ"ג/ג 500 מ"ג: אריזות בגודל 7, 10, 14, 28, 30, 56 טבליות.  
ג'נואט 50 מ"ג/ג 850 מ"ג: אריזות בגודל 7, 10, 14, 28, 30, 56 טבליות.  
ג'נואט 50 מ"ג/ג 1000 מ"ג: אריזות בגודל 7, 10, 14, 28, 30, 56 טבליות.  
ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

**בעל הרישום והיבואן:** חברת מרק שארפ ודוהם (ישראל - 1996) בע"מ, החרש 34, הוד-השרון.

נערך ביולי 2024.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

ג'נואט 50 מ"ג/ג 500 מ"ג: 139.89.31706

ג'נואט 50 מ"ג/ג 850 מ"ג: 139.90.31902

ג'נואט 50 מ"ג/ג 1000 מ"ג: 139.88.31705

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.