

## עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

### **אֲקְמוֹלִי<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל סירופ בטעם תות שדה**

### **אֲקְמוֹלִי<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל סירופ בטעם תותי-פרוטי**

#### **הרכב**

כל 1 מ"ל מכיל:  
פראצטמול 50 (Iodo) מ"ג.

لمידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוספים".

קרא בעין את העلون עד סוף בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום.

কবছা ترפואיית:  
משכך כאבים ומוריד חום.

#### **2. לפני השימוש בתרופה:**

#### **אין להשתמש בתרופה אם:**

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פראצטמול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה  
(ראה סעיף 6).

#### **اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מנטיילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין ליטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמושוב תופעות עוריות חמורות.
- אין ליטול תרופה זו ביחיד עם תרופות נוספות המכילות פראצטמול.
- אם אתה או ילך רגשים למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, יש להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- התכשיר מכיל פראצטמול העולול לגרום לנזק בכבד כאשר:
  - ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתוקפה ממושכת.
  - בתוקופת הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
  - נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכלבד.
- אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות בלבד להיעוץ ברופא.
- אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצענות ללא התייעצות עם רופא או רוקח, למניעת מינון יתר/הרעללה של פראצטמול.
- יש להימנע מלקיים מינון גבוה של תרופה זו (גם אם בתווך טווח המומלץ) בזמן צום.

#### **יש להיעוץ לפני התחלה הטיפול אם אתה או ילך סובלים או סבלתם בעבר מ:**

- ליקוי בתפקוד הכלבי
- ליקוי בתפקוד הכליה
- אלכוהוליזם
- צהבת

#### **תגובה בין תרופתיות**

אם אתה לוקח, או אם לך חת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם, תוספי תזונה וויטמינים, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיחוד יש לידע את הרופא או הרוקח אם הינך נוטל תרופה מהקבוצות הבאות או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה:

- פניטואין, קרבאמזפין, ברביטורטים (טיפול באפילפסיה)
- תרופות נגד קריישת דם (כמו אורפרין)

- תרופות לטיפול בדיכאון (כגון נוגדי דיכאון טריציקליים)
- תרופות המזרזות ייצור אנזימים בכבד (כגון ברביטורטים)
- תכשירים נוגדי דלקת שאנים סטרואידים
- מטולופרמיד או דומפרידון (טיפול בבחילה, הקאה ובעיות עיכול אחרות)
- אנטיביוטיקות (כגון ריפמפיקין או קלורומפנוקול)
- פרובנציד (טיפול בשיגdon)
- כולסטטרמין (להפחנת עודף שומנים בدم)
- אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול
- שימוש באמצעות הירון דרך הפה עשוי להפחית את יעילות תרופה זו בהפחחת כאב או חום
- יש לידע את הרופא או את הרוקח אם אתה לוקח פולוקסצילין flucloxacillin (אנטיביוטיקה) עקב סיכון חמוץ לאו תקיןות בדם ובנוילם (High anion gap metabolic acidosis) אשר מחייבת טיפול דוחף ועולה לקורות במיעוד במרקם של פגיעה כליאתית חמורה, אלה דם (מצב בו חידקים והרעלים שלהם נמצאים בדם ומובילם לפגיעה באיברים), תת תזונה, אלכוהוליזם כרוני, ובמרקם שיש שימוש במינון יומי מקסימלי של פראצטמול.

### **שימוש בפראצטמול לצריכת אלכוהול**

בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך אלכוהול בגלל הגדרת הסיכון לנקק בכבד.

#### **הירון והנקה**

אם את בהירון או מניקה, יש להיעזר ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה. יש ליטול את המנה הנמנוכה ביותר היעילה עבורך לשיכוך הכאב /או להורדת החום, למשל הזמן קצר ביותר האפשר. הייעזר ברופא אם אין הקלה בכאב או בחום או אם צריכה ליטול את התרופה לעתים תכופות יותר.

#### **שימוש בילדים**

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל תופעות הלואוי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת ליד.

#### **מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

- התרופה מכילה את הממתיק קסיליטול בכמות של 1.5 גרם בכל 5 מ"ל סירופ. תיתכן השפעה משלשת קלה. הערך הקלורי הוא 2.4 קילוקלוריות ל-1 גרם קסיליטול.
- התרופה מכילה colour red FDC No. 40 העולול לגרום לתגובה אלרגית.
- התרופה מכילה נתרון בכמות של 5.86 מ"ג בכל 5 מ"ל סירופ. התרופה מכילה פחות מ-1 mmol (23 מ"ג) נתרון לכל 5 מ"ל סירופ ולפיכך נחשבת נטולת נתרון.
- תרופה זו מכילה 625 מ"ג פרופילן גליקול בכל 5 מ"ל סירופ. הייעזר ברופא או ברוקח לפני הטיפול:
  - אם הילד שלך מתחת לגיל 5 שנים, במיוחד אם הילד שלך מטופל בתרופות אחרות המכילות פרופילן גליקול או אלכוהול.
  - אין לקחת את התרופה אם אתה סובל ממחלות כבד או כליה. יתכן שהרופא יתן לך לבצע בדיקות נוספות במהלך נטילת תרופה זו.
  - אין לקחת את התרופה אם את בהירון או מניקה, אלא אם הומלץ על ידי הרופא. יתכן שהרופא יתן לך לבצע בדיקות נוספות במהלך נטילת תרופה זו.

#### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

#### **מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מהרופא:**

#### **ילדים**

התכשיר ניתן מגיל 0 ומשקל של לפחות 3 ק"ג. עברו תינוקות הרשיוקלים מתחת ל 3 ק"ג, יש להיעזר ברופא. מצא את המינון המתאים בטבלאות המופיעות בהמשך.

**אם ידוע לך משקל הילד** - יש לתת את המינון כפי שמופיע בטבלת המשקל המציגת מינון לפי משקל רק **במרקם שלא ידוע משקל הילד** - יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע בטבלת הגיל המציגת מינון לפי גיל הילד.

**טבלת משקל עבור אקמולி® פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל:**

משקל הילד	מנת במל	מספר מנות מקסימלי ליממה
עד 3 ק"ג	0.9	עד 5 פעמים ביממה
4 ק"ג	1.2	עד 5 פעמים ביממה
5 ק"ג	1.5	עד 5 פעמים ביממה
6 ק"ג	1.8	עד 5 פעמים ביממה
7 ק"ג	2.1	עד 5 פעמים ביממה
8 ק"ג	2.4	עד 5 פעמים ביממה
9 ק"ג	2.7	עד 5 פעמים ביממה
10 ק"ג	3.0	עד 5 פעמים ביממה
11 ק"ג	3.3	עד 5 פעמים ביממה
12 ק"ג	3.6	עד 5 פעמים ביממה
13 ק"ג	3.9	עד 5 פעמים ביממה
14 ק"ג	4.2	עד 5 פעמים ביממה
15 ק"ג	4.5	עד 5 פעמים ביממה
16 ק"ג	4.8	עד 5 פעמים ביממה
17 ק"ג	5.1	עד 5 פעמים ביממה
18 ק"ג	5.4	עד 5 פעמים ביממה
19 ק"ג	5.7	עד 5 פעמים ביממה
20 ק"ג	6	עד 5 פעמים ביממה
21 ק"ג	6.3	עד 5 פעמים ביממה
22 ק"ג	6.6	עד 5 פעמים ביממה
23 ק"ג	6.9	עד 5 פעמים ביממה
24 ק"ג	7.2	עד 5 פעמים ביממה
25 ק"ג	7.5	עד 5 פעמים ביממה
26 ק"ג	7.8	עד 5 פעמים ביממה
27 ק"ג	8.1	עד 5 פעמים ביממה
28 ק"ג	8.4	עד 5 פעמים ביממה
29 ק"ג	8.7	עד 5 פעמים ביממה
30 ק"ג	9	עד 5 פעמים ביממה

**טבלת גיל עבור אקמולி® פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל:**

ילדים בגילאים זהים יכולם להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי. לכן יש לעשות מאץ ולברר את משקל הילד וקבעו מינון לפי טבלת המשקל. רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד ניתן לקבוע מינון לפי טבלה זו.

גיל הילד	מנת במל	מספר מנות מקסימלי ליממה
<b>עבור תינוקות השוקלים מתחת ל 3 ק"ג, יש להיעזר ברופא</b>		
0-3 חודשים	0.8	עד 5 פעמים ביממה
4-11 חודשים	1.6	עד 5 פעמים ביממה
12-23 חודשים	2.4	עד 5 פעמים ביממה
2-3 שנים	3.2	עד 5 פעמים ביממה
4-5 שנים	4.8	עד 5 פעמים ביממה
6-8 שנים	6.4	עד 5 פעמים ביממה
9-10 שנים	8	עד 5 פעמים ביממה
11 שנים	9.6	עד 5 פעמים ביממה

אין לעבור על המנת המומלצת או על מספר המנות המקסימלי ביממה.  
יש ליטול/لتת המנות במרוחקים של לפחות 4 שעות.

**ילדים מגיל 12 שנים ומעלה:**

10 מ"ל כל 4-5 שעות, לפי הצורך. אין לעבור על המנת המומלצת.

**מוגדרים:**

10 מ"ל כל 4-5 שעות, לפי הצורך. אין לעבור על 4 גרם של פראצטמול (המצוי ב-80 מ"ל סירופ) במשך 24 שעות. שימוש בקשיישים: הרופא עשוי ליעץ ליטול מינון נמוך יותר.

יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 ימים למשך  
השימוש בתרופת.

**אוף השימוש**

- יש להשתמש במזרק המצויר לשם דיקוק במינון. כל שנת (קו) במזרק מודדת 0.1 מ"ל.

- יש להכניס את המזרק לתוכה הפתח המוירח שבצואור הבקבוק. בעוד המזרק מוחזק במקומו, יש להפוך את הבקבוק ולמשוך בעדינות את הבוכנה של המזרק כלפי מטה עד הסימון המבוקש (כמום התרופה במל''). בסיום המילוי, יש להפוך בחזרה את הבקבוק ולשחרר בעדינות את המזרק.
- יש להכניס את המזרק לפיו של הילד לכיוון הלחי ולרוקן את תוכנות באיטיות.
- לאחר השימוש ולפני כל הכנסה נוספת לבקבוק, יש להפריד את חלקי המזרק ולשתוף במים פושרים ושוב.

אם אתה או ילך נטلتם מנת יתר או אם בטעות בעל ילך מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. גם אם אתה חש טוב על אף נטילת מינון יתר, טיפול מיידי הוא חיוני, **בגלל הסיכון להתפתחות נזק חמור לכבד**. נטילת יתר עלולה לגרום לתסמים הבאים: עור חיוור, לחילה, הקאה, שלשול, הרגשות איןנוחות, אובדן תיאבון, כאבי בטן, נפיחות, הזעה מוגברת, כאב או רגשות בבטן העליונה, וכיוצא שהתסמים לא משקפים את חומרת הנזק לכבד.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התווית והמנה **בכל פעע שהוא נוטל תרופה**. **הרכב משקפיים** אם הינך **זקוק להם**.  
אם **יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח**.

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקמול<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרורת, בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהם.

- תופעות לוואי חמורות  
יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד:**
- אם מופיעות תגובה אלרגיות חריפות כגון פריחה וגרד, התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון, או ה策ואר אשר עלולים לגרום לקשי נשימה או בליעה, התנפחות של הגוף. צפופים-חרוחרים לא מסוירים.
  - פראצטמול עלול לגרום במרקם נdryים, להופעת מחלות עור חריפות שהסמינים שלהן יכולים להיות: אודם, פריחה, שלפוחיות, התקפלות ונגעים בעור, פגעה עורית נרחבת. תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם עבר נטילת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ולא סבלת מתופעות לוואי.
  - אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא.
  - עיפוי יצאת דופן, חבורות או דימום בלתי צפויים, נטיה ליותר זיהומים (כגון הצטננות) מהרגיל. אלו תופעות נדירות מאד אצל אנשים הולוקחים פראצטמול.
  - שימוש ארוך טווח:** שימוש בתרופות המכילות פראצטמול כל יום במשך זמן רב (מספר חודשים או יותר) עלול לגרום לתופעות לוואי מסכנות, כולל נזק לכבד ולכבד. בנטילת פראצטמול במינון המקביל לתיקופות קצרות לא היו תופעות אלו, אבל יתכן שתהוו השפעה על בדיקות תפקודי כבד.

אם הופיעה תופעת לוואי, או אחת מתופעות הלואוי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתית" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקיים לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנع הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי הארזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C. אין לאחסן במקרר.**
- לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש בתרופה עד לתאריך התפוגה.

**6. מידע נוסף:**

**נוסך על המרכיב הפעיל, אקמולי<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תות שדה מכיל גם:**

Water, xylitol, propylene glycol, glycerin, povidone, sodium citrate dihydrate, acesulfame potassium, citric acid monohydrate, flavour strawberry, ammonium glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour red FDC No. 40

**נוסך על המרכיב הפעיל, אקמולי<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תותי - פרוטי מכיל גם:**

Water, xylitol, propylene glycol, glycerin, povidone, sodium citrate dihydrate, acesulfame potassium, citric acid monohydrate, flavour tutti-frutti, ammonium glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour red FDC No. 40, colour blue FDC No. 2

**כיצד וראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

בכל אריזה בקבוק סירופ ומצריך לשם דיק במיןו.

אקמולי<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תות שדה: סירופ שקוף בצבע אדום - חומ אדום.

אקמולי<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תותי-פרוטי: סירופ שקוף בצבע ורוד אדום - חומ אדום.

גודל האריזה 50 מ"ל או 100 מ"ל. יתכן שלא כל גודלי הארייזות משווים.

יכרן: ויטאמינד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 114, בניינה 3055002, ישראל.  
בעל הרישום: טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

עלון זה נערך ביולי 2024

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

אקמולי<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל סירופ בטעם תות שדה: 140.18.31762

אקמולי<sup>®</sup> פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל סירופ בטעם תותי-פרוטי: 140.17.31761

לשם הפשטות ולהקלת הקירהה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.