

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُسبق هذا الدواء بدون وصفة طبيية

أكامول تصينون وشبّاعَت للنهار

حسولات

التركيبية

تحتوي كل حيسولة على:

پاراسيتامول 500 ملغ

پيسودو إفيدرين هيدروكلوريد 30 ملغ

ديكستروميثورفان هيدروبروميد 15 ملغ

Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الارجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و البند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطى هذا الدواء دون الحاجة إلى وصفة طبيب وهو مخصص للبالغين والأولاد من سن 12 عامًا فما فوق.

ينبغي عليك استعمال الدواء بشكل صحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت علامات المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء، أو في أي حالة تظهر فيها أعراض جديدة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من الزكام، السعال واحتقان الأنف، التي تسحبها الحمى والألام - للعلاج في النهار.

الفصيلة العلاجية:

پاراسيتامول - مسكّن للآلام وخافض للحرارة.

پيسودو إفيدرين - مخفف للاحتقان الأنف.

ديكستروميثورفان - كابيت للسعال.

2. قِبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال هذا الدواء:

- إذا كانت لديك حساسية (أرجية) لپاراسيتامول أو لپيسودو إفيدرين، أو لديكستروميثورفان أو لمزيلات أخرى للاحتقان، أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- إذا كنت تتلقى في نفس الوقت علاجًا بأدوية من فصيلة مثبطات مونو أمين أوكسيداز (MAOI) (للاكتئاب) أو بالأدوية المثبطة لمونو أمين أوكسيداز العكوسة (RIMAS) أو خلال 14 يومًا منذ إيقاف العلاج بها.
- إذا كنت تستعمل الأدوية المثبطة لاسترداد السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين.
- إذا كنت تستعمل الآن أو قد استعملت في الأسبوعين الأخيرين أدوية مضادة للاكتئاب، أدوية نفسية، أدوية للحالات العاطفية أو أدوية لمرض الباركنسون.
- إذا كنت تتلقى في نفس الوقت علاجًا بمزيلات احتقان أخرى، أدوية إضافية للسعال والزكام.
- إذا كنت تستعمل أدوية من فصيلة حاصرات بيتا لعلاج مشاكل القلب.
- إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع جدًا (فرط ضغط الدم الخطير) أو من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة بواسطة الأدوية، أو من مرض في القلب أو الأوعية الدموية، أو كانت لديك سيرة مرضية من السكتة الدماغية.
- إذا كنت تعاني من السكري.
- إذا كنت ولذا عرك دون الـ 12 عامًا.
- بالتزامن مع مستحضرات أخرى تحتوي على پاراسيتامول (إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الدواء الذي تستعمله يحتوي على پاراسيتامول، فاستشر الطبيب أو الصيدلي).
- إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد).
- إذا كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما - زررق).
- إذا وُجد لديك مرض كلوي حاد (فجائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكليتين.
- إذا كنت تعاني من ورم القواتم (ورم نادر في الغدة فوق الكلوية، يؤثر على ضغط الدم ونظم القلب).
- إذا كنت تستعمل أدوية فاتحة أو كابئة للشهية، أو أدوية للربو (الأدوية المحاكية للودية).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- تم الإبلاغ عن حالات من متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS) في أعقاب استعمال أدوية تحتوي على پيسودو إفيدرين. PRES و-RCVS هما حالتان نادرتان يمكن أن ترتبطا بزيادة دموي متدنٍ للدماغ. توقف فورًا عن استعمال أكامول تصينون وشبّاعَت للنهار وتوجه لتلقي المساعدة الطبية الفورية إذا نشأت لديك أعراض يمكن أن تكون علامات لـ PRES أو RCVS (الاطلاع على الأعراض انظر البند 4 "أعراض جانبية محتملة").
- إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تسبب أعراضًا جلدية خطيرة مرة أخرى.

يحتوي المستحضر على پاراسيتامول، الذي قد يسبب ضررًا للكبد عندما:

- يُعطى بجرعة دووائية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة متواصلة.
- يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
- يتم استعمال أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة دون استشارة الطبيب.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الآلام أو أدوية للزكام دون استشارة طبيب أو صيدلي، لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسمم من پاراسيتامول.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية من "فصيلة أكامول" و/أو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول.

يجب الامتناع عن استعمال جرعة دووائية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

إذا وُجدت لديك حساسية لأي غذاء أو لأي دواء، فعليك إخبار الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.

استعمال هذا الدواء بشكل دائم لفترة زمنية طويلة قد يسبب الإدمان. تناول هذا الدواء كما هو مذكور في هذه النشرة.

قبل العلاج بأكامول تصينون وشبّاعَت للنهار، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من:

- مرض أو خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية (مثل: مرض الشريان التاجي - انسداد الشرايين أو الأوردة)
- مرض أو خلل في الجهاز التنفسي، مثل: ربو، سعال متواصل، سعال مصحوب بالحمى، بالطفح أو بالصداع المتواصل
- مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلية
- مشاكل في التبول أو تضخم البروستاتا (يسبب التبول بوتيرة عالية)
- خلل في وظيفة الغدة الدرقية (ثيرويد)
- خلل في وظيفة غدة البروستاتا
- كنت مدمنًا الآن أو قد أنمتت في الماضي على الأفيونيات، الكحول، أدوية ملزمة بوصفة طبيب أو المهدرات غير القانونية
- عانيت مؤخرًا من أعراض انسحاب الكحول أو المهدرات مثل: هياج عاطفي، قلق، تعرّق أو ارتجاجات
- يرقان

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية وفيتامينات، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصةً يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواءً من الفصائل التالية، أو إذا أنهيت للتو علاجًا بهذه الأدوية:

- أدوية مضادة للتكوين (لعلاج التشنجات والتقلصات، مثل الأتروبين)
- أدوية مثبطة لاسترداد السيروتونين انتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (**انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")**)
- أدوية مضادة لتخثر الدم وخاصةً وارفارين
- أدوية مضادة للاكتئاب (بما في ذلك مثبطات الـ **MAO ،RIMAS - انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")** أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين
- مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات
- أدوية للاكتئاب، للأمراض النفسية، للباركنسون، أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (**انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")**
- مكولوبيبياميد - دواء مضاد للاكتئاب
- أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جوانينيدين، ميتيل دوبا، adrenergic neuron blocker، بريتيولوم وبيباتيندين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: حاصرات بيتا - **انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء"**، حاصرات ألفا أو موسعات الأوعية الدموية) وأدوية للقلب (مثل: أمودارون، كوريندين)
- مستحضرات تحفز عمل الإنزيمات في الكبد (مثل: فينيتوين [للتشنجات]، الباربيتورات)
- أدوية مضادة للتشنجات (لعلاج الصرع) مثل: فينيتوين، كاربامازيبين
- ميثوكلوبراميد أو دومبيريدون (لعلاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل إضافية في الهضم)
- كلورامفينيكول أو ريفامپيسين (مضاد حيوي)
- پروبينيسيد (لعلاج القرص)
- كوليستيرامين (لتقليل فرط الدهون في الدم)
- مستحضرات مضادات الالتهاب الالستيرويدية
- حبوب منع الحمل
- جليكوزيد قلبي (دواء يعطى لعلاج اضطرابات نظم القلب، أو قصور القلب، مثل ديجوكسين)
- فلويدات الإرجوت (**ergot alkaloids**) - لعلاج الميجرينا مثل: إيرجوتامين أو methysergide
- أوكسيتوسين (دواء يُعطى أثناء الولادة لتقليل الرحم)
- تيريبنافين لعلاج التلوثات الفطرية
- سیناکالميت لعلاج فرط نشاط الغدة جارة الدرقية الثانوي
- ميثادون لعلاج الألم الشديد

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل فولوكوساسيلين flucloxacillin (مضاد حيوي) بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (High anion gap metabolic acidosis) مما يستوجب العلاج المستعجل، وقد يحدث خاصةً في حالات التضمر الكلوي الحظير، الإنتان (وضع تتواجد فيه الجراثيم وسومومها في الدم وتؤدي إلى تضمر الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية المزمنة، وفي حالات تُستعمل فيها الجرعة اليومية القصوى من پاراسيتامول

إذا كنت تستعمل سويًا مع أكامول تصينون وشبّاعَت أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية مضادة للذهان، فقد نشأ لديك تغيرات نفسية (مثل: هياج نفسي، هوسات، غيبوبة)، وأعراض إضافية مثل: حمى فوق 38.3 درجة مئوية، ازدياد في وتيرة القلب، ضغط دم غير مستقر، متعكسات مبالغ فيها، تضمر العضلات، انعدام التنسيق الحركي و/أو الأرق، ترتبط بالمعدة والأمعاء (غثيان، تقيؤات، إسهال).

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء دون ارتباط بالطعام.

استعمال هذا الدواء واستهلاك الكحول

خلال فترة العلاج بهذا الدواء لا يجوز استهلاك الكحول بسبب زيادة الخطر لضرر في الكبد.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعًا، نظنين أنك قد تكونين حاملاً أو تحططين حملًا، فعليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

الاستعمال لدى الأولاد

هذا الدواء مخصص للأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا، انظر البند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

السياقة واستعمال الماكنت

قد يعكلك الدواء تشعر بالتعب والدوار، ولذلك، قد يؤثر الدواء على قدرتك على السياقة أو استعمال الأدوات أو الماكنت.

لا يجوز السياقة وتشغيل الماكنت إلى أن تعلم كيف يؤثر الدواء عليك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي كل حيسولة على 0.588-0.882 ملغ من الصوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الحيسولة، ولذلك يُعتبر خاليًا من الصوديوم.

تحتوي كل حيسولة على 6.5 ملغ من مونوهيدرات اللاكتوز. إذا قال لك طبيبك بأن لديك عدم تحمّل لأنواع معينة من السكر، فاستشر الطبيب قبل استعمال المستحضر.

يحتوي الدواء على الصبغ FD&C YELLOW #6/SUNSET YELLOW FCF aluminum lake الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:

البالغون والأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا: 1-2 حيسولات، كل 4-6 ساعات، حتى 4 مرات في اليوم.

يُمنع تجاوز جرعة دووائية من 8 حيسولات خلال 24 ساعة.

عند تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بلعق الدواء خطأً، فيجب التوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك. حتى لو كان شعورك جيدًا، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب خطر تطور ضرر شديد للكبد. قد تكون الأعراض الجانبية للغثيان والتقيؤ، الإسهال، فقدان الشهية، آلام البطن، الانتفاخ، التعرق المتزايد، الألم أو الحساسية في الجزء العلوي من البطن ومن المحتمل أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد. تقلّص العضلات، هياج نفسي، ارتباك، ميل إلى النوم، تضمر مستوى اليقظة (الوعي)، حركات سريعة ولا-إرادية في العينين، مشاكل قلبية (نظم قلبي سريع)، مشاكل في التنسيق الحركي، اضطراب نفسي شديد مصحوب بالهوسات، ميل إلى الانفعال المفرط.

يكونون حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت علامات المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء، أو في أي حالة تظهر فيها أعراض جديدة.

كيفية الاستعمال

لا يجوز المضغ أو الهرس! يمكن شطر الحيسولة في خط الشطر.

يجب بلع الحيسولة مع كأس ماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بلعق الدواء خطأً، فيجب التوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك. حتى لو كان شعورك جيدًا، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب خطر تطور ضرر شديد للكبد. قد تكون الأعراض الجانبية: الغثيان والتقيؤ، الإسهال، فقدان الشهية، آلام البطن، الانتفاخ، التعرق المتزايد، الألم أو الحساسية في الجزء العلوي من البطن ومن المحتمل أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد. تقلّص العضلات، هياج نفسي، ارتباك، ميل إلى النوم، تضمر مستوى اليقظة (الوعي)، حركات سريعة ولا-إرادية في العينين، مشاكل قلبية (نظم قلبي سريع)، مشاكل في التنسيق الحركي، اضطراب نفسي شديد مصحوب بالهوسات، ميل إلى الانفعال المفرط.

إذا نسيت تناول الدواء، فتناول الجرعة القادمة بحسب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى نشوء أعراض جانبية. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية خطيرة

يجب إيقاف العلاج بشكل فوري والتوجه لتلقي العلاج الطبي المستعجل:

إذا تطورت لديك أعراض يمكنها أن تكون علامات لمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS). تشمل العلامات على:

- ظهور فجائي لصداع خطير
- غثيان
- تقيؤات
- ارتباك
- احتجاجات
- تغيرات في الرؤية

يجب إيقاف العلاج والتوجه فورًا إلى الطبيب:

- إذا ظهرت ردود فعل تحسسية حادة مثل: الطفح الجلدي الحكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق و/أو الأطراف مما قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع
- قد يؤدي پاراسيتامول في حالات نادرة إلى ظهور أمراض جلدية حادة قد تكون علامات: الاحمرار، الطفح الجلدي، الحويصلات، التضمر الجلدي الموسع. قد تظهر الأعراض الجانبية الجلدية الحادة أيضًا إذا استعملت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركّب الفعال پاراسيتامول دون حدوث مشاكل. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، فيجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري
- انزعاج في البطن
- دوار، نعاس، ارتباك
- هوسات (نادر) (سماع أصوات وروية مشاهد غير موجودة، أفكار ومشاعر غير منطقية) مشكلة في التبول، خاصةً لدى الرجال الذين يعانون من مشكلة في غدة البروستاتا
- إذا ظهرت علامات على حدوث تغيرات في الجهاز الدموي مثل: تعب غير مفسر، حالات زريف دموي، ظهور كدمات، نشوء التهابات بسهولة أكبر
- نظم قلبي غير منتظم
- آلم فجائي وخطير في البطن أو زريف دموي شرجي (في فتحة الشرج) في أعقاب التهاب في الأمعاء الغليظة نتيجة لتزويد دموي غير كاف
- انخفاض في جريان الدم إلى القلب مما قد يسبب الذبحة الصدرية (انزعاج أو آلم في الصدر، الرقبة، الظهر، الفك، الكتفين، الذراعين) أو النوبة القلبية
- سكتة دماغية (ضعف في الوجه، الذراعين أو الرجلين أو مشاكل في التكلم)
- ثوران فجائي للحمى، احمرار الجلد، أو بثور صغيرة عديدة (أعراض محتملة لـ Acute AGEP - Generalised Exanthematous Pustulosis) والتي قد تحدث خلال أول يومين من العلاج بهذا المستحضر

- فقدان فجائي للبلص

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - قد تؤثر على أكثر من مستعمل 1 من بين 10 مستعملين

أعراض جانبية شائعة (common) - قد تؤثر على مستعمل 1 كحد أقصى من بين 10 مستعملين

- صعوبات في النوم، عصبية، دوار

جفاف الفم أو غثيان

أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد)

- حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)
- قلق، شعور بعدم الهدوء، تهيجية، تؤثر أو شعور بالسعادة المتפרقة
- اضطرابات في النوم
- نفض سريع أو غير منتظم أو خفقان القلب
- نعاس

- ضغط دم مرتفع

- آلام البطن، إسهال، تقيؤ

آلم عند التبول

- تتميل في راحتي اليدين والقدمين

ارتجاج

انخفاض في التيار الدموي إلى العصب البصري (Ischaemic optic neuropathy) (الاعتماد والإدمان - عند إيقاف استعمال الدواء قد تشعر بأعراض الانسحاب، التي تشمل على: شعور بعدم الهدوء، صعوبات في النوم، تهيجية، قلق، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، تقيؤات وغثيان، إسهال، ارتجاج، تعرّق

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، عن طريق الندول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك يستع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين في مكان جاف، فيما دون 25°C.

لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, hypromellose (hydroxypropyl methylcellulose), silicon dioxide, stearic acid, magnesium stearate, lactose monohydrate, HPMC 2910/hypromellose 15cp, titanium dioxide, macrogol 4000 [polyethylene glycol], D&C yellow #10 aluminum lake, FD&C yellow #6/sunset yellow FCF aluminum lake, FD&C blue #1/brilliant blue FCF aluminum lake.

كيف يسود الدواء وما هو محتوي العبوة:

حيسولة مطلية على شكل كيسولة، محتوية من 35 حبيبات، خضراء اللون، على أحد جانبيها خط للشطر وجانبها الآخر أملس.

تحتوي العبوة على 21 حيسولة أو 35 حبيولة. قد لا تُسوّق جميع العبوات.

اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:

تيفع إسرانيل م.ض، شارع دافوره هانفيئيه 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير هذه النشرة في آذار\مارس 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

136.49.31130

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.