

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
נאוגל וטרינרי, אבקה להמסה במי שתיה למתן דרך הפה

2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון
נאומצין סולפט 100% Neomycin Sulfate

3. למה מיועדת התרופה
לטיפול בזיהומי מעיים ושלשולים הנגרמים על-ידי חיידקים גראם שליליים כסלמונלה, א. קולי
וחיידקים אחרים הרגישים לנאומיצין, בתרנגולי הודו.
קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת האמינוגליקוזידים.

4. התוויות נגד

- אין להגיש את התכשיר ללהקות רבייה.
- אין להזריק! התכשיר מיועד למתן דרך הפה בלבד.
- אין להשתמש בבעלי חיים עם רגישות יתר לנאומיצין או לאנטיביוטיקות ממשפחת האמינוגליקוזידים.
- אין להשתמש בבעלי חיים במידה וקיימת חסימת מעיים.

5. תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי
עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה
לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,
או ע"י כניסה לקישור : <https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה: תרנגולי הודו

7. מינון ואופן המתן

1 גרם ל- 10-15 ליטר מי שתיה למשך 5 ימים או לפי הוראות וטרינר.

8. אופן השימוש בתכשיר

לשימוש במי שתיה. יש להכין תמיסה טרייה כל 24 שעות.

9. זמן המתנה

יש להפסיק את הטיפול 24 שעות לפני השחיטה.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיית המטרה
לבעלי חיים חולים יש תאבון מופחת ודפוס שתיה שונה, ולכן בעלי חיים חולים מאוד
עשויים להזדקק לטיפול פרנטרלי.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים

- האבקה מיועדת להמסה במים ואין להשתמש בה כפי שהיא.
- יש להשתמש בתרופה על סמך בדיקת רגישות מיקרוביולוגית של חיידקים שבדודו מהחיה, או על סמך מידע אפידמיולוגי אזורי. שימוש בתכשיר שלא על פי ההנחיות שבעלון יכול לגרום לעליה בהימצאות של חיידקים עמידים לנאומיצין ולהפחית את יעילות הטיפול בתרופות ממשפחת האמינוגליקוזידים עקב הפוטנציאל לעמידות צולבת.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
 - יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש.
 - על אנשים עם רגישות יתר ידועה לאמינוגליקוזידים להימנע ממגע עם נאוגל וטרינרי. אם מופיעים תסמינים כמו פריחה בעור יש לפנות לרופא. התנפחות בפנים, בשפתיים או בעיניים, או קשיי נשימה הם סימנים חמורים יותר ויש לפנות לטיפול רפואי דחוף.
- הריון והנקה של בעל החיים המטופל
 - אין להגיש ללהקות רביה.
- תגובות בין תרופתיות וסוגים אחרים של אינטראקציות
 - חומרי הרדמה כללית ותרופות להרפיית שרירים יכולים להגביר את האפקט החוסם הנירולוגי של אמינוגליקוזידים. הדבר יכול לגרום לשיתוק ודום נשימה. יש לנקוט בזהירות מיוחדת בעת שימוש במקביל עם חומרים משתנים חזקים וחומרים אוטוטוקסיים (רעילים לאוזן) או נפרוטוקסיים (רעילים לכליות) פוטנציאליים.
- מינון יתר
 - תופעות נפרוטוקסיות ואוטוטוקסיות יכולות להתרחש במקרה של מינון יתר.
- חוסר התאמה (Incompatibility)
 - בהעדר מחקרים על הנושא, אין לערבב תרופה זו עם תרופות וטרינריות אחרות.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: מתחת ל 25°C.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר ווטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: אבקה לבנה עד צהבהבה
- גדלי האריזות: בקבוק זכוכית: 50 גרם, 100 גרם; צנצנת: 100 גרם; שקית למינט: 200 גרם. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
- יצרן ובעל הרישום: ביוואק בע"מ, רח' האילן 30, אור עקיבא 3060000.
- מספר רישום בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות: 081-49-92198-00

נערך ביולי 2024.