

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

منتكس™ كريم

يحتوي الكريم على بوتينافين هيدروكلوريد 1% w/w. Butenafine Hydrochloride. المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6 'معلومات إضافية' والفقرة 2 'معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء' في هذه النشرة. اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أملك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

مستحضر مضاد للفطريات لفطر القدمين، فطر الجلد وفطر منفرج الرجلين. لفطر الجلد ومنفرج الرجلين الإستعمال بالمستحضر هو لفترة حتى 4 أسابيع. الفصيلة العلاجية: مضاد للفطريات من فصيلة البنزيل أمين.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (ألبرجي) لبوتينافين هيدروكلوريد (Butenafine Hydrochloride) أو لكل واحد من المركبات الإضافية في منتكس كريم (أنظر الفقرة 6 في هذه النشرة). عليك الانتباه وتوخي الحذر الخاص، إذا كنت حساساً للمستحضرات المضادة للفطريات من نوع الأيلامين (allylamine antifungals)، لأنه من الجائز أن تكون حساساً أيضاً لمنتكس كريم.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

المستحضر غير مخصص للإستعمال الفموي، العيني أو في المهبل.

الأطفال والمراهقون

هذا المستحضر غير مخصص للرضع والأطفال دون عمر 12 سنة. لا تتوفر معلومات بخصوص سلامة ونجاعة إستعمال هذا المستحضر لدى أطفال دون عمر 12 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل أو الإرضاع إحكي للطبيب عن ذلك.

الحمل

إذا كنت في فترة الحمل فيجب إستعمال المستحضر فقط إذا أوصاك الطبيب بذلك بعد أن وجد حاجة طبية واضحة لإستعمال هذا المستحضر خلال فترة الحمل.

الإرضاع

يتوجب على النساء المرضعات الإمتناع عن دهن المستحضر في منطقة الثديين.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على 2 ملغ/غرام بنزوات الصوديوم (sodium benzoate) الذي قد يؤدي إلى تهيج موضعي. كذلك، فإن المستحضر يحتوي على كحول سيتيلي (cetyl alcohol) الذي قد يؤدي إلى ردود فعل جلدية موضعية (مثل التهاب الجلد التماسي - contact dermatitis).

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

• يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.
• عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

• المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

لعلاج فطر القدمين، يجب استعمال منتكس كريم مرتين في اليوم لمدة 7 أيام، أو مرة في اليوم لمدة 4 أسابيع.
لعلاج فطر الجلد وفطر منفرج الرجلين، يجب إستعمال منتكس كريم مرة في اليوم، لمدة أسبوعين.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يجب الإمتناع عن تماس المستحضر بالعينين والأنسجة المخاطية (مثل الفم والأنف). في حال تماس بالعينين، يجب غسلها جيداً بالماء.

لا يجوز البلع! هذا المستحضر مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

الطريقة المتبعة لإستعمال منتكس كريم هي كما يلي:

- 1) يجب أن يكون مكان العلاج جافاً قبل إستعمال منتكس كريم. إذا كنت ترغب بإستعمال المستحضر بعد الإستحمام، يجب أن تجفف مكان العلاج جيداً.
 - 2) يجب دهن كمية كافية من منتكس كريم، بحيث تغطي كل مكان العلاج.
 - 3) لا يجوز تضييد مكان العلاج، إلا إذا حصلت على توجيهات أخرى من الطبيب.
 - 4) يجب غسل اليدين جيداً بعد إستعمال منتكس كريم.
- لا يجوز استعمال منتكس كريم لعلاج أي مشكلة صحية أخرى بإستثناء ما وصف لأجله.
 - يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
 - يجب إبلاغ الطبيب إذا لم يطرأ تحسن في نهاية العلاج الذي حدده، أو إذا تفاقمت حالتك الصحية خلال العلاج. إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك. إذا نسبت إستعمال هذا الدواء في الموعد المخصص، فلا يجوز إستعمال مقدار دوائي مضاعف. إستعمل المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

- كما بكل دواء، إن إستعمال منتكس كريم قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.
 - توقف عن العلاج وراجع الطبيب حالاً:
إذا ظهر تهيج، حكة، حساسية، حرقة، حويصلات، إنتفاخ، طفح أو التهاب موضعين، حيث لم تكن هذه الأعراض موجودة قبل إستعمال المستحضر (نادر).
 - إضافة للتأثير المرغوب للمستحضر، خلال إستعماله قد يظهر تهيج خفيف أو إحمرار الجلد في مكان الدهن.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب حالاً.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يجب التخزين في مكان بارد في العلبة الأصلية، دون 25 درجة مئوية.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- بعد الفتح للمرة الأولى بالإمكان الإستعمال خلال 3 أشهر، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنتهاء الصلاحية.

6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً المواد غير الفعالة التالية:
Purified water, propylene glycol dicaprilate, cetyl alcohol, glyceryl monostearate, glycerine, white soft paraffin, stearic acid, polyoxylethylene cetyl ether, diethanolamine, sodium benzoate.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
أنبوبة الألومنيوم تحتوي على 10، 15، 20 غرام كريم أبيض للإستعمال لعدة مرات.
من الجائز ألا تتسوّق كافة أحجام العلب.
- إسم المنتج، صاحب الإمتياز وعنوانه: باداجيس إسرائيل فارماسيوتيكام.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهم.
- تم إعداد هذه النشرة في شباط 2024.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 11063.28947
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.