

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986

Препарат продаётся без рецепта врача

Стрепсилс® Мёд с Лимоном  
Таблетки для рассасывания

Стрепсилс® Ментол с  
Эвкалиптом  
Таблетки для рассасывания

## Активные ингредиенты и их концентрация:

Каждая таблетка Стрепсилс® Мёд с Лимоном содержитжит:  
2,4-дихлорбензиловый спирт 1,2 мг 2,4-Dichlorobenzyl alcohol

Амилметакрезол 0,6 мг Amylmetacresol

Каждая таблетка Стрепсилс® Ментол с Эвкалиптом содержитжит:  
Левоментол 8,0 мг Levomenthol  
2,4-дихлорбензиловый спирт 1,2 мг 2,4-Dichlorobenzyl alcohol

Амилметакрезол 0,6 мг Amylmetacresol

Список неактивных компонентов смотрите в пункте 6. Также смотрите раздел "Важная информация о некоторых компонентах препарата".

Перед началом применения препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Настоящая инструкция включает краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Вам следует принимать препарат в соответствии с указаниями пункта данной инструкции, описывающего дозировки.

Препарат предназначен для взрослых и для детей старше 6 лет. Вам следует использовать препарат надлежащим образом.

Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) усугубляются или если нет улучшения после 3 дней.

## 1. Для чего предназначен препарат?

Стрепсилс Мёд с Лимоном и Стрепсилс Ментол с Эвкалиптом используются для облегчения боли в горле у взрослых и детей.

## Терапевтическая группа: Антисептик.

Препараты содержат два действующих вещества с антисептическим действием, которые уничтожают бактерии связанные с инфекцией полости рта и горла. Рассасывание таблетки позволяет активным веществам воздействовать на область болезненности, смягчая и успокаивая её. Стрепсилс Ментол и Эвкалипт дополнительно содержит действующее вещество левоментол, который обладает действием слабого местного обезболивающего и, кроме того, снимает симптомы заложенности носа.

## 2. Перед применением препарата

Не следует применять препарат, если:

У Вас повышенная чувствительность (аллергия) к действующим веществам или к любому другому из дополнительных компонентов препарата (смотрите полный список неактивных компонентов в пункте 6).

## 3. Особые предостережения, касающиеся применения препарата

Перед началом применения Стрепсилс Мёд с Лимоном и Стрепсилс Ментол с Эвкалиптом следует сообщить врачу, если:

- Вы страдаете непереносимостью некоторых сахаров, таких как фруктоза, глюкоза-галактоза и изомальтоза сахара. Ваш врач определит, есть ли у вас такое заболевание. Непереносимость вызвана состоянием дефицита фермента фруктозо-1-фосфаталдолазы (причина непереносимости фруктозы), плохим всасыванием глюкозы-галактозы и дефицитом изомальтазы сахарозы.

- Вы страдаете другими заболеваниями горла.

## 4. Дети и подростки:

Данный препарат не предназначен для детей младше 6 лет. Помните о том, что маленькие дети могут подаваться таблеткой для рассасывания.

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

## Беременность и лактация:

Если Вы думаете, что беременны, беременны или коромите грудью, следует проконсультироваться с врачом перед использованием данного препарата.

Перед использованием препаратов следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

## 5. Важная информация о некоторых компонентах препарата

• Стрепсилс Мёд с Лимоном и Стрепсилс Ментол с Эвкалиптом содержит сахарозу и глюкозу. Следует проконсультироваться с врачом перед применением данного препарата в случае, если Вы страдаете диабетом либо если Ваш врач определил, что у Вас есть непереносимость некоторых сахаров (см. пункт "Особые предостережения, касающиеся применения препарата").

• Данные препараты содержат очень незначительные количества глютена (пшеничный крахмал). Данные препараты считаются "безглютеновыми". Данные препараты вряд ли вызовут какие-либо проблемы у людей, страдающих целиакией. Одна таблетка содержит не более 19,52 (Стрепсилс Мёд и Лимон) или 20,26 (Стрепсилс Ментол и Эвкалипт) микрограммов глютена. Не следует принимать данные препараты, если Вы страдаете аллергией на глютен (состояние, отличное от целиакии).

• Данные препараты содержат сульфит - диксид серы (E220) (содержится в жидкой глюкозе), который редко может вызывать аллергические реакции или бронхоспазм.

• Данные препараты содержат менее 1 миль (23 мг) натрия в одной таблетке, что считается "не содержащим натрия".

• Препарат Стрепсилс Ментол и Эвкалипт содержит ароматизатор, в состав которого входит d-Limonene, способный вызывать аллергические реакции.

• Препарат Стрепсилс Мёд с Лимоном - содержит ароматизатор, который включает Geraniol, d-Limonene, Citral и Linalool,

способные вызывать аллергические реакции. Кроме того, в

состав препарата входит мёд. Если Вам скажут, что у Вас непереносимость определенных сахаров, Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом перед применением препарата.

## 3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений относительно дозировки и способа лечения препарата Вам следует обратиться к врачу или фармацевту. Следует вынуть одну таблетку для рассасывания из blistera (алюминиевой упаковки), поместить её в полость рта и позволить ей медленно раствориться. Следует вернуть blister назад в картонную упаковку.

Обычная принятая дозировка, как правило, следующая:

**Взрослые и дети старше 6 лет:** одна таблетка для рассасывания каждые 2-3 часа. Не следует использовать более 12 таблеток для рассасывания в сутки (24 часа).

Данный препарат не предназначен для детей и младенцев в возрасте до 6 лет из-за риска удышья.

**Способ применения:** следует рассасывать таблетку для рассасывания медленно, чтобы обеспечить её постепенное растворение во рту. Не следует жевать или ломать таблетку для рассасывания.

**Продолжительность лечения:** данный препарат предназначен только для кратковременного применения. Следует принимать наиболее низкую дозу, необходимую для облегчения симптомов в течение кратчайшего времени. Вам следует обратиться к врачу, если признаки болезни (симптомы) ухудшаются или не улучшаются после 3 дней применения.

Нельзя превышать рекомендованную дозировку.

Если Вы по ошибке прияли более высокую дозировку, Вы можете почувствовать дискомфорт в животе. Следует прекратить использование препарата и проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Если Вы допустили передозировку или, если ребенок по ошибке проглатил этот препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы, взяв с собой упаковку препарата.

Если Вы забыли принять препарат вовремя, не принимайте двойную дозу. Примите следующую дозу в обычное время.

Не принимайте лекарства в темноте! При каждом приеме препарата проверьте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

При возникновении дополнительных вопросов, об использовании препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

## 4. Побочные эффекты

Как и при приеме любого препарата, использование Стрепсилс Мёд с Лимоном и Стрепсилс Ментол с Эвкалиптом может привести к побочным эффектам у части потребителей. Не следует пугаться при прочтении списка побочных эффектов. Вероятно, что Вы не будете страдать ни от одного из них.

**Необходимо прекратить использование препарата и немедленно обратиться к врачу если - возникает**

гиперчувствительность, такая как зуд, жжение и/или дискомфорт в полости рта, затрудненное дыхание, отек лица, шеи, языка или горла и сыпь (острые аллергические реакции.)

Если у Вас появился побочный эффект, если какой-либо из побочных эффектов обострился или если Вы страдаете от побочного эффекта, не указанного в данной инструкции. Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

## Сообщение о побочных эффектах

Вы можете сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения через онлайн-форму "Сообщение о побочных эффектах, вызванных приемом лекарств", находящуюся на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) или перехода по ссылке:

<http://sideeffects.health.gov.il>

## 5. Как хранить препарат?

Избегайте отравления! Данный препарат, как и любой другой, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не выливайте рвоту, не получив на это четких указаний врача!

• Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

• Условия хранения: Хранить при температуре ниже 25°C.

• Узнайте у фармацевта, как利用ировать препараты, вышедшие из употребления. Данные меры помогут Вам в защите окружающей среды.

## 6. Дополнительная информация

В дополнении к действующему веществу, препарат также содержит:

Стрепсилс® Ментол с Эвкалиптом:

Eucalyptus oil, Indigo carmine, Liquid sucrose, Liquid glucose, Tartaric acid

Стрепсилс® Мёд с Лимоном:

Honey, Liquid sucrose, Liquid glucose, Peppermint oil, Quinoline yellow E104, Tartaric acid, Terpeneless Lemon oil

Как выглядят препарат и что включает упаковка:

Стрепсилс® Ментол с Эвкалиптом: картонная упаковка

содержит 24 таблетки для рассасывания. Таблетки для рассасывания круглые, синего цвета.

Стрепсилс® Мёд с Лимоном: картонная упаковка содержит 24 и 36 таблеток для рассасывания. Таблетки для рассасывания круглые, синего цвета.

Производитель и его адрес:

Рекит Бенизер Хелпер Интернационал Ltd, Ноттингем, Англия.

Владелец лицензии и его адрес:

Рекит Бенизер (Нир Ист) Ltd, Ул. Ханагар 6, Ход-ха-Шарон 4527704.

Адрес электронной почты: [service.israel@rb.com](mailto:service.israel@rb.com)

Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения:

Стрепсилс со вкусом Мёда с Лимоном: 049-56-24205-00

Стрепсилс Ментол с Эвкалиптом: 053-50-26858-00

Отредактировано в марте 2021 года в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения.