

التي قد تحمل لتكرار مة.

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

يجب إخراج قرص مص واحد من البليستر (عوة الأومينيو)، وضعه في الداخل مع وتركه ليذوب ببطء. يجب إدخال البليستر مرة أخرى للكرتون العبوة.

الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي:

البالغون والأطفال فوق 12 سنة: قرص مص في اليوم (24 ساعة).

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والرضع تحت 6 جيل سنوات بسبب خطر الاختناق.

طريقة الاستعمال: يجب قرص مص من المصص ببطء، من أجل الذوبان ببطء في الفم. لا يجوز مضغ أو كسر قرص المص.

مدة العلاج: الاستعمال قصير الأمد. يجب تناول الجرعة الأقل والأصغر مدة ممكنة من أجل تخفيف الأعراض. التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

لا يجوز تناول الدواء مع المصص الموصى بها.

أنا تناولت بلعظًا جرعة أكبر من اللازم: قد تشعر بعدم راحة في البطن. لا تواصل استعمال المستحضر واستشر الطبيب أو الصيدلي. إذا أفرطت بتناول الجرعة أو إذا بلغ طفل بلعظًا من الدواء، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر عوة الدواء معك. إذا **نسيبت تناول الدواء في الوقت المطلوب**، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد.

لا يجوز تناول أيوية في الظلام، جيل التحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. وضع الظلمات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

أنا كنت تأخذ أدوية إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال ستريبيليس عمل وليمون وستريبيليس ننع وأوكليبتوس أعراضًا جانبية لدى جزء من المستعملين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية من الممكن أن تعاني من أي واحد منها.

يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فورًا إلى الطبيب إذا - ظهر فرط حساسية مثل: حكة، حرق، أو عدم راحة في الفم، صعوبات تنفس، انتفاخ الوجه، الرقبة، اللسان أو الحلق، طفح (رود فعل أرجية حادة).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم تذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزرة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عتب علاج دولي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) التي يوجد للإستشارة - الإنترنت التبليغ عن الأعراض الجانبية أو عن طريق النحول للرابط:

<http://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

• يجب تسمية هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال نظر الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم.

• لا تسيب البليستر دون مبرح من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العوة، تاريخ انتهاء الصلاحية يبرج في اليوم الأخير من نفس الشهر.

• **شروط التخزين:** خزن في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

• اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أيوية التي لم تعد قيد الاستعمال.

• هذه الخطوات تساعدك في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة للدواء الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

ستريبيليس® ننع وأوكليبتوس
Eucalyptus oil, Indigo carmine, Liquid sucrose, Liquid glucose, Tartaric acid

ستريبيليس® عمل وليمون
Honey, Liquid sucrose, Liquid glucose, Peppermint oil, Quinoline yellow (E104), Tartaric acid, Terpeneless Lemon oil

كيف يبدو الدواء وما هو محتو العوة:

ستريبيليس® ننع وأوكليبتوس: عوة الكرتون تحتوي على 24 قرص للمص. أقراص المص مستديرة، بلون أزرق.

ستريبيليس® عمل وليمون عوة الكرتون تحتوي على 24 و 36 قرص للمص. أقراص المص مستديرة، بلون أصفر.

المنتج وعوانه:

ريكت بنكزر، هيلت جيل إيترن، ثونولن حص، نوتينجيم، إنجلترا.

صاحب التسجيل وعوانه:
ريكت بنكزر (نير إيس)، حص، شارع هنجار 6، هود هشرون 4527704.

البريد الإلكتروني: service.israel@rb.com

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
ستريبيليس بطعم عمل ليون: 049-56-24205-00

ستريبيليس ننع وأوكليبتوس: 053-50-26858-00
للتبليغ وتلقي التوافر، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتكبر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم التتويج في آذار 2021 حسب تعليمات وزارة الصحة

يقوم الدواء بدون وصفة طبيب

ستريبيليس® عمل وليمون
أقراص للمص

المواد الفعالة وتركيزها:

كل قرص للمص من ستريبيليس® عمل وليمون يحتوي على

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg

كل قرص ليون من ستريبيليس® ننع وأوكليبتوس يحتوي على

Amlymetacresol 0.6 mg

ليومينول 8.0 mg

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg

Amlymetacresol 0.6 mg

لقائمة المواد غير الفعالة، انظر اللبنة 6. انظر أيضًا اللبنة "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء"

أثر النشرة يباعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. عليك تناول المستحضر وفقًا لتعليمات في بند الجرعة في هذه النشرة.

الدواء مخصص للبالغين والأطفال فوق 6 سنوات. عليك استعمال الدواء بطريقة صحيحة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

1. لأي عرض مخصص الدواء؟

يستخدم ستريبيليس عمل وليمون وستريبيليس ننع وأوكليبتوس لتخفيف آلام الحلق لدى الأطفال والبالغين.

الفصيلة العلاجية، مطهر.

تحتوي المستحضرات على مائتين فعالة، ذاتا الفعالية مطهرة - التي تقضي على الجراثيم التي تنتشر في حالات عدوى الحلق والمف. عند الإفراط في تناول المنتج للمواد الفعالة، يمكن المنطقة المولمة وكذلك تطهيرها ونهيتها. بالإضافة، يحتوي ستريبيليس ننع وأوكليبتوس على المادة الفعالة ليومينول ذات فعالية تخدير موضعي خفيف وأيضًا هي تخفف من أعراض احتقان الأنف.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حساسًا (أرجي) للمواد الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر لقائمة الكلمة للمركبات غير الفعالة في بند 6).

تغيرت خاصة تتعلق باستعمال الدواء

في العلاج بستريبيليس عمل وليمون وستريبيليس ننع وأوكليبتوس. أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة مثل فركتوز، جلوكوز، جالاكتوز وسوكروز

إيزومالتوز، سيجند طبيك إذا كنت تعاني من حالة طبية من هذا النوع. عدم التحمل ينجم عن حالات من نقص في إنزيم فركتوز-1-فوسفات ألولا (يسبب عدم تحمل الفركتوز)، خلل في امتصاص الجلوكوز، جالاكتوز ونقص في -ل- سوكراز إيزومالتز.

- كنت تعاني من مشاكل أخرى في الحلق.

الأطفال والمرافقون:

هذا الدواء غير مخصص للأطفال تحت 6 سنوات. يجب التنكر أن الأطفال الصغار قد يخطئون من قرص المص.

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة: أيوية أخرى بما في ذلك أيوية بدون وصفة طبي ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع:

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا المستحضر إذا كنت تظنين أنك حامل، كنت حاملًا أو مرضعة.

يجب استشارة طبيب أو صيدلي قبل استعمال الأدوية.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

تحتوي مستحضرات ستريبيليس عمل وليمون وستريبيليس ننع وأوكليبتوس على سوكروز وجلوكوز. يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استعمال الدواء إذا قبل لك بانك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة (انظر اللبنة "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء") أو إذا كنت مرضيًا بالسكري.

تحتوي هذه المستحضرات على مستويات منخفضة جدًا من الجلوتين (من نشا المتح). تعتبر هذه المستحضرات خالية من الجلوتين. من غير المرجح أن تسبب هذه المستحضرات مشاكلًا إذا كانت لدى مرضى الداء البطني، يحتوي قرص مص واحد

أو ما لا يزيد عن 19.52 (ستريبيليس عمل وليمون)

أو 20.26 (ستريبيليس ننع وأوكليبتوس) ميكروغرام من الجلوتين.

لا يجوز أخذ هذه المستحضرات إذا كنت تعاني من حساسية للجلوتين (حالة مختلفة عن الداء البطني).

تحتوي هذه المستحضرات على الكريتين - ثائي أكسيد الكبريت (E220) (الموجود في الجلوكوز السائل) الذي قد يؤدي في أحيان نادرة لردود فعل أرجية أو لتشنج العضلات البولية.

تحتوي هذه المستحضرات على أقل من 1 ملليغرام (ملغ 23) صوديوم في الجرعة. حيث تعتبر خالية من الصوديوم.

يحتوي ستريبيليس ننع وأوكليبتوس على مركب رائحة الذي يشتمل d-limonene الذي قد يؤدي لردود فعل أرجية.

ستريبيليس عمل وليمون - يحتوي على مركب رائحة الذي يشتمل d-Limonene, Citral, Geraniol التي قد تؤدي لردود فعل أرجية. بالإضافة، يحتوي المستحضر على عمل. يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استعمال الدواء إذا قبل لك أنك