

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986**

يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

**كونسرا<sup>TM</sup> 18 ملغ، أقراص ذات تحرير متأني**

**كونسرا<sup>TM</sup> 27 ملغ، أقراص ذات تحرير متأني**

**كونسرا<sup>TM</sup> 36 ملغ، أقراص ذات تحرير متأني**

**كونسرا<sup>TM</sup> 54 ملغ، أقراص ذات تحرير متأني**

كل قرص من كونسرا 18 ملغ يحتوي على  
18 ملغ ميتيل فينيدات هيدروكلورايد

methylphenidate hydrochloride 18 mg

كل قرص من كونسرا 27 ملغ يحتوي على  
27 ملغ ميتيل فينيدات هيدروكلورايد

methylphenidate hydrochloride 27 mg

كل قرص من كونسرا 36 ملغ يحتوي على  
36 ملغ ميتيل فينيدات هيدروكلورايد

methylphenidate hydrochloride 36 mg

كل قرص من كونسرا 54 ملغ يحتوي على  
54 ملغ ميتيل فينيدات هيدروكلورايد

methylphenidate hydrochloride 54 mg

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر - انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية» والفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء».

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الصحية مشابهة.

**تحذير: سوء الإستعمال، إستعمال ليس وفق تعليمات النشرة والإدمان**

للمستحضر كونسرا توجد خطورة عالية لسوء الإستعمال وإستعمال ليس وفق تعليمات النشرة، الذي من شأنه أن يؤدي لتطور سوء إستعمال الموارد، تشمل الإدمان. سوء الإستعمال والإستعمال ليس بموجب النشرة بأدوية المنبهة للجهاز العصبي المركزي، يشمل كونسرا، قد يؤدي إلى فرط الجرعة الدوائية وإلى الوفاة (انظر فقرة "إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر")، تزداد هذه الخطورة عند تناول جرعات دوائية أعلى أو عندما يتم التناول بطريقة غير مصادق عليها، مثل الشم أو الحقن.

## ١) لأي غرض مخصص الدواء؟

كونسروتا مخصص لمعالجة إضطراب الإصغاء والتركيز مع فرط النشاط (ADHD) لدى أطفال فوق عمر 6 سنوات، لدى مراهقين وكبار حتى عمر 65 سنة.

كونسروتا يمكنه أن يحسن الإصغاء، التركيز، وأن يقلل الإندفاع وفرط النشاط بأشخاص لديهم ADHD. من المفترض إعطاء كونسروتا كجزء من برنامج علاجي لـ ADHD الذي يمكنه أن يشمل إستشارة أو علاجات أخرى.

**الفصيلة العلاجية:** منبه للجهاز العصبي المركزي.

## ٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت أنت أو طفلك:

- حساساً (أيلرجي) لل المادة الفعالة methylphenidate hydrochloride (الميثيلفينيدات هيدروكلورايد) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦ - "معلومات إضافية").
- تعاني من خلจات أو متلازمة توريت (Tourette's Syndrome) أو وجود سابقة عائلية لمتلازمة توريت. الخلجات هي عبارة عن حركات أو أصوات تكرارية خارجة عن السيطرة.
- تتناول حالياً أو تتناول/ت خلال الـ 14 يوم قبل بدء العلاج بـ كونسروتا مستحضرأ لعلاج الإكتئاب من فصيلة مثبطة الإنزيم مونوامين أوكسيدياز MAOI (monoamine oxidase inhibitor).
- لا يجوز إستعمال كونسروتا لدى الأطفال دون عمر 6 سنوات نظراً لأن الدواء لم يتم بحثه في هذه الفئة العمرية.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

قبل بدء العلاج بـ كونسروتا إحك للطبيب إذا كنت تعاني أنت أو طفلك أو عانى/ت أو وجدت سابقة عائلية لإحدى الحالات التالية:

- الإدمان/التعلق أو إساءة إستعمال الكحول، الأدوية التي تصرف بوصفه طبيب أو المخدرات التي تباع في الشوارع.
- مشاكل في القلب، مرض قلبي، عيب في القلب أو ضغط دم مرتفع.
- وجدت سابقة عائلية لموت فجائي.
- مشاكل نفسية، مثل ذهان، هوس، إضطراب ثنائي القطب (bipolar) أو إكتئاب، أو وجود سابقة عائلية للإلتئار، إضطراب ثنائي القطب أو إكتئاب.
- حركات أو أصوات متكررة خارجة عن السيطرة (خلجات) أو متلازمة توريت، أو وجود سابقة عائلية لخلجات أو متلازمة توريت.
- اختلالات أو عدم سلامه نتائج تخطيط كهربائية الدماغ (EEG).
- مشاكل في دوران الدم (تدفق الدم) في أصابع اليدين والقدمين.
- مشاكل في الجهاز الهضمي - إنسداد أو تقيؤ في الأمعاء.
- مشاكل في العينين، بما في ذلك تزايد الضغط على العين، چلوكوما، أو مشاكل في الرؤية عن قرب (طول النظر).
- في فترة الحمل أو تخططيين للحمل. لا يعرف فيما إذا كونسروتا قد يلحق الضرر بالجنين.
- في فترة الرضاعة أو تخططيين للرضاع. لا يعرف فيما إذا كونسروتا ينتقل إلى حليب الأم. يجب إستشارة الطبيب حول التغذية المثلثة للرضيع خلال فترة العلاج بـ كونسروتا.

**بُلغ عن المشاكل التالية عند إستعمال ميتيل فينيدات هيدروكلورايد وأدوية منبهة أخرى:  
إساءة الاستعمال، إستعمال متعمد ليس بموجب النشرة وإدمان**

هناك خطورة عالية لإساءة إستعمال المستحضر كونسربتا الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل في تناول الدواء، بما في ذلك الإدمان. إن إساءة إستعمال كونسربتا، أدوية أخرى تحتوي على ميتيل فينيدات وأدوية تحتوي على أمفيتامين، قد يؤدي إلى فرط المقدار الدوائي والوفاة. تزداد الخطورة لفرط المقدار الدوائي والوفاة عند تناول مقادير دوائية مرتفعة أكثر من كونسربتا أو عند التناول بطريقة غير مصادق عليها، مثل الشم أو الحقن.

- يتوجب على طبيبك أن يفحص الخطورة لديك ولدى طفلك لإساءة الإستعمال، الإستعمال متعمد ليس بموجب النشرة والإدمان وذلك قبل بدء العلاج بـكونسربتا، ومراقبة العلاج الخاص بك أو بطفلك.
- قد يسبب كونسربتا التعلق الجسدي بعد الإستعمال المطول، حتى ولو تم تناوله وفقاً لتعليمات طبيبك.
- لا يجوز إعطاء كونسربتا لأي شخص آخر. انظر الفقرة 1 "لأي غرض مخصص الدواء" لمعلومات إضافية.
- يجب حفظ كونسربتا في مكان آمن والتخلص من أي دواء متبقى. انظر الفقرة 5 "كيفية تخزين الدواء؟".
- آخر طبيبك إذا عانيت أنت أو طفلك من إساءة إستعمال أو التعلق بالكحول، أدوية تصرف بوصفة طبيب أو مخدرات تباع في الشوارع.

**مشاكل مرتّبة بالقلب**

- موت فجائي لدى مرضى يعانون من مشاكل قلبية أو عيب قلبي.
  - سكتة ونوبات قلبية لدى الكبار.
  - ارتفاع ضغط الدم والنبض.
- عادةً، لا يجوز إستعمال كونسربتا لدى الأطفال، المراهقين أو لدى الكبار الذين يعانون من عيب في القلب أو مشاكل خطيرة أخرى في القلب.

توجه بشكل فوري إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب، إذا تطور لديك أو لدى طفلك أعراض لمشاكل قلبية مثل ألم في الصدر، ضيق تنفس أو إغماء خلال إستعمال كونسربتا.

**ارتفاع في ضغط الدم والنبض**

قد تؤدي الأدوية المنبهة إلى ارتفاع ضغط الدم والنبض.  
سوف يتبع طبيبك مؤشرات ضغط الدم والنبض وذلك إذا كنت تتناول أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتزايد النبض.

**مشاكل نفسية**

- الأدوية المنبهة قد تؤدي أو قد تفاقم مشاكل سلوكية أو أفكار لدى متعالجين لديهم حالياً مشكلة نفسية.
- ظهور أو تفاقم إضطراب ثنائي القطب.
- أعراض ذهانية جديدة (مثل سماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة) أو ظهور أعراض هوس جديدة.
- إدراك لطبيبك عن مشاكل نفسية تعاني أنت أو طفلك منها، أو عن سابقة عائلية للإنتحار، مرض ثنائي القطب أو إكتئاب.

يجب مراجعة الطبيب على الفور إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من ظهور جديد أو تفاقم الأعراض النفسية أو مشاكل خلال إستعمال كونسربتا، بالأخص سماع أصوات ورؤية أشياء غير حقيقة، الإعتقاد بأشياء غير حقيقة أو ظهور أعراض هوس جديدة.

**الأطفال والمراهقون**

لا يجوز إستعمال كونسربتا لدى الأطفال دون عمر 6 سنوات نظراً لأن الدواء لم يتم بحثه في هذه الفئة العمرية.

## **الفحوص والمتابعة**

يفحص الطبيب أو يفحص طفلك لوجود مشاكل في القلب قبل بدء العلاج بـ كونسروتا. سيقوم الطبيب بمراقبة فحوص الدم، ضغط الدم ونظم القلب لديك أو لدى طفلك، بشكل منتظم أثناء العلاج بـ كونسروتا.

يجب مراقبة الطول والوزن في أوقات متقاربة لأطفال يتناولون كونسروتا. من الجائز أن يُوقف العلاج بـ كونسروتا في حال وجود مشكلة خلال هذه المراقبة.

## **التدخلات/التفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تتناول أنت أو طفلك، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، وإضافات غذائية، إبك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

قد يسبب كونسروتا بمشاركة بعض الأدوية أعراضًا جانبية خطيرة. في بعض الأحيان هناك حاجة لملاعنة المقادير الدوائية للأدوية خلال فترة تناول كونسروتا. يقرر طبيبك فيما إذا يمكن تناول كونسروتا مع أدوية أخرى.

بالأخص يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أنت أو طفلك واحدًا مما يلي:

- أدوية من فصيلة مثبطة الإنزيم مونوأمين أوكسيدارز (MAOI). لا يجوز تناول كونسروتا إذا كنت تتناول أنت أو طفلك حالياً أو تناولت خلال 14 يوماً قبل بدء العلاج بـ كونسروتا مستحضرات لعلاج الإكتئاب من فصيلة مثبطة الإنزيم مونوأمين أوكسيدارز (MAOI) (أنظر أيضًا الفقرة 2 - بند "لا يجوز إستعمال الدواء...").
  - أدوية لعلاج ضغط الدم.
- أدوية تؤثر على تقلص الأوعية الدموية (مثل أدوية لعلاج الرشح أو الحساسية التي تحتوي على مضادات الإحتقان).
- أدوية مضادة للتختثر من فصيلة الكومارين (مثل وارفارين).
- أدوية لعلاج الإلختلاجات (مثل فينوباربيتال، فينيتوئين، بريميدون).
- أدوية لعلاج الإكتئاب (مثل مضادات الإكتئاب ثلاثة الحلقة ومثبطة إمتصاص السيروتونين).
- أدوية لعلاج الأمراض النفسية - ريسپيريدون.

يجب معرفة الأدوية التي تتناولها أنت أو طفلك. يجب الإحتفاظ بقائمة الأدوية الخاصة بك أو بطفلك من أجل عرض قائمة الأدوية التي تتناولها أنت أو طفلك للطبيب وللصيدلي وذلك عندما تلقى دواء جديداً.  
لا تبدأ بتناول أدوية جديدة أثناء العلاج بـ كونسروتا دون التحدث مع طبيبك أولاً.

## **إذا كنت مقبلًا على اجتياز عملية جراحية**

يجب إبلاغ طبيبك إذا كنت مقبلًا على اجتياز عملية جراحية. ذلك لأنه يُمنع تناول ميتيل فينيدات في يوم إجراء العملية مع نوع معين من أدوية التخدير. هنالك خطورة لإرتفاع ضغط الدم خلال إجراء العملية الجراحية.

## **إستعمال الدواء والطعام**

يجب بلع القرص بشكله الكامل مع الماء أو سائل آخر.  
يمكن تناول القرص مع أو بدون طعام.

## **الحمل، الإرضاع والخصوصية**

إذا كنت حاملاً، مرضعة أو تخططين للحمل، يجب إبلاغ الطبيب الذي يقرر فيما إذا كان بإمكانك تناول كونسروتا.

## **السيادة وإستعمال الماكينات**

إن المواد المنشطة قد تضعف من قدرتك أو قدرة طفلك على تشغيل ماكنات خطيرة أو قيادة المركبة.  
يجب التصرف بحذر، وتتفيد تلك الأعمال فقط عندما تكون واثقاً أنت أو طفلك بأن الدواء لا يؤثر على قدرتك في قيادة أو تشغيل ماكنات خطيرة.

## **معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

يحتوي كونسروتا على اللكتوز. إستشر الطبيب قبل بداية إستعمال الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة.

الصوديوم - يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول (23 ملг) صوديوم لكل قرص، أي هو عملياً يعتبر "حالٍ من الصوديوم".

### **(3) كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

كونسروتا هو عبارة عن قرص ذو تحرير متأنٍ. هو يحرر الدواء إلى الجسم على مدار اليوم. لذلك لا يجوز المضغ، السحق أو شطر القرص.

يجب بلع القرص بشكله الكامل مع الماء أو سائل آخر.

إذا للطبيب إذا كنت لا تقدر أنت أو طفلك على بلع القرص بشكله الكامل. من الجائز وأن تكون هناك حاجة لوصف دواء آخر لك/لطفلك.

بالإمكان تناول القرص مع أو بدون طعام.

يجب تناول القرص مرة في اليوم، في الصباح.

قرص كونسروتا لا يذوب بكماله في الجسم. بعد تحرر كامل الدواء، من الجائز أن تلاحظ أحياناً قرصاً فارغاً في البراز، هذا الأمر طبيعي.

من الجائز أن يوقف الطبيب العلاج بـ كونسروتا من حين لآخر وذلك لفترة معينة من أجل فحص أعراض إضطراب الإصغاء والتركيز مع فرط النشاط (ADHD).

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فقد تظهر أعراض جانبية نتيجة فرط المقدار الدوائي:

تأثيرات على القلب وضغط الدم: تغيرات وإضطرابات في نظم القلب، ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم.

تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي: هيجان وزيادة في الحركات الخارجية عن السيطرة، الشعور بإرتباك، هلوسة (رؤيه، شعور وسماع أشياء غير واقعية). متلازمة السيروتونين، اختلالات، سكتة دماغية وسبات.

سخونة مرتفعة تشكل خطراً على الحياة وإنحلال العضل (إنحلال العضلات المخططة)

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

في حال توقفك عن تناول الدواء، إستشر الطبيب قبل التوقف عن إستعمال الدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كونسربتا قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

- قد يسبب المستحضر كونسربتا أعراضًا جانبية خطيرة. يجب التوجّه حالًا إلى الطبيب في الحالات التالية:
- إساهعة الإستعمال، الإستعمال المتعمد ليس بموجب النشرة والإدمان. (أنظر الفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء").
  - علامات لحساسية مثل طفح، حكة أو شرى على الجلد، إنفاس الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى في الجسم، ضيق تنفس، صفير أو صعوبة في التنفس.
  - أعراض لمشاكل قلبية مثل ألم في الصدر، ضيق في التنفس أو إغماء. بلغ عن الأعراض الجانبية التالية عند إستعمال ميتييل فينيدات أو منبهات أخرى: موت مفاجئ لدى مرضى يعانون من مشاكل في القلب أو من عيب قلبي، سكتة دماغية ونوبات قلبية لدى الكبار، ارتفاع في ضغط الدم ونبض.
  - إرتفاع في ضغط الدم والنبض. قد تؤدي الأدوية المنبهة إلى ارتفاع في ضغط الدم والنبض. يتبع طبيبك مؤشرات ضغط الدم والنبض إذا كنت تتناول أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتسارع النبض.
  - مشاكل نفسية. ظهور جديد أو تفاقم الأعراض النفسية أو المشاكل النفسية أثناء إستعمال كونسربتا. خاصة رؤية وسمع أشياء غير حقيقة، الإعتقاد بأشياء غير حقيقة أو مشبوهة. مشاكل سلوكية أو فكرية، إكتئاب، اضطراب ثنائي القطب. (أنظر الفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء").
  - إختلالات. إذا تطور لديك أو لدى طفلك إختلالات، يوصيك طبيبك بالتوقف عن العلاج.
  - إنتصاب مؤلم ومتواصل (priapism). حدثت حالات من القساح الذي تطلب إجراء عملية جراحية لدى المتعالجين بـ ميتييل فينيدات. إذا تطور لديك أو لدى طفلك قساح، يجب التوجّه لتلقّي مساعدة طبية بشكل فوري.
  - مشاكل في جريان الدم في أصابع اليدين والقدمين (Peripheral vasculopathy) بما في ذلك ظاهرة رينو (Raynaud's phenomenon). الأعراض قد تشمل:
    - خدر، الشعور ببرودة أو ألم في أصابع اليدين أو القدمين.
    - تغير في لون الجلد من الشاحب إلى الأزرق وإلى الأحمر في أصابع اليدين أو القدمين.
    - توجّه إلى الطبيب إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من خدر، ألم، تغير في لون الجلد، أو حساسية للحرارة في أصابع اليدين أو القدمين.يجب التوجّه إلى الطبيب بشكل فوري إذا تطور لديك أو لدى طفلك علامات لقرح مجهرولة السبب في أصابع اليدين أو القدمين خلال العلاج بـ كونسربتا.
  - تباطؤ النمو (الطول والوزن) لدى الأطفال. يجب إجراء فحوص بشكل متكرر للطول والوزن لدى الأطفال خلال فترة العلاج بـ كونسربتا. من الجائز أن يحتاج الأمر إلى التوقف عن العلاج وذلك إذا كان طفلك لا ينمو أو يزداد وزنه كما هو متوقع.
  - من الجائز حدوث إنسداد في الأمعاء. لأن أعراض كونسربتا لا يتغيّر شكلها في الأمعاء (الجهاز الهضمي)، لا يجوز تناول أقراص كونسربتا لدى أشخاص لديهم مشاكل خطيرة في الأمعاء (تضيق خطير في الأمعاء).
  - مشاكل في العينين (ارتفاع الضغط داخل العين وجلوكوما). يجب التوجّه إلى الطبيب فوراً، إذا تطور لديك أو لدى طفالك تغييرات في الرؤية أو آلام، إنفاس أو إحمرار في العينين.
  - تغييرات في الرؤية أو تشوش الرؤية.
  - ظهور أو تفاقم لخلجات أو تفاقم متلازمة توريت. يجب إبلاغ الطبيب فوراً، إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من ظهور أو تفاقم لخلجات أو تفاقم متلازمة توريت خلال العلاج بـ كونسربتا.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً:

### لدى الأطفال:

- ألم في أعلى البطن

### لدى الكبار:

- إنخفاض في الشهية للطعام
- صداع
- جفاف في الفم
- غثيان
- أرق
- فلق
- دوار
- إنخفاض في الوزن
- عصبية
- تزايد التعرق

### أعراض جانبية شائعة لوحظت في الأبحاث السريرية:

لدى الأطفال والراهقين: آلام في أعلى البطن، تقيؤ، سخونة، إلتهاب مخاطية الأنف والبلعوم مع رشح تقيحي (nasopharyngitis)، دوار، أرق، سعال، ألم في الفم والبلعوم.

لدى الكبار: تسرع النبض، ضربات قلب، فريتيغو (الشعور بدوران)، تشوش الرؤية، جفاف في الفم، غثيان، صعوبات في الهضم، تقيؤ، إمساك، إهتياج، تلوث في الطرق التنفسية العلوية، إنخفاض الوزن، إنخفاض الشهية للطعام، قهم (إضطراب في الأكل)، توتر العضلات، صداع، دوار، إرتجاف، وخز (paresthesia)، تشوش (sedation)، صداع ناتج عن توتر، أرق، فلق، أرق أولي، مزاج مكتئب وإكتئاب، عصبية، قلة هدوء، عدوانية، صريف الأسنان، تناقص الرغبة الجنسية، عدم إستقرار عاطفي، الشعور بارتباك، توتر، آلام في الفم والبلعوم، تعرّق مفرط.

### أعراض جانبية إضافية بلغ عنها في الأبحاث السريرية:

تعداد منخفض لكريات الدم البيضاء (leukopenia)، جفاف في العينين، خلل في تكيف العين (تركيز الرؤية)، هبات من الحر، إزعاج أو ألم في البطن، إسهال، ضعف، إرهاق، الشعور بتوتر/عصبية، الشعور بعطش، إلتهاب الجيوب الأنفية، إرتفاع نسبة الإنزيم لأنين أmino ترانسفيراز، إرتفاع في نظم القلب، وفي ضغط الدم، نفحة قلبية، تقلصات عضلية، خمول (lethargy)، نعاس، نشاط نفسي حركي زائد، غضب، تأهب زائد، تغيرات في المزاج، تقلبات متكررة في المزاج، نوبة هلع، إضطراب في النوم، ميل للبكاء، خلจات، عجز جنسي، ضيق تنفس، طفح جلدي، طفح يقعى، إرتفاع ضغط الدم.

### أعراض جانبية إضافية بلغ عنها خلال استعمال المستحضر:

قلة الكريات الشاملة (إنخفاض في عدد خلايا الدم - الحمراء، البيضاء والصفائح الدموية)، إنخفاض الصفائح الدموية (قلة الصفائح الدموية)، فرفورية قلة الصفائح الدموية (نزف يميز تعداد منخفض جداً للصفائح الدموية).

ذبحة صدرية، نبض بطيء، إضطرابات في نظم القلب.

إذواج الرؤية، إرتفاع الضغط داخل العين، توسيع الحدقتين، مشاكل في الرؤية.

آلام في الصدر، إزعاج في الصدر، تدني تأثير الدواء أو تدني الإستجابة للدواء، سخونة مرتفعة.

تضرر خلايا الكبد، قصور حاد في الكبد.  
رد فعل تحسسي مفرط (حساسية) مثل وذمة وعائية، رد فعل إستهدافي، إنتفاخ الأذن، حويصلات على سطح الجلد، نقشرات جلدية، شرى (مرض جلدي)، حكة، تهيج في الجلد، وأو تلوث في الجلد، طفح.  
ارتفاع نسبة إنزيم فسفاتاز قلوية (alkaline phosphatase) في الدم، إرتفاع نسبة البيليروبين في الدم، إرتفاع نسبة إنزيمات الكبد في الدم، تعداد غير سليم لكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية.  
آلام في المفاصل، آلام في العضلات، تشنجات عضلية، إتحلال العضلات المخططة (rhabdomyolysis).  
إختلاج، خلل الحركة (حركات لا إرادية متكررة)، متلازمة سيروتونين (بالمشاركة مع تناول أدوية معينة)،  
خلجات حركية وكلامية.  
الشعور بتوهان (disorientation)، هلوسة (بصرية أو صوتية)، هوس، كثرة الكلام، تغييرات في الرغبة الجنسية، إنتصاب متواصل ومؤلم للقضيب الذكري (priapism)، تساقط الشعر من أماكن مختلفة في الجسم (alopecia)، إحمرار الجلد (حمامي)، تقلص الأوعية الدموية في أطراف أصابع اليدين والقدمين، يحصل عادة جراء التعرض للبرد (متلازمة رينو).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.  
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:  
<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وبذلك تتفادي التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.  
يجب تخزين كونسروتا في مكان آمن، مثلاً في مكتب مغلق.  
لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (Exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.  
يجب التخزين دون 25 درجة مئوية. يجب إغلاق القنينة بإحكام.  
تخلص من أقراص كونسروتا المتبقية، التي لم تعد قيد الإستعمال أو إنتهت تاريخ صلاحيتها حسب التدابير التحذيرية التالية: يجب خلط الأقراص مع مادة غير مرغوبة، غير سامة مثلاً أو ساخ، فضلات القلط أو بقايا القهوة المستعملة لجعلها أقل جانبية للأطفال والحيوانات الأليفة. يجب وضع الخليط في وعاء مثل كيس نايلون مغلق والتخلص منه في سلة النفايات المنزلية.

## 6) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على:

polyethylene oxide 200K, povidone K29-32, succinic acid, stearic acid, butylated hydroxytoluene (BHT), polyethylene oxide 7000K, sodium chloride, ferric oxide black, ferric oxide yellow, ferric oxide red (27 mg and 54 mg tablets only), cellulose acetate 398-10, poloxamer 188, hypromellose 2910, 3 cps, phosphoric acid.

طلاء لون:

lactose monohydrate, HPMC, titanium dioxide, triacetin, ferric oxide yellow (18 mg and 54 mg tablets only), stearic acid (18 mg tablet only), black iron oxide (27 mg tablet only), ferric oxide red (54 mg tablet only).

طلاء شفاف:

HPMC, polyethylene glycol (macrogol 400), carnauba wax.

حبر للطباعة:

black iron oxide, isopropyl alcohol, propylene glycol, HPMC, purified water.

كل قرص من كونسربتا 18 ملغ يحتوي على: لكتوز مونوهيدرات 6.84 ملغ

كل قرص من كونسربتا 27 ملغ يحتوي على: لكتوز مونوهيدرات 5.20 ملغ

كل قرص من كونسربتا 36 ملغ يحتوي على: لكتوز مونوهيدرات 17.60 ملغ

كل قرص من كونسربتا 54 ملغ يحتوي على: لكتوز مونوهيدرات 8.00 ملغ

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

كونسربتا 18 ملغ: قرص على شكل كبسولة باللون الأصفر عليها ختم بالحبر الأسود للعلامة "alza18"

كونسربتا 27 ملغ: قرص على شكل كبسولة باللون الرمادي عليها ختم بالحبر الأسود للعلامة "alza27"

كونسربتا 36 ملغ: قرص على شكل كبسولة باللون الأبيض عليها ختم بالحبر الأسود للعلامة "alza36"

كونسربتا 54 ملغ: قرص على شكل كبسولة باللون البني-الأحمر عليها ختم بالحبر الأسود للعلامة "alza54"

كل عبوة تحتوي على 30 قرصاً.

صاحب الإمتياز: جيبي- سي هيلث كير م.ض، كيبوتس شفافيم 6099000، إسرائيل.

المنتج: يانسن سيلاج مانيوفكتورينج، LLC، جورابو ، بورتو ريكو، 00778، الولايات المتحدة.

تم إعدادها في أيار 2024.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

كونسربتا 18 ملغ - 126-85-30589

كونسربتا 27 ملغ - 134-47-31123

كونسربتا 36 ملغ - 126-86-30590

كونسربتا 54 ملغ - 126-87-30591

من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

بناءً على النشرة الأمريكية منذ تشرين الأول 2023.

SH106349 PL V1