

באישור משרד הבריאות לתאריך אפריל 2024

מיעד למטופל אודות השימוש בתכשיר אמפוביר אס.קי. 200 מ"ג

המכילה אמטריציטבין/טנופוביר דיסופורוקסיל פומרט,
להתוויה של טיפול מונע טרומ חייפה (PrEP)
נגד נגיפי הכספי האנושי (HIV)



קי.אס. קים אינטרנשיונל (אס.קי. פארמה) בע"מ יגאל אלון 94, תל-אביב-יפו, 6789139. טלפון: 03-6114543

לרופא/ה שלך אם הוא לrk תסמנינו שפעת בחודש שקדם לתחילה PrEP או בכל זמן במהלך נטיית PrEP.

- אם הייתה מעורבת/ת ברגע מינו שלול לסכן אותך בהדבכה ב-1-HIV, חשוב שתכירו את הסימנים והتسمינים שלולים להצביע על הדבכה ב-HIV לאחרונה:

» עייפות
» חום
» כאבי מפרקים או שרירים
» כאב ראש
» הקאות או שלשלולים
» פריחה
» הצעות לילה

» הגדלת בלוטות למפה בצוואר או במפshaהה

יש ליטול אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג לפחות המינון המאושר, שהינו טבלייה אחת ביום, כל יום.

- יש ליטול אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג לפחות הוראות הרופא/ה שלך. אם איןך בטוח/ה, שאל/י את הרופא/ה או הרוקחת/ת שלך.

• משטר המינון המומלץ הוא טבלייה אחת ביום, כל יום, רצוי עם האוכל. אין ליטול אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג במשתר מינון שונה או להפסיק את הטיפול ללא המלצה מהרופא/ה שלך. דילוג על מנתות או נטילה לא סדרה של התכשיר מעלה את הסיכון לווירוס-ב-HIV ולעמידות לטיפול באםפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג במצב של זיהום-ב-HIV.

צטרכר/י לעבור בדיקות סדירות להימצאות HIV לפחות כל 3 חודשים במהלך נטילת אמפוליר אס.ק.י. 245 מ"ג PrEP.

• אם קיים חשד שנדבקת ב-HIV. ספר/י עלך מיד לרופא/ה שלך. הרופא/ה יdagת-דאג לביצוע בדיקה כדי לוודא פעם נוספת שאין לך זיהום-ב-HIV לפני שתמשיך/תמשיכי לטיפול באםפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג.

עליך ליטול אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג כל יום, לא רק כשתאת/ה חושבת/ת שאת/ה בסיכון לווירוס-ב-HIV.

- אם לדלג על מנתות או להפסיק טיפול מבלי לידע את הרופא/ה.

חברת זו מכילה מידע בטיחותי חשוב והנחיות לגבי נטילת אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג
כטיפול מונע נגד זיהום בגין הכשל החיסוני האנושי (להלן: HIV). נא קראי/י אותה בתשומת לב ושמור/שמורי אותה לעזין בעתיד. מטרתה של חברות זו היא לספק מידע משלים לזה הקיים בעלון לזרק. למידע מלא אוזות אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג, יש לעזין בעלון לצרך המצווך לאריזת התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, אנא פנה/י לרופא/ה או לזרק/ת.

אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג, המכילה את החומרים אטראציטיבן וטנופוביר דיסופורקסיל, היא תרופה מרשם, המייעדת להורדת הסיכון להדבכה ב-HIV במוגרים, בשילוב עם התנהלות מינית בטוחה.

מה עלייך לדעת לפני ובזמן נטילת אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג כדי להפחית את הסיכון לדיהום בונימי HIV

- אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג, בהתחוויה של PrEP, מותוויה להפחית את הסיכון להדבכה ב-1-HIV אבל רק עברו מטופלים שנבדקו ונמצאו שליליים לנגף טרם תחילת הטיפול באםפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג.
- מוציאות של 1-HIV שעמידות לאטראציטיבן/טנופוביר התגלו באנשים שנדבקו ב-HIV, לא אובחנו, ונשלו אטראציטיבן/טנופוביר ללא תרופה אחרת נגד נגיפים. לכן, עליך להיות בעל/ת סטטוס שלילי-ל-1-HIV לפני התחלת טיפול באםפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג PrEP. כמו כן, יהיה עליך לעבור בדיקות HIV חוזרות לפחות כל 3 חודשים כדי לוודא שסטטוס ה-HIV שלך גמור שלילי במהלך הטיפול ב-PrEP.

אין ליטול אמפוליר אס.ק.י. 200 מ"ג אלא אם כן נבדקה ונמצאה שלילי/ת ל-HIV.

- אין להתחיל או להמשך ליטול אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג PrEP אם מופיעים סימנים ו/או תסמינים של זיהום חריף-ב-HIV. לכן, ספר/י



- לרופא/ה על אף לפני תחילת הטיפול ואם את/ה מעוניין/ת להפסיק ליטול אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג.
- אם את/ה שלילי/ת להפטיטיס מסוג B, קימן נגדי לגנים אלה, שרצוי לקבלו לפני תחילת הטיפול באמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג. תופעות לוואי של מפוביר אס.ק.י. 200/245 מ"ג.
- תופעות לוואי של אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג**
- כמו כל מוצר רפואי, גם אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג עלולה לגרום לתופעות לוואי.
 - תופעות הלואו השכיחות ביותר של התכשיר כוללות:
 - » שלשולים
 - » הקאות
 - » בחילות
 - » שרחרחות
 - » כאב ראש
 - » פריחה
 - » תחושת חולשה
 - » בבדיקה, נתגלו:
 - ירידת בכמות הזרחן בدم.
 - עלייה בקריאטון קוואץ (אנדים שעשו להציג עילן נזק לשירים).
 - אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל תופעות לוואי חדשות בכלiot ווחומרה של מחלות כליה קיימות, כמו גם שינויים בעצמות. לכן, לפני ובמהלך נטילת אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג ל-EP תצטרך/י לעבר בדיקות להערכת תפקודו הכליאלי. יהיה עליך לספר לרופואה/ה אם יש לך מחלת כליאית, תוצאות חירוגות בבדיקות תפוקדי הכליאות ואם את/ה נוטל/ת תרופות נוספות.
 - גם בעיות בעצמות (המתבטאות בכאבי עצמות מתמכשים או מהקרים ולעיטים היוצרים שברים) עלולות להתחש עקב פגיעה בכלiot. נא ספר/י לרופואה/ה שלך אם יש לך כאבי עצמות או שברים.
 - תרופות המכילות אנולוג נוקלאוטידי, כולל אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג, עלולות לגרום לחמצצת לקליט (עדיף של חומצה לקטית בדם). בשימה מהירה ועמוקה, ישנוונות ותסמננים לא נספנות.
- דילוג על מנת עלול להעמיד אותך בסיכון מגבר ל-זיהום ב-HIV.
 - אם שכחת ליטול באמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג ונדרשת בכך בתוך פחות מ-12 שעות משעת הנטילה הקבועה שלך, קח/י את הטעבilia בהקדם האפשרי, רצוי עם אוכל. את המנה הבאה קח/י בשעת הנטילה הרגילה שלך.
 - אם חלפו יותר מ-12 שעות מעהה בה את/ה נוטל/ת באמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג באופן קבוע, אל תikhoch/i את הטעבilia שהחמצצת ואת המנה הבאה קח/י בשעת הנטילה הרגילה.
 - אם הקאתה פחתה משמעותית לאחר הנטילה הטעבilia נוספת נספנת. אל תיטול/תיטלי טבליט אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג נספנת אם התקאת יותר מעהה לאחר הנטילה.
- על/י בצדיו להישאר שלילי HIV.**
- במהלך נטילת אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג**
- אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג בלבד אינו מסטר טיפול מלא ב-זיהום HIV ואינו מגן מפני זיהומים במחלות אחרות המועברות בפגע מיini.
 - יש להשתמש באמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג בלבד עם אמצעים אחרים למניעת זיהום בידים, הcoliילים הקפדה על התנהלות מינית בטוחה, שכוללת:
 - » שימוש בקונדומים לצמצום המגע עם ذرع, נוזלי נרתיק או דם.
 - » לא לחלק מחותמים, מזרקים או ציוד רפואי אחר בפגע מיini, כגון עגבת, כלהידיה ודיבת מומלצת מכיוון שהדבקה במחלות אלה עשויה להיגבר את הסיכון להדבק HIV.
 - » בקשת מידע ותמיכה לצמצום ה指挥ות מינית שעולמה להעמיד אותך בסיכון גבוה יותר ל-זיהום HIV.
- דע/י מהו סטטוס הנשאות שלר בNEGATIVE דלקת CBD מסוג B(HBV) לפני תחילת השימוש באמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג ל-EP**
- אם היה לך הפטיטיס מסוג B בעבר, לאחר שתפסיק/י ליטול אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג תהיה/י בסיכון ממשמעותי להתקפרצויות חריפה וחומרה של הפטיטיס והחומרה במחלות CBD.
 - לכן, אם נדבקת בהפטיטיס מסוג B, ספר/י



הירון והנקה

- המידע אודות בטיחות השימוש באמפובר אסק.ק.י. 200/245 מ"ג במהלך הירון הוא מוגבל, אך אין מצביע על היוצרות מוכנים או רעליות לעומת זאת בהריון, חושבת שעת עשויה להיות גבוהה או מתכוננת להורות, ספריז את לרופא/ה.
 - אם נעלמת אמפוביר אסק.ק.י. 200/245 מ"ג במהלך הרווקן, יתכן שהרופא/ה יתקבש לבחצ' במלר הרווקן ואבדיקות אבחון אחרות כדי לבדוק אם רגשות ובידוקות אבחון העובר שלן.
 - **אל תנקיק במהלך נטילת אמפוביר אסק.ק.י. 200/245 מ"ג**, מכיוון שהחומרים הפעיליים בתרכופה זו עשויים לחדב אם והשפעתם על התינוק אינה ידועה.

- ספציפיים כגון כגן בחילות, הקאות וכאבי בטן עלולים להיות סימנים למצב זה. לעיתים, תופעת לואין נדירה אף חמורה זו עלולה להוות סכנה חיים. עלייה של חומצה לקיט שיכור יהר בנשים, במיוחד הסבולות מהשמנת יתר. קים סיכון גבוה במיחזור הסבולות מהתהנוותם.
- יותר ללקות בעבהía זאת אם הינך סובל/ת ממחלת כבד. אם תחווה/י תסמינים אלו, יש לפנות מיד לרופא/ה.
- חולום/ות במחלות כבד כרונית כול הפטיטיס (ছাবত) מסוג B או C, שמוטלים בתכשיטים נוגדי נגיפים, הנענים בסיכון גבוה יותר להתקפותו של סיבוכים חמורים בכבד העולמים לסיכון חיים. אם יש לך מחלת כבד (כולל דלקת כבד נגיפית מסוג B או C), עליך לדוח אאת לרופא/ה לפניו תחולת הטיפול.
- יש לידע את הרופא/ה אם תהיה לך תופעת לואין שאינה חולפת או אחת מתופעות הלואין המצוינות בעalon לצבן.
- במידע מלא אודות תופעות הלואין של התכשיר, יש לעון בעalon לצרכך של אמפוליר אס.ק.י. 200/245 מ"ג.

דוח על תופעות לונאי

לדין על תופעות לוואי שבסביבה בדירות אסוציאציות המוקוּן

www.health.gov.il

או ע"י כניסה ל קישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

כניתן גם לבדוק לבעל הרישום, קי.אפס. קי. אינטראנסיונל (אס. קי. פארמה) בע"מ דרך:
report@sk-pharma.com



מואושר בהתאם להנחיות משרד הבריאות
تمت الموافقة عليه طبقاً لتعليمات وزارة الصحة
Approved according to the guidelines of the ministry of health

SK-EMFO-RMP-heb-pib-042024_V3