

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986**

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

## پارامول أف

## العلاج في الليل، حبوبلات

تحتوي كل حبيسولة على:

پاراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ،

پسيودو ايفيرين هيدروكلوريد

(Pseudoephedrine hydrochloride) 25 ملغ،

كلورفينيرامين ماليت

(Chlorpheniramine maleate) 2 ملغ.

المواد غير الفعالة وميسبات الارجية في الدواء – انظر البند 6
"معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

**اقرأ النشرة باهتمام حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطى هذا الدواء دون الحاجة إلى وصفة طبيب وهو مخصص للبالغين وللأولاد الذين عمرهم عن 6 أعوام. يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات المذكورة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء"، في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

**1. لأي عرض مخصص هذا الدواء؟**

أدوية مخصص لتخفيف من أعراض الزكام واحتقان الأنف المصحوبين بالحمى والألام – للعلاج في الليل.

**الفصلية العلاجية:**

پاراسيتامول - مسكّن للألام وخافض للحرارة.

پسيودو ايفيرين هيدروكلوريد – مخفف لاحتقان الأنف.

كلورفينيرامين ماليت – مضاد للهيستامين.

**2. قبل استعمال الدواء**

**لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

<p>كنت حساساً (لديك أوجية) للمواد الفعالة (پاراسيتامول، پسيودو ايفيرين هيدروكلوريد، كلورفينيرامين ماليت) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6) - أو لأمصال هيستامين عدا كلورفينيرامين. <p>وجد لديك ضغط دم مرتفع جداً (فرط ضغط الدم الخطير) أو فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة بواسطة انويك، أو مرض في القلب أو الأوعية الدموية أو سيرة مرضية من السكتة الدماغية.</p> <p>كنت تعاني من السكري.</p> <p>كنت تعاني من ورم القواتم (ورم نادر في الغدة فوق الكلوية، يؤثر على ضغط الدم ونظم القلب).</p> <p>كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (تيرويد).</p></p>
---

- كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما/زرق).
- وجد لديك مرض كلوي خطير حاد (فجائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكليتين.
- كنت تتلقى في نفس الوقت علاجاً بأدوية إضافية للزكام والسعال أو بمستحضرات أخرى تحتوي على پاراسيتامول.
- كنت تستعمل أدوية من فصيلة حاصرات بيتا (تُستعمل لعلاج مشاكل القلب، ضغط الدم المرتفع).
- كنت تتلقى في نفس الوقت علاجاً بأدوية من فصيلة منقطات الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOis) (علاج الاكتئاب) أو بأدوية من منقطات الأوكسيداز أحادي الأمين الكوكسة (RIMAs) أو خلال 14 يوماً منذ إيقاف العلاج بها.
- كنت تستعمل أدوية فاتحة أو كابئة للشهية أو أدوية لعلاج الاحتقان والربو (أدوية من المحاكيات الودية).
- كنت حاملاً أو مرضعاً.

**تحذيرات خاصة تتفق باستعمال الدواء**

تم الإبلاغ عن حالات من متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الدماغي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية اللماعية الانكسائي (RCVS) في أعقاب استعمال أدوية تحتوي على پسيودو ايفيرين. PRES و-RCVS هما حالتان نادرتان يمكن أن ترتبطا بتزويد دموي متدن للدماغ. يجب التوقف فوراً عن استعمال پارامول أف للعلاج في الليل والتوجه فوراً لتلقي العلاج الطبي إذا نشأت لديك أعراض قد تكون علامات لـ PRES أو RCVS (انظر الأعراض في البند 4 "الأعراض الجانبية").

- إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تسبب أعراضاً جلدية خطيرة مرة أخرى.
- يجتني المستنصر على پاراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً لكبد عندما:
  - يعطى بجرعة دوالية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة مطوّلة.

○ يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
○ يتم استعمال أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.

- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة دون استشارة الطبيب.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الألم أو أدوية للزكام دون استشارة طبيب أو صيدلي، لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسمم عن پاراسيتامول.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية من فصيلة پارامول وأو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول.
- يجب الامتناع عن استعمال جرة دوالية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- إذا وجدت لديك حساسية لأي غذاء أو لأي دواء، فغليك إخبار الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.

**قبل العلاج بپارامول أف للعلاج في الليل، الطبيب إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من:**

- مشكلة في وظيفة الكليتين أو الكبد

- الكحولية
- استناد الشرايين أو الأوردة
- خلل في وظيفة الغدة الدرقية (تيرويد)
- مشاكل في التبول أو تضخم البروستاتا (يؤدي إلى التبول بوتيرة عالية)
- اليرقان
- الصرع
- الربو، التهاب القصبات أو مشاكل أخرى في الرئة
- خلل في وظيفة غدة البروستاتا

**التفاعلات بين الأدوية**

**إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.** خاصة يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواء من الفصائل التالية:
أدوية مضادة للتكولين (لعلاج التشنجات والتقلصات، مثل الأتروپين).

أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جوانثيينين، ميتيل دوبا، حاصرات الخلايا العصبية الأدرينية (adrenergic) (neuron blockers)، ديبيرسوكين، بريتيليوم وبيتابندين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: حاصرات بيتا – انظر البند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا")

أدوية مضادة للتكاتب (بما في ذلك منقطات MAO، RIMAs – انظر في البند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا") أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين.
مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات.

مكولوميد- دواء مضاد للتكاتب.
چلكنوزيد (بما في ذلك بعض علاجات اضطرابات نظم القلب أو قصور القلب، مثل ديجوكسين).

قلويدات الإريوجت (ergot alkaloids) – لعلاج الميجربنا مثل إرجوتامين أو ميتيسبرجيد.

أوكسيتوسين (دواء يُعطى أثناء الولادة لتقليص الرحم).

كوليسيتيرامين (لخفض مستوى الدهون في الدم).

ميتوكلوپراميد أو دومپریدون (لعلاج الغثيان، القيؤ ومشاكل إضافية في الهضم).

أدوية مضادة لتخثر الدم، مثل وارفارين.

أدوية منع الحمل.

أدوية مضادة للتشنجات (لعلاج الصرع) مثل فينيتوين، كاربامازيبين.

مضادات الهيستامين الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في أدوية السعال والزكام، التي تسبب النعاس.

أدوية النوم، للقلق، للاكتئاب.

مستحضرات تخفّر عمل الإنزيمات في الكبد (مثل:

ريفامپيسين، باريتنورات).

مستحضرات مضادات الالتهاب الالسترويدية.

كلورامفينيكول (مضاد حيوي).

بروبيبينسيد (لعلاج القرص).

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل فلوكلوكساسولين (مضاد حيوي) بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (High anion gap metabolic acidosis) المتأصرت ويتوجب العلاج المستعمل، وقد يحدث خاصة في حالات الصر الكلوي الخطير، الإلتان (وضع تتواجد فيه الجراثيم ومسمومها في الدم وتؤدي إلى تضرر الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية المزمنة، وفي حالات تُستعمل فيها الجرعة اليومية القسوى من پاراسيتامول.

**استعمال الدواء والطعام**

يمكن تناول الدواء دون ارتباط بالطعام.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**

خلال فترة العلاج بهذا الدواء لا يجوز استهلاك الكحول بسبب زيادة الخطر لضرر في الكبد.

**الحمل والإرضاع**

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً فلا يجوز استعمال هذا الدواء.

**السياقة واستعمال الماكينات**

لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات الخطرة خلال فترة استعمال الدواء، لأن هذا الدواء قد يخل باليقظة أو يسبب تشوش الرؤية. بالنسبة للأولاد، فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

**الاستعمال لدى الأولاد**

هذا الدواء مخصص للبالغين وللأولاد الذين يبلغون أكثر من 6 أعوام من العمر، وانظر البند 3.

يجب على الوالدين الإبلاغ للطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**
sunset yellow FCF aluminum lake (E110)، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.
يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليغرام من الصوديوم (23 ملغ) في كل حبسولة، يعني أنه عملياً "خال من الصوديوم".

**3. كيف تستعمل الدواء؟**

○ قبل استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

○ عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب، الجرعة الدوائية المتبعة

**بالبالغون والأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا:** 1-2 حبسولات قبل النوم.

**الأولاد في سن 10-12 عامًا:** 1 حبسولة قبل النوم.

**الأولاد في سن 6-9 أعوام:** 1/٢ حبسولة قبل النوم.

المرضى الذين يبلغون أكثر من 60 عامًا من العمر: يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنهم قد يكونون حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

عند استعمال البونوراين مع پارامول أف للعلاج في النهار يُمنع تجاوز جرعة دوائية من 8 حبسولات بالمجموع الكلي خلال 24 ساعة (عند الاستعمال بالتأزمي مع پارامول أف للعلاج في النهار، يجب استبدال جرعة من پارامول أف للعلاج في النهار بجرعة من پارامول أف للعلاج في الليل، وعدم تناولها كإضافة للجرعة الدوائية القسوى الموصى بها أعلاه من پارامول أف للعلاج في الليل).

**المضادات الهستامين الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في**

أدوية السعال والزكام، التي تسبب النعاس.
أدوية النوم، للقلق، للاكتئاب.

مستحضرات تخفّر عمل الإنزيمات في الكبد (مثل:

ريفامپيسين، باريتنورات).

مستحضرات مضادات الالتهاب الالسترويدية.

كلورامفينيكول (مضاد حيوي).

بروبيبينسيد (لعلاج القرص).

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل فلوكلوكساسولين (مضاد حيوي) بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (High anion gap metabolic acidosis) المتأصرت ويتوجب العلاج المستعمل، وقد يحدث خاصة في حالات الصر الكلوي الخطير، الإلتان (وضع تتواجد فيه الجراثيم ومسمومها في الدم وتؤدي إلى تضرر الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية المزمنة، وفي حالات تُستعمل فيها الجرعة اليومية القسوى من پاراسيتامول.

حتى أو كان شعورك جيداً، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب **خطر تطور ضرر شديد لكبد.**

قد تكون الأعراض الجانبية عبارة عن: غثيان وقيؤ، إسهال، فقدان الشهية، الأم في البطن، انتفاخ، تعرق متزايد، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن وقد لا تعكس هذه الأعراض شدة الضرر لكبد.

**إذا نشبت تشاؤل الدواء،** فتناول الجرعة القادمة بسبب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة٠ راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

**إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.**

**الاستعمال لدى الأولاد**

هذا الدواء مخصص للبالغين وللأولاد الذين يبلغون أكثر من 6 أعوام من العمر، وانظر البند 3.

يجب على الوالدين الإبلاغ للطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**
sunset yellow FCF aluminum lake (E110)، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.
يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليغرام من الصوديوم (23 ملغ) في كل حبسولة، يعني أنه عملياً "خال من الصوديوم".

**3. كيف تستعمل الدواء؟**

○ قبل استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

○ عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب، الجرعة الدوائية المتبعة

**بالبالغون والأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا:** 1-2 حبسولات قبل النوم.

**الأولاد في سن 10-12 عامًا:** 1 حبسولة قبل النوم.

**الأولاد في سن 6-9 أعوام:** 1/٢ حبسولة قبل النوم.

المرضى الذين يبلغون أكثر من 60 عامًا من العمر: يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنهم قد يكونون حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

عند استعمال البونوراين مع پارامول أف للعلاج في النهار يُمنع تجاوز جرعة دوائية من 8 حبسولات بالمجموع الكلي خلال 24 ساعة (عند الاستعمال بالتأزمي مع پارامول أف للعلاج في النهار، يجب استبدال جرعة من پارامول أف للعلاج في النهار بجرعة من پارامول أف للعلاج في الليل، وعدم تناولها كإضافة للجرعة الدوائية القسوى الموصى بها أعلاه من پارامول أف للعلاج في الليل).

**المضادات الهستامين الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في**

أدوية السعال والزكام، التي تسبب النعاس.
أدوية النوم، للقلق، للاكتئاب.

مستحضرات تخفّر عمل الإنزيمات في الكبد (مثل:

ريفامپيسين، باريتنورات).

مستحضرات مضادات الالتهاب الالسترويدية.

كلورامفينيكول (مضاد حيوي).

بروبيبينسيد (لعلاج القرص).

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل فلوكلوكساسولين (مضاد حيوي) بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (High anion gap metabolic acidosis) المتأصرت ويتوجب العلاج المستعمل، وقد يحدث خاصة في حالات الصر الكلوي الخطير، الإلتان (وضع تتواجد فيه الجراثيم ومسمومها في الدم وتؤدي إلى تضرر الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية المزمنة، وفي حالات تُستعمل فيها الجرعة اليومية القسوى من پاراسيتامول.

حتى أو كان شعورك جيداً، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب **خطر تطور ضرر شديد لكبد.**

قد تكون الأعراض الجانبية عبارة عن: غثيان وقيؤ، إسهال، فقدان الشهية، الأم في البطن، انتفاخ، تعرق متزايد، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن وقد لا تعكس هذه الأعراض شدة الضرر لكبد.

**إذا نشبت تشاؤل الدواء،** فتناول الجرعة القادمة بسبب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة٠ راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

**إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.**

(ومشاعر غير منطقيّة).

- المفجائي وخطير في البطن أو زيف دموي شرجي (في قحة الشرج) في أعقاب التهاب في الأمعاء الغليظة نتيجة لتزويد دموي غير كافٍ (Ischaemic colitis).
- علامات على حدوث تغيرات في الجهاز المنوي مثل: تعب غير مفسر، فقر الدم، حالات نزيف دموي، كدمات، نشوء ثلثات بسهولة بالغة.
- مشاكل في الكبد بما في ذلك اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).
- فقدان فجائي للبصر.

**يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب عند ظهور:**

أعراض جانبية (تحديدا لدى الرجال الذين يعانون من مشاكل في غدة البروستاتا)

**أعراض جانبية إضافية**

**أعراض جانبية شائعة جدا** (أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

صداع

**أعراض جانبية شائعة** (أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

صعوبات في النوم، عصبية، دوخ

جفاف في الفم أو غثيان

**أعراض جانبية مدى شوبوعها غير معروف** (أعراض لا يتم تحديد مدى شوبوعها بعد):

حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف

بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES)

ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغيه الانعكاسي (RCVS)

قلق، شعور بعدم الهدوء، تهيجيّة، تؤثر أو شعور بالسعادة المتفرقة

اضطرابات في النوم

نعوض سريع أو غير منتظم أو غلق القلب (إدراك النقات الفلجية)

نعاس

ضغط دم مرتفع

الإم البطن، إسهال، قيؤ

ألم عند التبول

وخز أو خدر في فكي اللدين والقدمين

انخفاض في جريان الدم إلى العصب البصري مما قد يسبب فقدان البصر (ischaemic optic neuropathy)

عدم القدرة على التركيز، تشوش الرؤية

جفاف في الفم، اندعام الشهية، حركة

ارتباك، ظنين في الأذنين

حساسية للضوء

حساضغدم منخفض، ضغط في الصدر، تزايد لزوجة البلمغ

التعب، الكنتفين، التقلصات، تقنض العضلات، اندعام التناسق الحركي

كوابيس

ارتباك لدى المسنين

شعور بمرض

عد دموي منخفض، التهاب الكبد - هيپاتيتيس (ألم شديد في البطن، غثيان، تقويات وفقدان الشهية)

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فغليك استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

بالإمكان التبليغ عن الأعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تمريض على توفسوت لوانا" מקדב טפול תרופתי

الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستشارة المتصلة

للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الفخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

**5. كيف يجب تخزين الدواء؟**

المتم

المتم

مغلق بعيدا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن

مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب القيؤ بدون

تعليمات توجيه من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך

הסוף) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

**ظروف التخزين:** يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

لا يجوز الفاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة

القفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساهم في حماية البيئة.

**6. معلومات إضافية**

**بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضا على:**

Povidone,

croscarmellose sodium,

hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171),

macrogol 400, sunset yellow FCF aluminum lake (E110), quinoline yellow aluminum lake (E104), silica colloidal anhydrous, carnauba wax

**كيف يبيلو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

حبسولة برتقالية اللون ذات خط للسطر في كلا الجانبين.

أحجام العبوات المصاّدق عليها: 10، 20، 50 حبسولة. لا تسوق جميع أحجام العبوات.

تم تحرير النشرة في آذار/مارس 2024 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:** 00768792-127

وخز أو خدر في فكي اللدين والقدمين

انخفاض في جريان الدم إلى العصب البصري مما قد يسبب فقدان البصر (ischaemic optic neuropathy)

عدم القدرة على التركيز، تشوش الرؤية

جفاف في الفم، اندعام الشهية، حركة

ارتباك، ظنين في الأذنين

حساسية للضوء

حساضغدم منخفض، ضغط في الصدر، تزايد لزوجة البلمغ

التعب، الكنتفين، التقلصات، تقنض العضلات، اندعام التناسق الحركي

كوابيس

ارتباك لدى المسنين

شعور بمرض

عد دموي منخفض، التهاب الكبد - هيپاتيتيس (ألم شديد في البطن، غثيان، تقويات وفقدان الشهية)

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فغليك استشارة الطبيب.**