



لأنه يساعد في منع تراكم اللويحات في الشرايين، ويمنع مرض القلب الشحوم الثلاثية هي نوع آخر من الدهون الموجود في الدم التي قد تزيد من خطورة حدوث مرض قلبي. عليك الحرص على اتباع حمية فقيرة بالكوليسترول خلال فترة تناول لهذا الدواء.

**(2 قبل إستعمال الدواء**

**لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- كنت حساساً (ألرجي) لـ سيمفاستاتين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" وفي الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء").
- كنت تعاني حالياً من مشاكل في الكبد.
- كنت حاملاً أو مرضعة.
- كنت تتناول أدوية تحتوي على واحد أو أكثر من المواد الفعالة التالية:

- إينزاكونازول، كيتوكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول (المستعملة لعلاج التلوثات الفطرية).

- إيريتروميسين، كلاريثروميسين أو تيليثروميسين

(المستعملة لعلاج التلوثات).
- مثبطات HIV
- بروتياز مثل إيندينافير، نيلفينافير، ريتونافير أو ساكوينافير (مثبطات HIV
- بروتياز المستعملة لعلاج تلوثات HIV).

- بوسبيريفير أو تيلابريفير (المستعملان لعلاج تلوث التهاب الكبد C).
- نيفازودون (المستعمل لعلاج الإكتئاب).
- كوبيبسيستات.

- جيمفيبروزيل (المستعمل لخفض الكوليسترول).

- سيكلوسبورين (المستعمل لدى متعالجين بعد زراعة الأعضاء).

قبل بدء إستعمال الدواء وخلال فترة العلاج بالدواء، سوف يوجهك الطبيب لإجراء فحوص دم وذلك إذا وُجدت لديك أية أعراض لمشاكل في الكبد. وذلك لفحص وظائف كبدك. بعد بدء العلاج بـ **سيمفاكور**، من الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحص دم لفحص وظائف الكبد.

• لا يجوز تناول أكثر من **40** ملغ **سيمفاكور**، إذا كنت تتناول لوميبتايد (دواء يستعمل لعلاج حالة طبية خطيرة ونادرة من الكوليسترول الوراثي).

إسأل طبيبك إن لم تكن واثقاً فيما إذا كان دواؤك يظهر أعلاه.

**كيف يعمل سيمفاكور:**

يحتوي **سيمفاكور** على مادة فعالة تسمى سيمفاستاتين. يُستعمل **سيمفاكور** لخفض نسب الكوليسترول الإجمالي في الدم (total cholesterol)، نسب الكوليسترول "السيء" (كوليسترول الـ LDL) ونسب المركبات الدهنية المسماة الشحوم الثلاثية. بالإضافة لذلك يرفع **سيمفاكور** من نسب الكوليسترول "الجيد" (كوليسترول الـ HDL).

يُتألف الكوليسترول هو أحد المركبات الدهنية الموجودة في الدم. ويسبب HDL. يسمى كوليسترول الـ LDL في كثير من الأحيان بالكوليسترول "السيء"، لأنه قد يتراكم على جدران الشرايين

و يسبب تكون اللويحات. مع مرور الوقت فإن تراكم اللويحات قد يؤدي إلى تضيق الشرايين. إن هذا التضيق قد يبطئ أو يسد جريان الدم لأعضاء حيوية مثل القلب أو الدماغ. قد يؤدي إنسداد جريان الدم إلى نوبة قلبية أو إلى سكتة دماغية. يسمى كوليسترول الـ HDL في كثير من الأحيان بالكوليسترول "الجيد"،

• إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض الوهن العضلي الوبيل (مرض يترافق بضعف عضلي عام الذي يشمل أحياناً العضلات المستعملة خلال التنفس)، أو الوهن العضلي العيني (مرض يسبب ضعف في عضلات العين)، لأن الستاتينات قد تفاقم أحياناً المرض أو تؤدي إلى حدوث وهن عضلي (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

**إتصل بالطبيب المعالج بشكل فوري إذا شعرت بألم في العضلات، حساسية أو ضعف عضلات غير مُشخصة، ذلك لأنه في حالات نادرة، قد تكون المشاكل العضلية خطيرة، بما في ذلك تفكك العضلات الذي يؤدي إلى ضرر كلوي، وفي حالات نادرة جداً إلى الوفاة.**

إن خطورة تفكك العضلات تكون أكبر لدى المرضى الذين يتناولون مقادير دوائية أكبر من **سيمفاكور**، خاصة مقداراً دوائياً قدره 80 ملغ. بالإضافة لذلك، فإن خطورة تفكك العضلات تكون أعلى لدى مرضى معينين. تحدث مع طبيبك إذا إنطقت عليك واحد مما يلي:

- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول.
- وُجدت لديك مشاكل في الكلية.
- وُجدت لديك مشاكل في الكلى.
- بلغ من العمر 65 سنة أو أكثر.
- كنت امرأة.

حدثت لديك في الماضي مشاكل عضلية خلال العلاج بأدوية لخفض الكوليسترول المسماة ستاتينات أو فيبيرات.

• وُجدت لديك أو لقريب عائلتك مرض عضلي وراثي.

• داء من الجائز أن يتطلب الأمر فحوص وأدوية إضافية من أجل تشخيص وعلاج هذا الأمر.

قبل بدء إستعمال الدواء وخلال فترة العلاج بالدواء، سوف يوجهك الطبيب لإجراء فحوص دم وذلك إذا وُجدت لديك أية أعراض لمشاكل في الكبد. وذلك لفحص وظائف كبدك. بعد بدء العلاج بـ **سيمفاكور**، من الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحص دم لفحص وظائف الكبد.

إذا وُجدت لديك مرض السكري أو كنت معرضاً لخطورة تطور مرض السكري، فسوف يجري لك طبيبك متابعة حثيثة. أنت معرض لخطورة تطور مرض السكري إذا وُجدت لديك نسب مرتفعة من السكريات والشحوم في الدم، وزن زائد وضغط دم مرتفع.

فنيروفكومون أو أسينوكومارول (مضادات للتخثر).

• فينوفيبيرات (المستعمل أيضاً لخفض الكوليسترول).

• نيباسين (المستعمل أيضاً لخفض الكوليسترول).
• ريفامبيسين (المستعمل لعلاج السل).

إحك لكل طبيب يصف لك دواء جديداً بأنك تتناول **سيمفاكور** إستعمال الدواء والطعام

يحتوي عصير الجريب فروت على واحد أو أكثر من المركبات التي تؤثر على طريقة تفكك الجسم لأدوية معينة، بما في ذلك **سيمفاكور**. يجب الإمتناع عن إستهلاك عصير الجريب فروت.

الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال **سيمفاكور** إذا كنت حاملاً، تحاولين الحمل أو تعتقدين بأنك حامل. إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بـ **سيمفاكور**، فتوقفي عن تناوله وإتصلي بطبيبك فوراً.

لا يجوز تناول **سيمفاكور** إذا كنت مرضعة، لأنه من غير المعروف فيما إذا كان الدواء ينتقل إلى حليب الأم.

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

• سيكلوسبورين (الذي يُعطى في أحيان متقاربة للمتعالجين بعد زراعة أعضاء).

• دانازول (هورمون إصطناعي الذي يستعمل لعلاج إنتباد الأشخاص قد شععروا بدوار بعد تناول **سيمفاكور**.

• خارج الرحم).

• أدوية تحتوي على مواد فعالة مثل إيتراكونازول، كيتوكونازول، فلوكونازول، بوساكونازول، أو فوريكونازول (المستعملة لعلاج التلوثات الفطرية).

• فبيرات مع مواد فعالة مثل جيمفيبروزيل أو بيزافيبيرات

(المستعملة لخفض الكوليسترول).

• إيريتروميسين، كلاريثروميسين أو تيليثروميسين (المستعملة لعلاج التلوثات الجرثومية).

• مثبطات HIV
- بروتياز مثل إيندينافير، نيلفينافير، ريتونافير، وساكوينافير (المستعملة لعلاج الـ HIV).

• أدوية مضادة للفيروسات لعلاج التهاب الكبد C مثل بوسبيريفير، تيلابريفير، إبلباسفير أو جرازوڤرڤيفير

(المستعملة لعلاج التلوث بفيروس التهاب الكبد C).

• نيفازودون (المستعمل لعلاج الإكتئاب).

• أدوية تحتوي على المادة الفعالة كوبيبسيستات.

• أمويدارون (المستعمل لعلاج عدم إنتظام نظم القلب).

• فبراباميل، ديليتازيم أو ألوديبين (المستعملة لعلاج فرط ضغط الدم، ألم في الصدر المنسوب لمرض قلبي أو في حالات قلبية أخرى).

• لوميبتايد (دواء المستعمل لعلاج حالات خطيرة ونادرة من الكوليسترول الوراثي).

• دايثوميسين (دواء المستعمل لعلاج تلوثات معقدة في الجلد وفي أنسجة الجلد والتي تجرثم الدم). من الجائز أن تكون

الأعراض الجانبية التي تؤثر على العضلات أشد مع تناول هذا الدواء خلال العلاج بـ **سيمفاكور**.

يقرر بأن عليك التوقف بشكل مؤقت عن تناول **سيمفاكور**.

• كوليشيمن (المستعمل لعلاج القرص).

• تيكاجريلور (دواء مضاد للتخثر).

بالإضافة للأدوية المفصلة أعلاه، إحك للطبيب أو للصيدلي إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية. خاصة إحك للطبيب إذا كنت تتناول دواء واحداً من الأدوية التالية:

• أدوية تحتوي على مادة فعالة مضادة لتخثر الدم مثل وارفارين، فينبروكومون أو أسينوكومارول (مضادات للتخثر).

• فينوفيبيرات (المستعمل أيضاً لخفض الكوليسترول).

• نيباسين (المستعمل أيضاً لخفض الكوليسترول).

• ريفامبيسين (المستعمل لعلاج السل).

إحك لكل طبيب يصف لك دواء جديداً بأنك تتناول **سيمفاكور** إستعمال الدواء والطعام

يحتوي عصير الجريب فروت على واحد أو أكثر من المركبات التي تؤثر على طريقة تفكك الجسم لأدوية معينة، بما في ذلك **سيمفاكور**. يجب الإمتناع عن إستهلاك عصير الجريب فروت.

الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال **سيمفاكور** إذا كنت حاملاً، تحاولين الحمل أو تعتقدين بأنك حامل. إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بـ **سيمفاكور**، فتوقفي عن تناوله وإتصلي بطبيبك فوراً.

لا يجوز تناول **سيمفاكور** إذا كنت مرضعة، لأنه من غير المعروف فيما إذا كان الدواء ينتقل إلى حليب الأم.

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

**السياقة وإستعمال الماكئات**

من غير المتوقع أن يؤثر **سيمفاكور** على قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكئات. مع ذلك، يجب الأخذ بالحسبان بأن بعض الأشخاص قد شععروا بدوار بعد تناول **سيمفاكور**.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

**يحتوي سيمفاكور على سكر يسمى لكتوز.** إذا قيل لك من قبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة فليكُ إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

يحتوي **سيمفاكور** على أقل من 1 ميليول (23 ملغ) صوديوم في القرص، أي أن القرص فعلياً "خال من الصوديوم".

**(3 كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإبتزاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

المقدار الدوائي الإبتدائي الموصى به هو 10 أو 20 ملغ مرة في اليوم، في المساء، مع أو بدون طعام.

يجب بلع الدواء مع القليل من الماء.

بسبب تزايد الخطورة لحدوث مشاكل في العضلات، فإن المقدار الدوائي ذو 80 ملغ هو فقط لمتعالجين الذين يتناولون مقداراً دوائياً ذو 80 ملغ بشكل مُزمن (مثلاً 12 شهراً وما فوق)

بدون تضرر العضل والذين هم ليسوا بحاجة لتناول أدوية معينة أخرى. سوف مع **سيمفاكور**، التي قد تزيد من الإحتمال لديهم لتطور ضرر في العضل.

من الجائز أن يصف لك طبيبك مقادير دوائية أخفض، خاصة إذا كنت تتناول الأدوية معينة، من تلك الظاهرة أعلاه، أو كنت تعاني من حالات معينة في الكلية.

إذا كنت تتناول أيضاً أدوية رابطة للأحماض الصفراوية (أدوية لخفض الكوليسترول) مثل كوليستيرامين، فليكك تناول **سيمفاكور** ساعتين على الأقل قبل أو أربع ساعات بعد تناول أدوية رابطة للأحماض الصفراوية.

**لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.**

**الفحوص والمتابعة:**

• خلال فترة العلاج بـ **سيمفاكور**، يجب إجراء فحوص لوظائف الكبد.

• خلال فترة علاجك بهذا الدواء، سيجري لك طبيبك متابعة حثيثة إذا وُجدت لديك سكري أو إذا كنت معرضاً لخطورة أن يتطور لديك مرض السكري. من الجائز أن تكون معرضاً لخطورة أن يتطور لديك مرض السكري إذا وُجدت لديك نسب مرتفعة من السكريات والشحوم في دمك، لديك وزن زائد وضغط دم مرتفع.

• توجه إلى طبيبك بشكل دائم لفحص نسبة الكوليسترول لديك ولتأكد فيما إذا وُجدت لديك أعراض جانبية. يجب على طبيبك إجراء فحوص دم لفحص كبدك قبل أن تبدأ بتناول **سيمفاكور** ولتأكد فيما إذا وُجدت لديك أية أعراض لمشاكل في الكبد خلال فترة تناول **سيمفاكور**.

**السحق/الشرط المضعف:**

**سيمفاكور 40 - لا يجوز شطر القرص.** لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

**سيمفاكور 20، سيمفاكور 80** - عند الحاجة بالإمكان سحق أو مضغ القرص.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى الأشخاص قد شععروا بدوار بعد تناول **سيمفاكور**.

لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب.

عليك المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة طبيبك، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول **سيمفاكور** إلا إذا أوصاك طبيبك بالتوقف.

واصل تناول **سيمفاكور** إلا إذا أوصاك طبيبك بالتوقف. إذا توقفت عن تناول **سيمفاكور**، فإن الكوليسترول لديك قد يرتفع ثانية.

**لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.**

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

**(4 الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، إن إستعمال **سيمفاكور** قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

**أعراض جانبية خطيرة نادرة (rare) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:**

كما بكل دواء، إن إستعمال **سيمفاكور** قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

**أعراض جانبية خطيرة نادرة (rare) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:**

**يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية:**

• ألم في العضلات، حساسية العضلات، ضعف عضلي، تقلصات عضلية أو تمزق في العضل (نادر جداً). ذلك لأنه في أحيان نادرة قد تكون هذه المشاكل العضلية خطيرة، بما في ذلك تفكك العضلات الذي يؤدي إلى تضرر الكلية لا بل في حالات نادرة جداً إلى الوفاة.

• ردود فعل لفرط الحساسية (ألرجيا) تشمل: إنتفاخ الوجه، اللسان أو الحنجرة التي قد تؤدي إلى صعوبات في التنفس (وذمة وعائية).

• آلام عضلية خطيرة، عادة في الكتفين أو في الفخذين (آلام عضلية روماتيزمية).

• طفح يترافق بضعف الأطراف وعضلات الرقبة.

• طفح الذي قد يظهر في الجلد وتقرحات في الفم (lichenoid drug eruptions (نادر جداً).

• آلام أو التهاب في المفاصل.

• التهاب في الأوعية الدموية (vasculitis).

• كدمات غير إعتيادية، طفح أو إنتفاخ جلدي (dermatomyositis)، شرى، حساسية الجلد لضوء الشمس، سخونة، تورؤ.

• ضيق في التنفس (dyspnea) وشعور عام غير جيد.

• حالة تشبه لويوس (بما في ذلك طفح، مشاكل في المفاصل وتأثير على خلايا الدم).

• التهاب الكبد الذي يترافق بالأعراض التالية: إصفرار الجلد والعينين، حكة، بول بلون داكن أو براز بلون فاتح، الشعور بإرهاق أو ضعف، فقدان الشهية للطعام، قصور مميت وغير مميت في الكبد (نادر جداً).

• التهاب البنكرياس (pancreatitis)، الذي يترافق عادة بآلام خطيرة في البطن.

**أعراض جانبية خطيرة نادرة جداً (very rare) - أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:**

• رد فعل تحسسي خطير الذي يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو إلى دوار (anaphylaxis).

• التثدي لدى الذكور (تضخم الصدر لدى الرجال).

**أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:**

• تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

• خدر أو ضعف في الذراعين وفي الرجلين.

• صداع، دوار، الشعور بوخز.

• تشوش الرؤية، خلل في الرؤية.

• إضطرابات في الرؤية، الجهاز الهضمي (آلام في البطن، إمساك، إنتفاخ، عسر هضم، إسهال، غثيان، تقيؤ).

• طفح، حكة، تساقط الشعر.

• مشاكل في النوم (نادر جداً).

• ضعف في الذاكرة (نادر جداً)، فقدان الذاكرة، إرتباك.

**أعراض جانبية شيوعها غير معروف (أعراض شيوعها لم يحدد بعد):**

• مشاكل في إنتصاب العضو الذكري.

• إكتئاب.

• مشاكل في الأوتار، التي قد تصبح أحياناً معقدة لدرجة تمزق الوتر.

• ضعف عضلي دائم.

• الوهن العضلي الوبيل (مرض يؤدي إلى ضعف عضلي عام وفي حالات معينة أيضاً إلى ضعف في العضلات التي تشترك في عملة التنفس).

• الوهن العضلي العيني (مرض الذي يؤدي إلى ضعف في عضلات العين).

تحدث مع الطبيب إذا شعرت بضعف في الذراعين أو في الرجلين الذي يتفاقم بعد فترة من النشاط، إزدواجية الرؤية أو تدلي الحفون، صعوبة في البلع، أو ضيق في التنفس.

**أعراض جانبية محتملة خلال إستعمال الستاتينات:**

• إضطرابات في النوم بما في ذلك كوابيس ليلية.

• صعوبات في الأداء الوظيفي الجنسي.

• مشاكل في التنفس التي تشمل سعال دائم و/أو ضيق في التنفس أو سخونة.

• سكري. حدوث هذا الأمر محتمل أكثر إذا وُجدت لديك نسب مرتفعة من السكريات والشحوم في الدم، وزن زائد وارتفاع في ضغط الدم.

• سكتابك طبيبك خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

**قيم نتائج مخبرية:**

لوحخت إرتفاعات في فحوص دم معينة لفحص وظائف الكبد وإنزيم العض (كرياتين كيناز).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

**التبليغ عن أعراض جانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الفسطة على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il/

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم م.ض."

**(5 كيفية تخزين الدواء؟**

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان آمن بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبلة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• شروط التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

**(6 معلومات إضافية**

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على: Lactose, Pregelatinized Starch, Microcrystalline Cellulose, Carmellose Sodium LS, Ascorbic Acid, Citric Acid, Magnesium Stearate, Butylated Hydroxyanisole, Opagdry Coatings.

يحتوي كل قرص مطلي من **سيمفاكور 20** على 138 ملغ لكتوز.

يحتوي كل قرص مطلي من **سيمفاكور 40** على 276 ملغ لكتوز.

يحتوي كل قرص مطلي من **سيمفاكور 80** على 552 ملغ لكتوز.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: info@unipharm.co.il or by telephone: 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني info@unipharm.co.il أو على هاتف رقم 03-6135050.

بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد