

## עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

### **ב'יבי גאם ג'יל**

#### **חומרים פעילים:**

קולין סליצילט (Choline salicylate) 8.7% w/w  
צטלקוניום כלורייד (Cetalkonium chloride) 0.01% w/w  
רשימת המרכיבים הנוספים ראה סעיף 6. ראה גם 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' בסעיף 2.

קרוא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווקח.  
עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון לעalon זה. היועץ ברווקח אם אתה זקוק למידע נוסף.  
עליך לפנות לרופא במידה והتسمינאים מחמירים, או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

ג'ל מחתא ומפיג' כאבים בחלל הפה.

התרופה מיועדת להקלת בכאבי צמיחת שניינים, כאבם בחלל הפה, גירויים משניים תותבות ופציעי קור.

#### **קבוצה רפואיית:**

קולין סליצילט – משכך כאבים  
צטלקוניום כלורייד – מחתא

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

#### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (רשימת המרכיבים הנוספים, ראה סעיף 6).
- אתה רגיש (אלרגי) לסליצילטים, אספירין, נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) או לציטילפירידינים.
- אתה נוטל אספירין או סליצילטים אחרים (אלא אם הרופא הורה זאת).
- אין להשתמש בתינוקות מתחת לגיל 4 חודשים.
- אתה סובל מכיב קיבה פעל, או אם יש לך היסטוריה של כיב קיבה חוזרת.
- אין להשתמש במצבים של מחלות ויראליות כגון שפעת או אבעבועות רוח, במיוחד ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים, מחשש לתסמנות ריאתית.

#### **اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- אם לא חל שיפור אחרי 3 ימים, יש להתייעץ עם הרופא.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת מבל' להיעזר ברופא.
- יש להකפיד על הוראות השימוש. אין לעבור על המנה המומלצת ועל תדירות השימוש, במיוחד בתינוקות וילדים מתחת לגיל 16, היהות שימוש תכוף מיד או במננה גבוהה מדי עלולים לגרום להרעלת סליציליטים. ראה סעיף 6.
- אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר.
- יש להימנע מגעה של הגוף עם העיניים.

#### **ילדים ומתבגרים:**

אין להשתמש בתינוקות מתחת לגיל 4 חודשים.

#### **תגובה בין תרופתיות:**

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרווקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- אספירין וסליצילטים אחרים: אין להשתמש במקביל לב'יבי גאם, אלא בהוראת רופא.
- תרופות נגד דמדומים: שימוש בב'יבי גאם במקביל לתרופות אלה, עלול להגבר את השפעתן.
- תרופות נגד שיגdon (כגון probenic acid): שימוש בב'יבי גאם במקביל לתרופות אלה, עלול להפחית את השפעתן.

## שימוש בתרופה ומזון אין לאכול או לשות בסמוך למרייה בפה.

- הרין והנקה:**
- אין להשתמש בתרופה מבל' להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם את בהריון, מתכנתת הרין או מניקה.
  - סליציליטים עלולים להאריך דימומי ולגרום לדימום בלבד או באם, ולכן אין להשתמש בהם בשלב הריון מתקדם.
  - סליציליטים מופרשים בكمויות קטנות בחלב אם, ובמקרים נדירים מאוד עלולים לגרום לתופעות לוואי בתינוק.

## מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

- כל שפופרת מכילה כ-4 גרם (ב-7% 47%) אלכוהול (אלכוהול).
- כל מנה של כ-0.5 ס"מ מכילה כמות קטנה של אלכוהול (כ-70 מ"ג), שהינה שווה ערך לפחות מ-2 מיליליטר בירה או 1 מיליליטר יין. לכמות אלכוהול זו אין השפעה ניכרת. עלול לגרום לתחושת צריבה על עור/רירית פצעה.
- תרופה זו מכילה לפחות מ-0.001 נטרן (23 מ"ג) בכל מנה, כולל נחשבת נטולת נטרן.
- הgel מכיל סודיום מטה ביסוליפיט (Sodium metabisulfite) שעולל לעיתים נדירות לגרום לתגובה רגשית יתר חמורות ולעווית סימפונות (Bronchospasm).

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
לMRIחה במקום הכאב בחלל הפה.  
לא לבליה.

### המינון המקבול בדרך כלל הוא:

- ילדים מגיל 4 חודשים עד 16 שנים:** יש לשימוש על אצבע נקיה ג'ל באורך של כ-0.5 סנטימטר (גודל אפונה) ולמרוח על האזור הכאב תוך כדי עיסוי. ניתן לחזור על טיפול זה כל 3 עד 4 שעות, אך לא יותר מ- 6 פעמים ביוםמה.
- מבוגרים:** יש לשימוש על אצבע נקיה ג'ל באורך של 1 עד 1.5 סנטימטר ולמרוח על האזור הכאב תוך כדי עיסוי. ניתן לחזור על טיפול זה כל 3 עד 4 שעות, אך לא יותר מ-6 פעמים ביוםמה.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור תוך 3 ימים או אם חלה החמרה יש לפנות לרופא.

### אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר

אם נעשה שימוש במינון גבוה יותר, פנה מיד לרופא או לחדר מיען של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמנני מינון יתר שקשורים להרעלת סליציליטים מסוימים: בחילוות, הקאות, חום, בלבול וחוסר התמצאות, צלצולים באוזניים, היפרוננטילציה (נשימת יתר), התיבשות, סחרחות, דימום מערכת העיכול, הפרעות במאזן חומצה/בסיס, פרכוסים, תרדמת.

### אם שכחת לחשוף בתרופה

במידה ויש צורך - השתמש בג'ל לפי ההוראות בסעיף זה. אל תשתמש במנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אין להשתמש או ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בביבי גאם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיית תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מתפתחת תגובה אלרגית כגון התקף אסטמה, עווית סימפונות או קשיי נשימה.**

## **תופעות לוואי נוספת**

תופעת לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעת ששכיחותן טרם נקבעה):  
דלקת, צריבה, חוסר תחושה או עקצוץ של הפה ו/או החניכיים.

## **תופעות לוואי ותגובה בין תרופתיות בילדים ותינוקות:**

דווחו מקרים של תגובה החשודה כתסמנות ריאי ו/או הרעלת סליציליטים בילדים שמרחו תכשירים המכילים כלין סליצילט, אך לא הוכחה הסיבותיות במרקם אלה. ראה סעיף 'אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר'.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואאי חממייה, או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעת לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- **מנע הרעלת!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חדש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל- $-C^{\circ} 25$ . יש להקפיד על סגירת הפקק היבט לאחר כל שימוש. לאחר הפתיחה הראשונה של השפופרת ניתן להשתמש בג'ל במשך 2 חודשים, אך לא יותר מתאריך התפוגה המוטבע על גבי האריזה.

## **6. מידע נוסף**

### **נוסך על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:**

Ethanol, choline salicylate, glycerin, hydroxypropyl methylcellulose 4000, sodium cyclamate, oil of anise, menthol, cetalkonium chloride, sodium metabisulfite, hydrochloric acid, purified water.

### **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?**

gal שקוף בשפופרת אלומיניום. השפופרת מכילה 10 גרם.

היצן ובעל הרישום: מעבדות רפואי בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301  
משווק בלבדית ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 131-49-31109

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בנובמבר 2023 בהתאם להוראות משרד הבריאות.