

**Информационный листок для потребителя в соответствии
с Правилами фармацевтики (лекарственные препараты) от 1986 г.**

Безрецептурный препарат

Гель "Беби Гам"

Действующие вещества:

Салицилат холина (Choline salicylate) 8,7% w/w

Хлорид цеталкония (Cetalkonium chloride) 0,01% w/w

Список дополнительных компонентов приведен в пункте 6. Смотрите также важную информацию о некоторых компонентах препарата, приведенную в пункте 2 ниже.

Перед началом применения препарата внимательно прочтите этот информационный листок до конца. В нем приведена краткая информация о препарате. Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или фармацевту.

При применении препарата следует соблюдать указания, приведенные в пункте о дозировке ниже.

Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом. Если через 3 дня симптомы не улучшатся или усугубятся, обратитесь к врачу.

1. Для чего предназначен этот препарат?

Гель предназначен для дезинфекции и облегчения болевых ощущений в полости рта.

Этот препарат служит для облегчения болей при росте зубов, при язвах в полости рта, при раздражении от зубных протезов и при герпесе.

Терапевтическая группа:

Салицилат холина - обезболивающее средство.

Хлорид цеталкония - дезинфицирующее средство.

2. Перед применением препарата

Применение данного препарата запрещено в следующих случаях:

- Если у вас есть чувствительность (аллергия) к действующим веществам или к одному из вспомогательных компонентов препарата (список вспомогательных компонентов приведен в пункте 6 ниже).
- Если у вас есть чувствительность (аллергия) к салицилатам, аспирину, нестероидным противовоспалительным препаратам (NSAIDs) или цетилперидинию.
- Если вы принимаете аспирин или другие салицилаты (за исключением соответствующих назначений врача).
- Препарат не предназначен для младенцев до возраста 4 месяцев.
- Если у вас язва желудка в острой форме, или если у вас в прошлом были рецидивы язвы желудка.
- Не следует пользоваться препаратом при вирусных заболеваниях, например, при гриппе или ветрянке, в особенности давать детям и подросткам моложе 16 лет, в связи с риском развития синдрома Рея.

Особые меры предосторожности в отношении применения препарата

- Если через 3 дня состояние не улучшается, следует проконсультироваться с врачом.
- Не следует пользоваться препаратом часто или на протяжении длительного времени, не проконсультировавшись с врачом.
- Следует строго соблюдать инструкции по применению препарата. Не превышайте рекомендуемую дозу и частоту приема, в особенности это касается младенцев и детей до 16 лет. Слишком частое использование или слишком высокие дозы препарата могут привести к отравлению салицилатами. Смотрите пункт "Если вы случайно превысили дозу".

- Следует избегать попадания геля в глаза.

Применение препарата у детей и подростков:

Препарат не предназначен для младенцев в возрасте до 4 месяцев.

Взаимодействие между лекарственными препаратами:

Если вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. Это особенно касается следующих случаев:

- Если вы принимаете аспирин и другие салицилаты, то не следует сочетать их с гелем "Беби Гам" при отсутствии соответствующих указаний врача.
- Если вы принимаете противотромбозные препараты, то пользование гелем "Беби Гам" может усилить их действие.
- Если вы принимаете лекарства против подагры (например, probenic acid), то пользование гелем "Беби Гам" может ослабить их действие.

Режим питания при применении препарата

Не следует есть или пить сразу до или сразу после нанесения препарата в ротовой полости.

Беременность и кормление грудью:

Если вы беременны, планируете забеременеть или кормите ребенка грудью, то не следует пользоваться препаратом без предварительной консультации с врачом.

- Салицилаты способны вызывать более длительное кровотечение и спровоцировать кровотечение у ребенка или у матери, поэтому не следует применять их на поздних стадиях беременности.
- Салицилаты в небольших количествах выделяются в грудное молоко и в очень редких случаях могут вызывать побочные явления у ребенка.

Важная информация о некоторых компонентах препарата:

- Каждый тюбик содержит примерно 4 грамма (47% v/v) этанола (спирта).
- Доза препарата в размере примерно 0,5 см содержит небольшое количество спирта (около 70 мг), что соответствует менее 2 мл пива или 1 мл вина. Такое количество алкоголя не оказывает существенного воздействия. Препарат может вызывать ощущение жжения на поврежденной коже/слизистой.
- Каждая доза этого препарата содержит менее 1 mmol (23 мг) натрия, то есть препарат считается безнатриевым.
- В состав геля входит пиросульфит натрия (Sodium metabisulfite), который в редких случаях может вызывать острые реакции гиперчувствительности и бронхоспазм (Bronchospasm).

3. Как использовать препарат?

При возникновении любых сомнений в отношении дозировки и метода лечения следует обратиться к врачу или фармацевту.

Препарат предназначен для нанесения на болезненные участки в полости рта.

Не глотать.

Принятая дозировка, как правило, составляет:

Для детей от 4 месяцев до 16 лет: выдавить на чистый палец примерно 0,5 см геля (размером с горошину) и массирующими движениями нанести на болезненный участок. Можно повторять каждые 3-4 часа, но не более 6 раз в сутки.

Для взрослых: выдавить на чистый палец 1 - 1,5 см геля и массирующими движениями нанести на болезненный участок. Можно повторять каждые 3-4 часа, но не более 6 раз в сутки.

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Если в течение 3 дней состояние не улучшится или ухудшится, необходимо обратиться к врачу.

Если вы случайно превысили дозу

Если вы нанесли более высокую дозу препарата, то следует немедленно обратиться к врачу или в приемный покой больницы, захватив с собой упаковку. Признаки превышения дозы, которые могут указывать на отравление салицилатами, включают тошноту, рвоту, повышение температуры, спутанность сознания и потерю ориентации в пространстве, звон в ушах, гипервентиляцию легких (интенсивное дыхание), обезвоживание, головокружение, кровотечение в органах пищеварения, нарушение кислотно-щелочного баланса, спазмы и кому.

Если вы забыли вовремя нанести препарат

Если в этом есть необходимость, то нанесите гель, как описано выше. Не следует наносить двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную.

Не следует использовать или принимать лекарственные препараты в темноте! Проверяйте этикетку и дозу при каждом нанесении препарата. Если вы читаете в очках, то наденьте их.

Если у вас есть дополнительные вопросы по поводу использования препарата, обращайтесь к врачу или фармацевту.

4. Побочные явления

Гель "Беби Гам", как и любой другой лекарственный препарат, может вызывать побочные явления у части пациентов. Не пугайтесь длинного списка побочных явлений. Возможно, у вас не возникнет ни одно из них.

Необходимо прекратить применение препарата и срочно обратиться к врачу, если у вас возникает аллергическая реакция - например, приступ астмы, бронхоспазм или затрудненное дыхание.

Другие побочные явления

Побочные явления, частота которых неизвестна (явления, частота которых пока еще не установлена):

Воспаление, жжение, отсутствие чувствительности или покалывание в области рта и/или десен.

Побочные явления и взаимодействие между лекарственными препаратами у детей и младенцев:

У детей, которым были нанесены препараты, содержащие салицилат холина, отмечались случаи реакции, вызывающей подозрение на синдром Рея и/или на отравление салицилатами. Тем не менее, доказательства причинно-следственной связи между этими явлениями отсутствуют. Смотрите пункт "Если вы случайно превысили дозу" выше.

Если у вас возникло побочное явление, если одно из побочных явлений обострится или вы страдаете от побочных явлений, не указанных в этом информационном листке, вам следует проконсультироваться с врачом.

О побочных явлениях можно сообщать в Министерство здравоохранения. Для этого следует зайти по ссылке "Сообщить о побочных явлениях в связи с приемом лекарственных препаратов" на домашней странице сайта Минздрава (www.health.gov.il) в онлайн-форму для сообщения о побочных явлениях или пройти по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. Как хранить препарат?

- **Избегайте отравления!** Чтобы предотвратить отравление, этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, не доступном для детей и/или младенцев. Не

вызывайте рвоту, не получив на это четких указаний врача.

- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), который приведен на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- **Условия хранения:** хранить при температуре ниже 25°C. После каждого применения следует плотно закрыть колпачок. Гелем можно пользоваться в течение 2 месяцев после вскрытия тюбика, но не позже даты истечения срока годности, которая указана на упаковке.

6. Дополнительная информация

Кроме действующих веществ в состав препарата входят следующие компоненты:

Ethanol, choline salicylate, glycerin, hydroxypropyl methylcellulose 4000, sodium cyclamate, oil of anise, menthol, cetalkonium chloride, sodium metabisulfite, hydrochloric acid, purified water.

Как выглядит препарат, и что входит в состав упаковки?

Бесцветный гель в алюминиевом тюбике. Емкость тюбика - 10 грамм.

Производитель и владелец регистрации: "Маабадот Рафа Лтд.", Израиль, Иерусалим, 9100301, п.я. 405.

Эксклюзивный распространитель: "Супер-Фарм (Исраэль) Лтд.", Герцлия, 4672516, п.я. 2171.

Регистрационный номер препарата в государственном реестре Министерства здравоохранения:
131-49-31109

Формулировки в мужском роде использованы исключительно в целях удобства чтения и относятся к обоим полам.

Информационный листок составлен в ноябре 2023 года в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения.