

ليكفيو 284 ملغ

محلول للحقن في محقنة جاهزة للاستعمال، للحقن تحت الجلد

المادة الفعالة:

يحتوي كل 1.5 مل من محلول في محقنة جاهزة للاستعمال على إنكليسيران الصوديوم (inclisiran sodium) بما يعادل 284 ملغ إنكليسيران.

كل 1 مل يحتوي على إنكليسيران الصوديوم يعادل 189 ملغ من إنكليسيران.

المواد غير الفعالة ومسبيات الحساسية: انظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها ونلوك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا كانت لديك أسلحة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الصحية وحالتهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

ليكفيو معد للبالغين الذين لديهم فرط كوليسترول الدم الأولى (العائي متغير الأزداج أو غير العائلي)، أو عسر شحميات الدم المختلط، بالإضافة إلى الحمية الغذائية.

- بالدمج مع ستاتين أو بالدمج مع ستاتين وعلاجات أخرى لخفض مستويات الدهنيات في الدم، لدى متعالجين لا يحققون

القيم المرجوة من الكوليسترول من نوع LDL عند إعطائهم الحد الأقصى من جرعة ستاتين التي يمكن تحملها، أو

- كعلاج وحيد أو بالدمج مع علاجات أخرى لخفض مستويات الدهنيات في الدم، لدى متعالجين لا يستطيعون تحمل

الستاتينات أو أن هناك مانع استعمال لإعطائهم الستاتينات.

المجموعة العلاجية: أدوية تؤثر في الدهنيات (الليبيات)، أدوية أخرى تؤثر في الدهنيات (الليبيات).

يحتوي ليكفيو على المادة الفعالة إنكليسيران. يخفض إنكليسيران مستويات الكوليسترول من نوع LDL (الكوليسترول

"السي")، الذي قد يسبب مشاكل في القلب والدورة الدموية عندما تكون مستوياته مرتفعة.

يعمل إنكليسيران عبر إعاقة الحمض النووي الريبيوزي (مادة وراثية في خلايا الجسم) للحد من إنتاج بروتين يدعى PCSK9. يمكن أن يرفع هذا البروتين مستويات الكوليسترول من نوع LDL، ويساعد من إنتاجه على خفض مستويات

الكوليسترول LDL لديك.

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

• كانت لديك حساسية (أرجية) لإنكليسيران أو لأحد المكونات الأخرى التي يحتويها الدواء (المفصلة في البند 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بليكفيو أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا:

• كنت تتلقى علاجاً بغسيل الكلى

• كنت تعاني من مرض كبد خطير

• كنت تعاني من مرض كلوي خطير

الأطفال والمرأهقون:

هذا الدواء غير معد للأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاما.

ليست هناك معلومات متعلقة بسلامة ونجاعة استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاما.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكممات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تنتهي أنك حامل، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال الدواء.

هناك معلومات محدودة حول الاستعمال أثناء الحمل، لهذا يجب تجنب استعمال ليكفيو خلال الحمل.

ليس معروفاً فيما إذا كان ليكفيو ينتقل إلى حليب الأم. يساعدك طبيبك في اتخاذ القرار فيما إذا كان يمكنك متابعة الرضاعة أو بدء العلاج بليكفيو. سينظر الطبيب في الفادحة التي تجنيتها من العلاج مقابل الخطر المحتمل على طفلك عند الرضاعة خلال العلاج.

الخصوصية

لا تتوفر معلومات عن تأثير ليكفيو على الخصوبة لدى البشر.

في الأبحاث على الحيوانات، لم يشاهد تأثير على الخصوبة.

السيارة واستعمال الماكينات:

يؤثر ليكفيو قليلاً أو لا يؤثر إطلاقاً في قدرتك على السيارة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء:

يحتوي ليكفيو على الصوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليون من الصوديوم (23 ملغم) في كل جرعة، أي إنه يعتبر في الواقع "خالي من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

عليك الحصول مع الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها غالباً من ليكفيو هي 284 ملغ بالحقن تحت الجلد. تُعطى الجرعة التالية بعد 3 أشهر، وبعد ذلك تُعطى جرعات إضافية كل 6 أشهر.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

قبل بدء العلاج بليكفيو، احرص على تناول تغذية لخفض الكوليسترول ومن المتوقع أن تتناول ستاتين. عليك أن تحافظ على اتباع هذه التغذية وتواصل تناول ستاتين طوال كل الفترة التي تتناول فيها ليكفيو.

ليكفيو معد للحقن تحت الجلد في منطقة البطن. يشتمل موقع الحقن البديل على الذراع العلوية أو الفخذ. يعطي طبيب أو ممرضة (أحد أفراد الطاقم الطبي) ليكفيو لك.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى يعطي طبيب أو ممرضة (أحد أفراد الطاقم الطبي) هذا الدواء لك. في حالة غير متوقعة جداً، يتم فيها إعطاؤك جرعة أعلى من الدواء (جرعة مفرطة)، على الطبيب أو عضو آخر من الطاقم الطبي أن يفحصا إذا ظهرت لديك أعراض جانبية.

إذا تخطيت موعد الحقن، توجه إلى الطبيب أو الممرضة في أسرع وقت ممكن لتحديد موعد الحقن التالي الخاص بك.

يجب الدوامة على العلاج حسب توصية الطبيب.
 حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.
 ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ليكفيو أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل لا تعاني من أيٍ منها.

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:
• رد فعل في موقع الحقن، مثلًا: آلم، أحمرار أو طفح.

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة بأعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يحولك إلى استماراة على الإنترن特 للتبليل عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تحتَّب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي و المجال روؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقىو دون تعليمات صريحة من الطبيب.
 لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة أقل من 30 درجة مئوية. يمنع التجميد.

يفحص الطبيب، الصيدلي أو الممرضة الدواء، ويخلصون منه في حال كان يتضمن جزيئات.

لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات المنزلية. يتخلص الطبيب، الصيدلي أو الممرضة من الأدوية التي لم تعد تستعملها. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:
water for injections, sodium hydroxide, concentrated phosphoric acid.

انظر أيضاً البند "يحتوي ليكفيو على الصوديوم".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة
ليكفيو هو محلول صاف، عديم اللون ضارب إلى الأصفر الباهت، حال من الجزيئات.

تحتوي كل عبوة على محقنة واحدة جاهزة للاستعمال لمرة واحدة.

اسم صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه:
نوفارتيس إسرائيل. م.ض.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم تحريرها في حزيران 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 99-36715-93-167.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسييلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.

ה מידע הבא מיועד לאנשי הצוות הרפואי בלבד:
The following information is intended for healthcare professionals only:


المعلومات التالية معدة للطاقم الطبي فقط:

הוראות שימוש בקווין מזרק מוקן לשימוש ללא מגן מחט:

Instructions for Use for Leqvio pre-filled syringe without needle guard:

تعليمات استعمال ليكيوين محقنة جاهزة للاستعمال بدون واقي إبرة:

This section contains information on how to inject Leqvio.



Important information you need to know before injecting Leqvio

- **Do not** use the pre-filled syringe if any of the seals on the outer carton or the seal of the plastic tray are broken.
- **Do not** remove the needle cap until you are ready to inject.
- **Do not** use if the pre-filled syringe has been dropped after removing the needle cap.
- **Do not** try to re-use or take apart the pre-filled syringe.

Step 1. Inspect the pre-filled syringe


You may see air bubbles in the liquid, which is normal. **Do not** try to remove the air.

- **Do not** use the pre-filled syringe if it looks damaged or if any of the solution for injection has leaked out of the pre-filled syringe.

Step 2. Remove needle cap


Firmly pull straight to remove the needle cap from the pre-filled syringe. You may see a drop of liquid at the end of the needle. This is normal. **Do not** put the needle cap back on. Throw it away.

Note: **Do not** remove the needle cap until you are ready to inject. Early removal of the needle cap prior to injection can lead to drying of the drug product within the needle, which can result in needle clogging.



Step 3. Insert needle


Gently pinch the skin at the injection site and hold the pinch throughout the injection. With the other hand insert the needle into the skin at an angle of approximately 45 degrees as shown.



Step 4. Inject

Continue to pinch the skin. Slowly press the plunger **as far as it will go**. This will make sure that a full dose is injected.

Note: If you cannot depress the plunger following insertion of the needle, use a new pre-filled syringe.



Step 5. Complete injection and dispose of the pre-filled syringe

Remove the pre-filled syringe from the injection site. Do not put the needle cap back on.

Dispose of the pre-filled syringe in accordance with local requirements.