

**לקווין 284 מ"ג**

תמיישה להזרקה בمزרק מוכן לשימוש להזרקה תת-עורית

חומר פועל:

כל 1.5 מ"ל של תמיישה בمزרק מוכן לשימוש מכיל אינקליסירן נתרן (inclisiran sodium) שהוא שווה ערך ל-284 מ"ג אינקליסירן.

כל 1 מ"ל מכיל אינקליסירן נתרן שווה ערך ל-189 מ"ג אינקליסירן.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 6 "מידע נסוף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התוורופה".

**5. איך לאחסן את התוורופה?**

מנע הרעללה! התוורופה זו וכל תוורופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום לההקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתוורופה אחריה תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה

מטיעת המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

**תנאי אחסון:** אחסון מתחת ל-30 מעלות צלזיוס. אין להקפי.

הרופא, הרוקח או האחות יבדקו את התוורופה ושילכו אותה אם היא מכילה חלקיקים.

לקווין הינה תמיישה צוללה, חסרת צבע עד צהוב חיוור, נקייה מחליקים.

כל אריזה מכילה מזрак אחד מוכן לשימוש, לשימוש חד פעמי.

**שם בעל הרישום והיבואן וכותבות:**  
nobretex ישראל בע"מ, ת"ד 7126, תל אביב.

עדכן ביוני 2024.

קרא בעיון את העילן עד סופו בטרם תשמש בתוורופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התוורופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תוורופה זו נרשמה לטיפול רפואי. אל תעבורי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראתה לך כי מצבם הרופאי דומה.

**1. למה מיועדת התוורופה?**

לקווין מיועדת למבוגרים עם היפרcolesterol מוגברת, ראשונית (משפחתי הטרזיגוטית או שאינה

משפחתיית) או דיסליפידמיה מוגברת, בתוספת לדיאטה:

- בשילוב עם סטטין או בשילוב עם סטטין וטיפולים אחרים להורדת רמות השומנים בדם, במטופלים אשר אינם מגיעים לערכי המטרה של LDLコレsterol עם מינון מקסימלי נסבל של סטטין, או

- טיפול ייחיד או בשילוב עם טיפולים אחרים להורדת רמות השומנים בדם, במטופלים בעלי חיסר סבירות לטסטינים או בעלי התוורופה נגד לטסטינים.

**קבוצה רפואיית:** תרופות המשפיעות על שומנים (לייפידים), תרופות אחרות המשפיעות על שומנים (לייפידים).

לקווין מכילה את החומר הפעיל אינקליסירן. אינקליסירן מוריד רמות שלコレsterol מסוג LDL (コレsterol רע), אשר עלול לגרום לביעות בלב ובמחזור הדם כאשר רמותיו גבוהות. אינקליסירן פועל על ידי הפרעה לרב"א (חומר גנטי בתאי הגוף) כדי להגביל את יצורו של חלבון הנקרא PCSK9. חלבון זה יכול להעלות רמותコレsterol מסווג LDL ומונעת ייצורו מסיעת להוריד את רמות LDLコレsterol שלך.

**2. לפני השימוש בתוורופה:**

אין להשתמש בתוורופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאינקליסירן או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התוורופה (המפורטים בסעיף 6).

אחדות מיוחדת לבלקווין, ספר לרופא, לרוקח או לאחות אם:

- אתה מטופל בדיאלייזה
- יש לך מחלת כבד חמורה
- יש לך מחלת כליה חמורה

**ילדים ומטופרים:**

תוורופה זו אינה מיועדת לילדים ומטופרים מתחת לגיל 18.

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתוורופה זאת לילדים ומטופרים מתחת לגיל 18.

**אינטראקטיות/תגובה בין תרופיות:**

אם אתה לוקת, או אם לך חותמת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח.

**הריון, נקקה ופוריות:**

אם את בהריון או מניקה, חושבת שייתכן שתאת בהריון או מתכוננת הריון, היועץ ברופא, ברוקח או באחות טרם השימוש בתוורופה.

יש מידע מוגבל בשימוש בהריון על כן יש להימנע משימוש לבלקווין במהלך הריון.

טרם ידוע אם לבלקווין עברת לחלב אם. הרופא שלך יסייע לך להחליט האם להמשיך בהנקה או להתחיל טיפול לבלקווין. הרופא ישකול את התוצאות שבטיפול עבורה אל מול הסיכון האפשרי בהנקה וחתמת הטיפול עבור תינוק.

**פוריות:**

לא קיים מידע לגבי השפעה של לבלקווין על פוריותם של לבלקווין על פוריותם של לבלקווין.

במחקרים בעבלי חיות לא נצפתה השפעה על הפוריות.

**נהיגה ושימוש במכונות:**

לקווינו השפעה זיהואה או שאינה משפיעה כלל על יכולת הנהוג או להשתמש במכונות.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התוורופה:**

לקווינו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למינה, ככלומר היא למשה 'נטולת נתרן'.

**3. כיצד משתמש בתוורופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא, האחות או הרוקח אם אין בעיה בנוגע למינון ואופון הטיפול בתכשיר.

המינון ואופון הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקבול בדרך כלל של לבלקווין הוא 284 מ"ג הנitinן בהזרקה תת-עורית. המינה הבאה ניתנת לאחר 3 חודשים ולאחר מכן מונת נסיפות הניטנות בכל 6 חודשים.

אין לעבורה על המינה המומלצת.

לפני התחלת הטיפול לבלקווין עליך להזכיר על תזונה להורדתコレsterol וסביר שתיתול סטטין. עליך להישאר בתזונה זו ולומחש ליטול סטטין במשך כל הזמן שבו אתה מקבל לבלקווין.

לקווינו מיועדת להזרקה תת-עורית באזורי הבطن. אטר ההזרקה חלפי כולל את הזրע העליון או הירך.

לקווינו ניתן רק על ידי הרופא או האחות (איש צוות רפואי).

**אם נטול בטשות מינון גובה יותר:**

תוורופה זו תרינן לך על ידי הרופא או האחות (איש צוות רפואי). במקרה המאוד לא סביר בו תרינן לך

יותר מדי תרופה (מנת יתר), הרופא או איש צוות רפואי אחר יבדוק אותך לתופעות לוואי.

**אם שכחת ליטול את מנת לבלקווין:**

אם החמצת את מנת הזרקה פנה לרופא או האחות בהקדם האפשרי לקביעת מועד הזרקה הבאה

שלך.

יש להתמיד טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתוורופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנתק נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם

הנתק זוקם להם.

אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לשימוש בתוורופה, הייעץ ברופא או ברוקח.

**ה מידע הבא מיועד לאנשי הצוות הרפואי בלבד:**  
**The following information is intended for healthcare professionals only:**


**المعلومات التالية معدة للطاقم الطبي فقط:**

הוראות שימוש בקווין מזרק מוקן לשימוש ללא מגן מחט:

Instructions for Use for Leqvio pre-filled syringe without needle guard:

تعليمات استعمال ليكيوين محقنة جاهزة للاستعمال بدون واقي إبرة:

This section contains information on how to inject Leqvio.



#### **Important information you need to know before injecting Leqvio**

- **Do not** use the pre-filled syringe if any of the seals on the outer carton or the seal of the plastic tray are broken.
- **Do not** remove the needle cap until you are ready to inject.
- **Do not** use if the pre-filled syringe has been dropped after removing the needle cap.
- **Do not** try to re-use or take apart the pre-filled syringe.

#### **Step 1. Inspect the pre-filled syringe**


You may see air bubbles in the liquid, which is normal. **Do not** try to remove the air.

- **Do not** use the pre-filled syringe if it looks damaged or if any of the solution for injection has leaked out of the pre-filled syringe.

#### **Step 2. Remove needle cap**


Firmly pull straight to remove the needle cap from the pre-filled syringe. You may see a drop of liquid at the end of the needle. This is normal. **Do not** put the needle cap back on. Throw it away.

Note: **Do not** remove the needle cap until you are ready to inject. Early removal of the needle cap prior to injection can lead to drying of the drug product within the needle, which can result in needle clogging.



#### **Step 3. Insert needle**


Gently pinch the skin at the injection site and hold the pinch throughout the injection. With the other hand insert the needle into the skin at an angle of approximately 45 degrees as shown.



#### **Step 4. Inject**

Continue to pinch the skin. Slowly press the plunger **as far as it will go**. This will make sure that a full dose is injected.

Note: If you cannot depress the plunger following insertion of the needle, use a new pre-filled syringe.



#### **Step 5. Complete injection and dispose of the pre-filled syringe**

Remove the pre-filled syringe from the injection site. Do not put the needle cap back on.

Dispose of the pre-filled syringe in accordance with local requirements.