

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

היסטפד קומפאונד לינקטוס
סירופ

חומרים פעילים

טרופרולידין הידרוכלוריד 1.25 מ"ג	(triprolidine hydrochloride 1.25 mg)
קודאין פוספט 5 מ"ג	(codeine phosphate 5 mg)
פסאודואפדרין הידרוכלוריד 30 מ"ג	(pseudoephedrine hydrochloride 30 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך שמצבם הרפואי דומה.

- תרופות ממשפחת האופיואידים עלולות לגרום להתמכרות בעיקר בשימוש ממושך והן בעלות פוטנציאל לשימוש לרעה ולמינון יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לגרום למוות.
ודא כי אתה מכיר את שם התרופה, המינון שאתה לוקח, תדירות המתן, משך הטיפול, תופעות הלוואי והסיכונים הפוטנציאליים.
מידע נוסף אודות הסיכון לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf
- נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופות אחרות המדכאות מערכת עצבים מרכזית (כולל סמים) או אלקוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוניות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ומוות.

1. למה מיועדת התרופה?

נגד שיעול המלווה בגודש באף ובדרכי הנשימה העליונות.

קבוצה תרפויטית:

טרופרולידין – אנטיהיסטמין מסוג H₁ המסייע להפסיק עיטוש, נזלת ועיניים דומעות
קודאין פוספט – מדכא שיעול אופיואיד, מסייע להשיג הקלה זמנית בשיעול
פסאודואפדרין – אלפא אגוניסט, מפחית גודש כך שמקל גודש באף ובסינוסים

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה או ילדך רגישים (אלרגיים) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- אם יש לך או לילדך לחץ דם גבוה או מחלת לב או מחלה בכלי דם או אם אתה או ילדך סבלתם בעבר משבץ מוחי.
- אם אתה או ילדך נוטלים חוסמי בטא (המשמשים לטיפול בלחץ דם גבוה).
- אם אתה או ילדך נוטלים, או שנטלתם בשבועיים האחרונים, תרופות לדיכאון הידועות כמעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs) או מעכבי מונואמין אוקסידאז הפיכים (RIMAs).
- אם אתה או ילדך נוטלים תרופות אחרות לשיעול וצינון.
- אם יש לך או לילדך מחלת ריאות או קשיי נשימה או נשימה שטחית.
- אם יש לך או לילדך סוכרת.

- אם יש לך או לילדך מחלת כליות חריפה (פתאומית) חמורה או כרונית (ארוכת טווח) חמורה או אי-ספיקת כליות.
- אם יש לך או לילדך פעילות יתר של בלוטת התריס.
- אם יש לך או לילדך גלאוקומה (לחץ מוגבר בעין).
- אם יש לך או לילדך פאוכרומוציטומה (גידול נדיר בבלוטת יותרת הכליה המשפיע על קצב הלב ולחץ הדם).
- בילדים מתחת לגיל 12.
- אם אתה או ילדך סובלים ממחלת כבד.
- אם אתה או ילדך סובלים מפציעת ראש או מכאב ראש תמידי.
- אם יש לך או לילדך התקף אסתמה.
- אם אתה או ילדך סבלתם בעבר מחסימת מעיים.
- אם אתה או ילדך הייתם מכורים בעבר לתרופות המכילות קודאין או מורפין.
- אם ידוע לך שהגוף שלך או של ילדך מפרק מהר מאוד קודאין למורפין.
- אם אתה או ילדך פיתחתם בעבר תגובה רעה לקודאין (אתם מפרקים במהירות את הקודאין למורפין ("ultra-rapid metaboliser" of codeine)).
- אם את בהיריון או מניקה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש בהיסטפד קומפאונד לינקטוס ספר לרופא אם:

- יש לך או לילדך בעיות בכליות או בעיות בכבד.
- אתה או ילדך בסיכון לפתח גלאוקומה (לחץ מוגבר בעין).
- יש לך או לילדך עורקים או ורידים חסומים (מחלת כלי דם חסימתית).
- אתה או ילדך מקבל טיפול להפרעה בבלוטת התריס.
- יש לך או לילדך תת פעילות של בלוטת התריס או בעיות בבלוטת יותרת הכליה. ייתכן שהרופא ימליץ על הורדה במינון.
- יש לך או לילדך קושי במתן שתן או צורך להשתין לעיתים תכופות (לדוגמה, בשל בעיות בערמונית או זיהום/דלקת בשלפוחית השתן או בדרכי השתן).
- יש או היו לך או לילדך תלות או התמכרות לאלכוהול, התמכרות לאופיואידים, לתרופות מרשם או לסמים לא חוקיים.
- אתה או ילדך סבלתם בעבר מתסמיני גמילה כמו סערת נפש (אגיטציה), חרדה, רעד או הזעה כאשר הפסקתם לשתות אלכוהול או ליטול תרופות.
- אתה או ילדך הרגשתם אי פעם צורך ליטול יותר מהתרופה כדי להגיע לאותה רמה של הקלה. זה יכול להעיד על כך שפיתחתם סבילות להשפעות התרופה או שהתמכרתם לה. שוחח עם הרופא שידון איתך בטיפול וייתכן שישנה את המינון או ישנה לתרופה אחרת.
- יש לך או לילדך פרכוסים, אפילפסיה.
- אתה או ילדך סבלתם בעבר מאסתמה או בעיות נשימה אחרות, לרבות דלקת סמפונות (ברונכיטיס).
- יש לך או לילדך לחץ דם נמוך.
- אתה או ילדך סובלים מתסמונת המעי הרגיז או בעיות מעי אחרות.
- אתה או ילדך סובלים מכאבי בטן.
- אתה או ילדך סובלים ממיאסתניה גרביס (מחלת שרירים).
- אתה או ילדך סובלים מאבנים בכיס מרה, בעיות בצינור המרה או שעברתם כריתת כיס המרה.
- אתה או ילדך סובלים מקצב לב לא סדיר.
- אתה או ילדך במצב של הלם (שוק).
- אתה קשיש, מאחר שקשישים יכולים להגיב אחרת לתרופה. נטילת תרופה זו בקביעות, במיוחד לתקופה ארוכה, יכולה להוביל להתמכרות. הרופא יסביר לך למשך כמה זמן ניתן ליטול תרופה זו ומתי נכון להפסיק, וכיצד לעשות זאת בבטחה. לעיתים נדירות, העלאת המנה של תרופה זו יכולה לגרום ליותר רגישות לכאב. אם זה קורה, עליך לדבר עם הרופא לגבי הטיפול. התמכרות יכולה לגרום לתסמיני גמילה כאשר מפסיקים ליטול את התרופה. תסמיני גמילה יכולים לכלול חוסר שקט, בעיות בשינה, עצבנות, סערת נפש (אגיטציה), חרדה, דפיקות לב (פלפיטציות), עלייה בלחץ הדם, בחילות והקאות, שלשול, אובדן תיאבון, רעד או הזעה. הרופא ידון איתך כיצד להקטין בהדרגה את המנה כאשר אתה מפסיק ליטול את התרופה. חשוב שלא תפסיק ליטול את התרופה בבת אחת כיוון שהפסקה פתאומית מעלה את הסיכוי להופעת תסמיני גמילה. השימוש באופיואידים מיועד אך ורק למי שהתרופה נרשמה עבורו. אל תיתן את התרופה לאחרים. נטילת מנות גבוהות של

אופיואידים או בתדירות גבוהה יותר עלולה להגדיל את הסיכון להתמכרות. שימוש יתר או שימוש לרעה יכולים להוביל למנת יתר ו/או למוות.

אם יש לך או לילדך את התגובות הבאות, הפסק לקחת את התכשיר ופנה מייד לרופא:

- אודם כללי בעור (אדמנת) עם מוגליות (פוסטולות) המלווה בחום (ראה פרק 4).
- כאב בטן פתאומי או דימום מפי הטבעת עלולים להתרחש עם היסטפד קומפאונד לינקטוס, כתוצאה מדלקת של המעי הגס (קוליטיס איסכמית). אם התפתחו תסמינים אלה במערכת העיכול, יש להפסיק את השימוש בהיסטפד קומפאונד לינקטוס ולפנות מייד לרופא או לקבלת טיפול רפואי (ראה פרק 4).
- מקרים של תסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה (PRES) ותסמונת התכווצות כלי דם מוחיים הפיכה (RCVS) דווחו לאחר שימוש בתרופות המכילות פסאודופדרין. תסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה ותסמונת התכווצות כלי דם מוחיים הפיכה הן הפרעות נדירות שעלולות להיות כרוכות באספקת דם מופחתת למוח. הפסק מייד את השימוש בהיסטפד קומפאונד לינקטוס ופנה לעזרה רפואית מיידיית אם אתה מפתח תסמינים העלולים להוות סימנים לתסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה או לתסמונת התכווצות כלי דם מוחיים הפיכה. התסמינים הם הופעה פתאומית של כאבי ראש בדרגה חמורה, בחילות, הקאות, בלבול, פרכוסים או הפרעות בראייה.
- הפחתת זרימת הדם לעצב הראייה עלולה להתרחש במהלך שימוש בהיסטפד קומפאונד לינקטוס. אם התפתח אובדן ראייה פתאומי, יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מייד לרופא או לקבלת טיפול רפואי (ראה פרק 4).

בדיקות סמים: תרופה זו מכילה פסאודופדרין הידרוכלוריד, שעלול לגרום לתוצאות חיוביות בבדיקות סמים.

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12. אין להשתמש בתרופה להרגעת ילד (סדציה).

תגובות בין תרופתיות

אם אתה או ילדך לוקחים, או אם לקחתם לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה או ילדך לוקחים:

- תרופות הרגעה (תרופות המשמשות לטיפול בחרדה ומתח).
- תרופות להורדת לחץ הדם (תרופות המשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה, כמו ברטיליום, בטאנידין, גואנתידין, רזרפין, דבריסוקין, מתילדופה, חוסמי נורונים אדרנרגיים) ותרופות משתנות.
- ממריצים או מדכאי תיאבון ותרופות המשמשות לטיפול בגודש ואסתמה (תרופות סימפתומימטיות).
- נוגדי דיכאון טריציקליים (תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות במצב הרוח).
- מוקלובמיד (משמשת לטיפול בהפרעות במצב הרוח).
- גליקוזידים ללב (תרופות המשמשות לשליטה במקצבי הלב או התכווציות הלב, כמו דיגוקסין, קינידין או מקסילטין).
- אלקלואידים של ארגוט (תרופות המשמשות לטיפול במיגרנה, כמו ארגוטאמין ומטיסרגיד).
- אוקסיטוצין (תרופה המשמשת להשראת לידה – זירוז צירים).
- תרופות אנטי-כולינרגיות (משמשות לטיפול בהתכווציות או עוויתות, כמו אטרופין).
- תרופות מרדימות (היפנוטיות) (גלולות שינה, כולל ברביטורטים, אנטי-היסטמינים מרגיעים).
- משככי כאבים, לרבות משככי כאבים אופיואידיים (תרופות המשמשות להקלת כאב, לדוגמה, קודאין, טרמדול, מורפיום).
- תרופות אנטי-פסיכוטיות (משמשות לטיפול בהפרעות במצב הרוח).
- כל תרופה למחלת נפש.
- הורמוני בלוטת התריס.
- חומרי הרדמה כמו כלורופורם, ציקלופורפן, הלותרן, אנפלורן או איזופלורן.
- סלג'ילין (תרופה המשמשת לטיפול בפרקינסון), לינזוליד (אנטיביוטיקה) או אם אתה או ילדך נטלתם אותם במשך השבועיים האחרונים.
- מטוקלופרמיד או דומפרידון (לבחילות והקאות).
- סימטידין (לטיפול בכיב קיבה).
- סודיום אוקסיבט (להפרעות שינה).
- ריפאמפיצין (לשחפת).

- נטילת תרופה זו עם תרופות מרגיעות כגון בנזודיאזפינים או תרופות דומות, עלולה להגביר את הסיכון לישנוניות, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ואף מוות. לפיכך, יש לשקול שימוש בו-זמנית רק כאשר אפשרויות טיפול אחרות אינן אפשריות.
- עם זאת, אם הרופא ירשום תרופה זו יחד עם תרופות מרגיעות, המינון ומשך הטיפול של טיפול משולב צריכים להיות מוגבלים על ידי הרופא. עדכן את הרופא לגבי כל התרופות המרגיעות שאתה או ילדך נוטלים והקפד מאוד לפעול על פי המלצות הרופא. כדאי גם לעדכן חברים או קרובי משפחה לגבי הסימנים והתסמינים שמפורטים לעיל, כדי שיהיו ערניים לכך. צור קשר עם הרופא אם אתה חווה תסמינים כאלו.
- אם אינך בטוח לגבי התרופה שאתה או ילדך נוטלים, הראה את הבקבוק או האריזה לרוקח. אם אחת מנקודות אלו רלוונטיות אליך או אל ילדך עכשיו או בעבר, פנה לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן לקחת היסטפד קומפאונד לינקטוס עם או אחרי ארוחה.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להימנע מצריכת משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול בתרופה.

היריון והנקה

היריון

אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות, עלייך להיוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

אין ליטול תרופה זו אם את בהיריון או חושבת שאת בהיריון, אלא אם הרופא דן איתך בתועלת/סיכון אפשריים לתינוק. אם את נוטלת תרופה זו במהלך היריון, התינוק עלול לפתח תלות ולחווה תסמיני גמילה לאחר הלידה, דבר שיצריך טיפול.

הנקה

אין ליטול תרופה זו במהלך הנקה כיוון שקודאין, אחד החומרים הפעילים בתרופה, עובר לחלב אם ומשפיע על התינוק.

נהיגה ושימוש במכוונות

תרופה זו עלולה לגרום לסחרחורת, ישנוניות, הפחתת ערנות וירידה בשמיעה; אם אתה חווה תופעות אלה אין לנהוג או להפעיל מכוונות.

נדרשת זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכוונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

היסטפד קומפאונד לינקטוס מכיל סוכרוז, מתיל הידרוקסיבנזואט סודיום, פרופיל הידרוקסיבנזואט סודיום.

סוכרוז - אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך או לילדך אי סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא לפני נטילת תרופה זו. כמו כן סירופ זה יכול להזיק לשיניים בשימוש במשך שבועיים או יותר.

מתיל פאראהידרוקסיבנזואט סודיום (E219) ופרופיל פאראהידרוקסיבנזואט סודיום עלולים לגרום לתגובות אלרגיות; תופעה זו יכולה להיות מאוחרת.

נתרן – תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן במנה, לפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בהיעדר הוראה אחרת מרופא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 10 מ"ל 3 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול: אם לא חל שיפור במצב תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12.

שים לב:

למידת הכמות הנכונה של התרופה יש להשתמש בכוסית המדידה המצורפת לאריזה. אין להשתמש בכפית ביתית לצורך מדידת כמות התרופה. הכפיות הביתיות שונות בגודלן וייתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה. לאחר השימוש יש לשטוף את כלי המדידה.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש קח/תן את המנה הבאה במועד הדרוש כל עוד המנה האחרונה נלקחה לפני 4 שעות לפחות. אין ליטול מנה כפולה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק ליטול את התרופה

אין להפסיק ליטול את התרופה בבת אחת. אם אתה רוצה להפסיק ליטול את התרופה, דבר קודם עם הרופא. הוא ינחה אותך כיצד לעשות זאת, בדרך כלל על ידי הקטנת המנה בהדרגה כך שכל השפעה הקשורה לגמילה תהיה מינימלית. תסמיני גמילה כמו חוסר מנוחה, קשיי שינה, עצבנות, סערת נפש (אגיטיציה), חרדה, דפיקות לב (פלפיטציות), עלייה בלחץ הדם, בחילות והקאות, שלשול, רעד או הזעה עלולים להופיע אם אתה או ילדך מפסיקים בפתאומיות את השימוש בתרופה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהיסטפד קומפאונד לינקטוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

אם יופיעו התופעות הבאות, יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מייד לעזרה רפואית:

- התפרצות פתאומית של חום, האדמה של העור או מספר רב של מוגליות (פוסטולות) קטנות (תסמינים אפשריים של פוסטולוזיס תפרחתית ממושטת חדה (AGEP)) עלולות להתרחש ביומיים הראשונים לטיפול בתרופה זו (ראה פרק 2).
- הופעה פתאומית של כאבי בטן, דם בצואה או דימום מפי הטבעת ושלשול.
- תסמינים העלולים להוות סימנים של תסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה ותסמונת התכווצות כלי דם מוחיים הפיכה. אלה כוללים הופעה פתאומית של כאב ראש חמור, בחילות, הקאות, בלבול, פרכוסים, הפרעות בראייה.
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון, הצוואר או הגרון, העלולה לגרום לקשיי בליעה או נשימה (תגובה אלרגית חמורה).
- עייפות חריגה, חבורות (שטפי דם) או דימום לא צפויים ונטייה לזיהומים (כמו התקררות) גבוהה מהרגיל.
- תגובה אלרגית, כולל פריחות עוריות כמו סרפדת (שעלולה להיות חמורה ולכלול שלפוחיות או התקלפות של העור) וגרד.
- הזיות, מחשבות שווא (דלוזיות) פרנאידיות או פרכוסים.
- קודאין הופך בכבד למורפין על ידי אנזים. מורפין הוא חומר שמביא להקלת כאב. לאנשים מסוימים יש גרסה שונה של אנזים זה וזה יכול להשפיע על אנשים בדרכים שונות. בחלק מהאנשים, מורפין אינו מיוצר או מיוצר בכמויות מאוד קטנות, והם לא יחוו מספיק הקלת כאב. אנשים אחרים הם בעלי סיכוי גבוה יותר לפתח תופעות לוואי חמורות מאחר שכמות מאוד גדולה של מורפין נוצרת בגופם. אם אתה או ילדך חווים אחת מתופעות הלוואי הבאות עליכם להפסיק ליטול את התרופה ולפנות מייד לעזרה רפואית: נשימה איטית או שטחית, בלבול, ישנוניות, אישונים קטנים, בחילות והקאות, עצירות, חוסר תיאבון.

אם יופיעו התופעות הבאות, יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא:

- חוסר מנוחה או בעיות שינה, הזיות.
- קצב לב מהיר, איטי או בלתי סדיר או מודעות מוגברת לדפיקות הלב (פלפיטציות).
- קושי במתן שתן (במיוחד גברים עם בעיות בערמונית).
- זרימת דם מופחתת לעצב הראייה (נוירופתיה אופטית איסכמית).

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד – תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה

- כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות – תופעות שמופיעות אצל עד משתמש אחד מעשרה

- קשיי שינה, עצבנות, סחרחורת או חוסר שקט
- ישנוניות
- טשטוש בראייה
- ריר מעובה, פה יבש, בחילה או תחושות לא נעימות בקיבה.

תופעות לוואי נדירות – תופעות שמופיעות אצל עד משתמש אחד מתוך 1,000

- בלבול או דיכאון
- רעידות, תחושת חוסר יציבות או דיבור לא ברור
- לחץ דם נמוך.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)

- שבץ מוחי
- התקף לב/זרימת דם מופחתת אל הלב שיכולה לגרום אי-נוחות או כאב בחזה, בצוואר, בגב, בלסת, בכתפיים או בזרועות (ידוע כתעוקת חזה)
- סערת נפש, חרדה, עצבנות או תחושת אושר קיצוני
- עקצוץ או נימול של כפות הידיים או כפות הרגליים (דקרוז)
- לחץ דם גבוה
- דלקת של המעי הגס עקב אספקת דם בלתי מספקת (קוליטיס איסכמית)
- דימום מהאף, יובש באף או יובש בגרון
- הקאה או אי-נוחות בבטן
- כאב/קושי בעת מתן שתן
- תחושת עייפות
- חום גבוה מאוד
- הפרעות חמורות המשפיעות על כלי הדם במוח הידועות כתסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה ותסמונת התכווצות כלי דם מוחיים הפיכה.
- תלות והתמכרות (ראה בהמשך סעיף "כיצד תדע אם אתה או ילדך מכורים לתרופה?")
- בחילות
- נמנום
- ורטיגו
- עצירות
- אובדן תיאבון
- פרכוסים, אפילפסיה
- הרגשה לא טובה
- עווית שרירים או קשיון שרירים
- הזעה
- הסמקה בפנים
- אגירת נוזלים (כגון קרסוליים נפוחים, כפות רגליים נפוחות)
- תחושת עילפון במעבר לעמידה
- נשימה איטית או שטחית
- חום גוף נמוך
- הזיות
- שינויים במצב הרוח
- התכווצות אישונים או בעיות אחרות בראייה
- כאב בטן (כולל כאב שנגרם על ידי דלקת הבלב (פנקראטיטיס) או בעיות בצינור המרה (עווית))
- עווית בדרכי השתן (בעיה בצינורית השתן שגורמת לכאבי בטן או כאבים בגב תחתון)
- ירידה בחשק המיני
- קשישים עלולים לסבול מאי-שליטה בשתן, שלשול, כאבי בטן או חסימת מעיים
- שימוש ממושך עלול לגרום להחמרה של תסמונת המעי הרגיז
- שימוש ממושך עלול להוביל להתמכרות, תלות וסבילות (התרופה מאבדת את השפעתה).

תסמיני גמילה

כאשר אתה או ילדך מפסיקים את השימוש בהיסטפד קומפאונד לינקטוס אתם עלולים לחוות תסמיני גמילה, אשר כוללים חוסר מנוחה, קשיי שינה, עצבנות, סערת נפש (אגיטציה), חרדה, דפיקות לב (פלפיטציות), עלייה בלחץ הדם, בחילות והקאות, שלשול, רעד או הזעה. אם אתה מבחין באחת או יותר מתופעות לוואי אלו, הפסק את השימוש בתרופה ופנה לרופא או לרוקח. הם ינחו אותך מה לעשות.

כיצד תדע אם אתה או ילדך מכורים לתרופה?

אם אתה מבחין באחד הסימנים הבאים בעת נטילת התרופה, זה יכול להיות סימן להתמכרות:

- אתה או ילדך צריכים ליטול את התרופה לתקופה ארוכה יותר מזו שהומלצה על ידי הרופא.
- אתה או ילדך מרגישים שאתם צריכים יותר מהמנה המומלצת.
- אתה או ילדך משתמשים בתרופה מסיבות השונות מאלו שבגינן נרשמה.
- כאשר אתה או ילדך מפסיקים להשתמש בתרופה אתם מרגישים לא טוב, והרגשתכם משתפרת ברגע שאתם נוטלים שוב את התרופה.

אם אתה מבחין באחד מהסימנים הללו, חשוב שתיצור קשר עם הרופא.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה או ילדך סובלים מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>. ניתן גם לדווח על תופעות לוואי לדוא"ל safety@trima.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/בקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן במקום קריר וחשוך, מתחת ל-25°C.
- לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק, ניתן להשתמש בסירופ עד 6 חודשים.

אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתית. יש להתייעץ עם הרוקח כיצד יש להיפטר מתרופה שאינך זקוק לה יותר. זה יסייע לשמירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיבים הפעילים התכשיר מכיל גם את החומרים הבלתי פעילים הבאים: Sucrose, glycerol, strawberry flavor, saccharine sodium, methyl hydroxybenzoate sodium, citric acid, propyl hydroxybenzoate sodium and purified water.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

האריזה מכילה בקבוק זכוכית סגור בפקק קשה-פתיחה לילדים ובו 115 מ"ל נוזל חסר צבע עד צהוב בהיר, וכוסית מדידה.

- בעל הרישום, היצרן וכתובתו: תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, מעברות 4023000.

- נערך ביוני 2024.

- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 027-93-21823-00

- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.