

الرجاء قراءة تعليمات الإستعمال الكاملة قبل إستعمال سبيري بريزهالر.



تأكد من فراغ الكبسولة

أفحص



إستنشق بعمق

3




إثقب وحرر

2



أدخل

1



تأكد من أن الكبسولة فارغة
أفتح المنشقة لرؤيتها فيما إذا تبقى مسحوق
بداخل الكبسولة.

إذا تبقى مسحوق بداخل الكبسولة:

- أغلق المنشقة

- عاود المراحل 3 حتى 3 ج.

تبقى مسحوق

فارغة



أخرج الكبسولة الفارغة
قم برمي الكبسولة الفارغة في القمامنة
المنزلي.

أغلق المنشقة وأعد الغطاء إلى مكانه.

معلومات هامة

- يجب دائمًا تخزين كبسولات سبيري بريزهالر
بداخل اللوحة وإخراجها فقط قبل الإستعمال
مباشرة.

- لا يجوز دفع الكبسولة عبر الغلاف لإخراج
الكبسولة.

- لا يجوز بلع الكبسولة.

- لا تستعمل كبسولات سبيري بريزهالر مع
منشقة أخرى.

- لا تستعمل منشقة سبيري بريزهالر لإستعمال
كبسولات أخرى.

- لا يجوز أبداً وضع الكبسولة بفمك أو داخل
فوهة المنشقة.

- لا يجوز الضغط على الزررين الجانبيين أكثر
من مرة واحدة.

- لا يجوز الزفير لداخل فوهة المنشقة.

- لا يجوز الضغط على الزررين الجانبيين أثناء
الإستنشاق بمساعدة الفوهة.

- لا تستعمل الكبسولات والبدين رطبين.

- لا يجوز أبداً شطف المنشقة بالماء.




المرحلة 3 أ:
قم بثقب الكبسولة مرة واحدة
امسك المنشقة بوضع عمودي.
قم بثقب الكبسولة بواسطة الضغط على
الزررين الجانبيين بنفس الوقت بشدة. من
الافتراض أن تسمع ضجيج عندما تثقب
الكبسولة.

المرحلة 2 أ:
قم بثقب الكبسولة مرة واحدة
امسك المنشقة بوضع عمودي.
قم بثقب الكبسولة بواسطة الضغط على
الزررين الجانبيين بنفس الوقت بشدة. من
الافتراض أن تسمع ضجيج عندما تثقب
الكبسولة.

المرحلة 2 ب:
حرر الزررين الجانبيين



المرحلة 1 ب:
أفتح المنشقة



المرحلة 1 ج:
أخرج الكبسولة
إفصل جزء من اللوحة الحاوي على
كبسولة واحدة عن كامل اللوحة.
إقرئ الغلاف عن شريط اللوحة لإخراج
الكبسولة.

لا يجوز دفع الكبسولة خارجاً عبر الغلاف.
لا يجوز بلع الكبسولة.



المرحلة 3 ج:
التوقف عن التنفس
إحبس نفسك لمدة 5 ثوان.



المرحلة 1 د:
أدخل الكبسولة
لا يجوز أبداً إدخال الكبسولة مباشرة لداخل
الفوهة.

المرحلة 1 ه:
أغلق المنشقة



متظيف المنشقة

يجب مسح الفوهة من الداخل والخارج بقمash
نظيف وجاف خال من الرغب، وذلك لإزالة بقايا
المسحوق.

يجب حفظ المنشقة بشكل جاف.

لا يجوز أبداً شطف المنشقة بالماء.

رمي المنشقة بعد الإستعمال

يجب رمي المنشقة بعد 30 يوماً من الإستعمال.

إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية
والمناشق التي لم يعد بها حاجة.



لماذا لم تسمع المنشقة صوت في أثناء
إستنشاق الدواء؟

من الجائز أن تكون الكبسولة عالقة في حجرة
الكبسولة. فإذا حصل هذا الأمر، حرر الكبسولة
بحذر بواسطة الطرق على قاعدة المنشقة. يجب
معاودة إستنشاق الدواء وذلك بمعاودة المراحل
3 حتى 3 ج.



كيف أتصرف إذا تبقى مسحوق بداخل
الكبسولة؟

لم تحصل على ما يكفي من الدواء. أغلق المنشقة

- وعاود المراحل 3 حتى 3 ج.



راودني السعال بعد إستنشاق الدواء. هل هذا
الأمر مهم؟

من الجائز أن يحصل هذا الأمر. لقد تأثيرت ما يكفي

من الدواء لطالما كانت الكبسولة فارغة.

لقد شعرت بقطع صغيرة من الكبسولة على
لساني. هل هذا الأمر مهم؟

من الجائز أن يحصل هذا الأمر. وهو غير ضار. إن

إحتمال إنكسار الكبسولة لقطع صغيرة يزداد إذا


قمت بثقب الكبسولة أكثر من مرة واحدة.



علبة واحدة من سبيري بريزهالر تحتوي على:

• منشقة واحدة من سبيري بريزهالر

• 30 كبسولة من سبيري بريزهالر للإستعمال داخل المنشقة



سييري بريزهالر 50 مكغ**كبسولات قاسية لمسحوق للإستنشاق**

تحتوي كل كبسولة على:

چليکوبيرونيوم برومادي 63 مكغ ما يعادل بقيمتها لـ 50 مكغ چليکوبيرونيوم.

Glycopyrronium bromide 63 mcg, equivalent to glycopyrronium 50 mcg.

المقدار الدوائي المعايير بكل نشقة يعادل بقيمتها لـ 44 مكغ چليکوبيرونيوم.

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على

معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرض. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك

أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يُستخدم سييري بريزهالر كعلاج داعم لدى الكبار، للتخفيف من أعراض مرض الرئتين المسمى مرض رئوي إنسدادي مزمن (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) [COPD].

الفصيلة العلاجية: يتبعي سييري بريزهالر لمجموعة الأدوية المسماة موسعات القصبات الهوائية (أدوية من فصيلة مضادات الفعل الكوليزي).

تقلص العضلات بمرض COPD من حول الطرق التنفسية، وبذلك يصعب التنفس. سييري بريزهالر يمنع تقلص تلك العضلات في الرئتين، وبذلك يسهل من دخول وخروج الهواء من وإلى الرئتين. إذا توفرت لديك أسئلة حول طريقة عمل سييري بريزهالر أو لماذا وصف لك هذا الدواء، راجع الطبيب أو الصيدلي.

إن إستعمال سييري بريزهالر مرة في اليوم يساعدك على تقليل تأثيرات COPD على مسيرة حياتك اليومية.

2) قبل إستعمال الدواء

يجب التقيد بتعليمات الطبيب بحرص.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت حساساً (أيرجي) لـ چليکوبيرونيوم (المادة الفعالة)، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، المفصلة في الفقرة 6.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ سييري بريزهالر، بلغ الطبيب إذا كان أحد الأمور التالية يخصك: • لديك مشاكل في الكلى.

• لديك مشكلة في العين تسمى چلوکوما ضيقية الزاوية.

• لديك صعوبة في التنفس.

خلال فترة العلاج بـ سييري بريزهالر، توقف عن إستعمال هذا الدواء وبلغ الطبيب حالاً إذا وجد لديك واحد أو أكثر من الأمور التالية:

• ضيق في الصدر، سعال، صفير أثناء التنفس أو ضيق في التنفس حالاً بعد إستعمال سييري بريزهالر؛ من شأن هذه أن تكون علامات لحالة تسمى تشنج القصبات [bronchospasm].

• صعوبات في التنفس أو في البلع، إنتفاخ اللسان، الشفتين أو الوجه، طفح، حكة وشري (urticaria)؛ من شأن هذه أن تكون علامات لرد فعل تحسيسي.

• ألم أو إنزعاج في العين، تشووش رؤية مؤقت، إذا كنت ترى أشكالاً مضيئة (halos) أو ملونة مع إحمرار العينين؛ من شأن هذه أن تكون علامات لنوبة شديدة من چلوکوما ضيقية الزاوية.

سييري بريزهالر يستعمل كعلاج داعم في مرض COPD. لا يجوز إستعمال سييري بريزهالر لمعالجة نوبة مفاجئة من ضيق التنفس أو الصفير أثناء التنفس.

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل أدوية تشبه سييري بريزهالر التي تستعمل لعلاج مرض الرئتين لديك. لا يوصي بإستعمال الدواء سييري بريزهالر سوية مع أدوية من فصيلة مضادات الفعل الكوليزي (مثل إپراتروپيوم، أوکستيروپيوم أو تيتروديپيوم).

لم يُبلغ عن أعراض جانبية معينة عند إستعمال سييري بريزهالر مع أدوية أخرى لعلاج COPD مثل المناشف الحاوية على أدوية للتحفيز / للإنقاذ مثل سالبوتامول، متيل كسانتينين مثل تيوفيلين و/أو ستيرونيدات التي تُعطى عن طريق الفم وبالاستنشاق مثل پريدينيزولون.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إستعمال سييري بريزهالر لدى متعالجين ما دون عمر 18 سنة.

إستعمال الدواء والطعام

بإمكان إستنشاق سييري بريزهالر في أي وقت قبل أو بعد إستهلاك طعام أو شراب.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو تعتقدين بأنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل أو إذا كنت مرضعة، إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال هذا الدواء.

لا تتوفر معلومات حول إستعمال هذا الدواء لدى النساء الحوامل ولا يُعرف فيما إذا كانت المادة الفعالة لهذا الدواء تنتقل عبر حليب الأم.

السيارة وإستعمال الماكينات

عادة لا يؤثر هذا الدواء أو ذو تأثير ضئيل على قدرتك على السيارة وتشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على اللكتوز. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إتصل بالطبيب قبل إستعمال الدواء (انظر أيضاً الفقرة 6 - «معلومات إضافية»).

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال دائمًا بحسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة إستنشاق محتوى كبسولة واحدة بكل يوم. يحتاج الأمر إستنشاق الدواء فقط مرتين في اليوم لمساعدتك على التنفس بسهولة أكبر وذلك لأن سييري بريزهالر يؤثر لـ 24 ساعة.

لا يجوز إستعمال أكثر مما أوصلك الطبيب إستعماله.

إن إستعمال سييري بريزهالر بنفس الوقت كل يوم يساعدك على تذكر إستعماله.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

المتعلجون بأعمار 75 سنة وما فوق يمكنهم إستعمال نفس المقدار الدوائي من سييري بريزهالر كما الكبار الآخرين.

تحتوي علبة الدواء على كبسولات ضمن أشرطة من لويحات تحتوي على الدواء بشكل مسحوق للإستنشاق وعلى منشقة.

يجب إستعمال المنشقة المرفقة بالعلبة فقط (منشقة سييري بريزهالر). يجب تخزين الكبسولات دائمًا داخل شريط اللوحة وإخراجها فقط قبل الإستعمال.

لا يجوز دفع الكبسولة عبر غلاف الألمنيوم.

عند البدء بعلبة جديدة، يجب إستعمال منشقة سييري بريزهالر الجديدة المزودة بعلبة الجديدة.

يجب رمي المنشقة بعد 30 يومًا من الإستعمال.

لا يجوز بلع الكبسولات، من نوع فتح وبعثرة محتوى الكبسولة. المسحوق بداخل الكبسولات مخصص للإستئصال بواسطة المنشقة فقط.

يجب الحرص على قراءة التعليمات حول طريقة إستعمال منشقة الـ سيري بريزهالر، المذكورة في نهاية هذه النشرة.

إذا نسيت إستعمال بالخطأ مقدارًا دوائياً أكبر:

إذا إستنشقت مقدارًا دوائياً مفرطاً أو إذا إستعمل طفل أو شخص آخر الكبسولات الخاصة بك بالخطأ، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى. أحضر معك علبة الدواء. من الجائز أن يحتاج الأمر علاجاً طبياً.

إذا نسيت إستعمال الدواء:

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز إستعمال مقدارًا دوائياً مضاعفاً.

يستعمل المقدار الدوائي التالي في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب الموازنة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب.

إن COPD هو مرض مزمن ويتوارد عليه إستعمال سيري بريزهالر بكل يوم وليس فقط عند وجود مشاكل في التنفس أو أعراض أخرى لـ COPD لديك.

في حال توقفك عن إستعمال الدواء:

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سيري بريزهالر قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهرت لديك إحدى الأعراض التالية:

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من كل 100 شخص): طفح، حكة، شرى (urticaria)، صعوبة في التنفس أو البلع، دوار (علامات متحمّلة لرد فعل تحسسي).

• إنتفاخ خاصة في اللسان، الشفتين، الوجه أو الحنجرة (علامات متحمّلة لوعائية).

أعراض جانبية ذات شيع غير معروفة (ليس بالإمكان تقدير شيعها من المعلومات المتوفرة): صعوبة في التنفس مع أصوات تنفسية تشبه صفير أو سعال (علامات لتشنج قضبات تنفسية).

• صعوبة في التنفس مع أصوات تنفسية تشبه صفير أو سعال (علامات لتشنج قضبات تنفسية).

يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهرت لديك إحدى الأعراض التالية: أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من كل 100 شخص):

أعراض جانبية غير منتظم (علامة ممكنة لرجفان أذيني)، ارتفاع نسبة السكر بالدم (حالة فرط سكر الدم)، أعراض نموذجية تشمل زيادة العطش أو الجوع وتكرار التبول).

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من كل 10 أشخاص): جفاف في الفم، إسهاf أو ألم في البطن (أعراض ممكنة لإلتهاب في جهاز الهضم)؛ تسوس الأسنان؛

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من كل 100 شخص): نظم قلب غير منتظم (علامة ممكنة لرجفان أذيني)، ارتفاع نسبة السكر بالدم (حالة

فرط سكر الدم)، أعراض نموذجية تشمل زيادة العطش أو الجوع وتكرار التبول).

لقد قاسي بعض المرضى المستعين الذين تجاوزوا عمر 75 سنة بشكل شائع أيضًا من صداع ومن إلتهاب في المسالك البولية.

إذا أثرت عليك إحدى تلك الأعراض الجانبية بشكل شديد، راجع الطبيب.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليل عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية.

يجب التخزين في اللوحة الأصلية لحمايته من الرطوبة.

لا يجوز إخراج الكبسولات من اللوحة إلا حالاً قبل الإستعمال.

يجب رمي المنشقة بعد 30 يومًا من الإستعمال.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كانت العلبة معطوبة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا:

Lactose monohydrate, magnesium stearate.

مكونات غلاف الكبسولة:

Hypromellose, purified water, carrageenan, potassium chloride, FDC Yellow 6/110 Sunset Yellow FCF (CI 15985, E 110), printing ink – black.

مكونات الحبر المطبوع على الكبسولة:

Shellac (E 904), Ethyl alcohol, anhydrous, Isopropyl alcohol, Propylene glycol, N-butyl alcohol, Ammonium hydroxide, Potassium hydroxide, Water, purified, Iron oxide, black (CI 77499, E 172).

يحتوي المستحضر على اللكتوز. تحتوي كل كبسولة على 23.6 ملجم لكتوز (على شكل مونو هيدرات).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

منشقة واحدة + 30 كبسولة.

الكبسولات هي ذات لون برتقالي شفاف وتحتوي على مسحوق أبيض. على جسم الكبسولة مطبوع بالأسود رمز المنتج "GPL50" في القسم العلوي وشعار الشركة، لا، من تحت الخط، باللون الأسود.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل מ.ض، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم إعدادها في شباط 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 149 33751 18 149.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم

من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

SEE APRIL 2022 V2