

עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תקנירם התשמ"ו - 1986)
התרופה משווקת על ידי מרשם רפואי בלבד

דאלאצין[™] פטילות ואגינליות

כל פתילה מכילה:

קלינידאמיצין (כפומפאט) 100 מ"ג (as phosphate) 100 mg

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים, ראי סעיף 6 "מידע נוספים".

קראי בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנו אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורי. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה אנטיביוטית לטיפול של שלושה ימים בזיהומיים בקטריאליים בнерטיק, הנגרמים על ידי חיידקים הרגשיים לקלינידאמיצין.

קבוצה טיפולית: אנטיביוטיקה ממפעחת הלינקווזאמידים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגישה לחומר הפעיל קלינידאמיצין, לאנטיביוטיקה אחרת המכילה אותו החומר לינוקומצין או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראי פרק 6).
- היותה לך בעבר דלקת של המעי (קוליטיס) בעקבות נתילת אנטיביוטיקה.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בDALACIN פטילות ואגינליות, ספרי לרופא אם:

- את משלשת או שבדרך כלל את משלשת בזמן נתילת אנטיביוטיקה.
- יש לך היסטוריה של מחלת מעיים דלקתית כגון מחלת קrhohn (Crohn's Disease) או דלקת כיבית של המעי הגס (Ulcerative Colitis).

פני לרופא מיד אם במלר או אחרי הטיפול בDALACIN פטילות ואגינליות מתפתחת אצלך שלשול חמור, ממושך או דמי מאחר שייתכן שתידרש הפסקת טיפול. יתרון זהה סימן לדלקת במעי (pseudomembranous colitis) אשר יכולה להתרחש בעקבות טיפול באנטיביוטיקה.

התיעצי עם הרופא אם יכולת להשתמש בתרופה זו אם:

- הינך סובלת מעבויות בכליות, בכבד או במערכת החיסונית.
- הינך מתחת לגיל 18 או מעל גיל 65.

اذירות נוספת בנוגע לשימוש בתרופה:

כמו בכל הזיהומיים הנרטיקיים,קיים יחס מיין בזמן השימוש בDALACIN פטילות ואגינליות אליו מומלץ. DALACIN פטילות ואגינליות עלולה להפחית את יעלותם של קונדומים או דייפורגמות. אין להסתמך על קונדומים ודייפורגמות למניעת הריון בתקופת הטיפול בתרופה ובמשך 72 שעות שלאחר השימוש. השימוש בתכשירים ואגינליים אחרים בזמן השימוש בתרופה כגון טמפונים או שטיפות ואגינליות אינו מומלץ.

ילדים ומתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים ומתבגרים.

תגובהות בין תרופתיות
אם את לוקחת או אם לך תרופה אחרת כולל טיפול ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על קר לרופא או לרוקח. במיוחד אם את לוקחת:

- תרופות להרפיה שרירים, לאחר שDALACIN פטילות ואגינליות עלולה להגבר את הפעולות של תרופות מסווג זה.

הירין, הנקה ופוריות

אם את בהירין או מניקה, חשבת שייתכן שאתה בהירין או מתכונת להיכנס להירין, היוזעци ברופא או ברוקח לפני נתילת תרופה זו.

השימוש בDALACIN פטילות ואגינליות במהלך שלושת החודשים הראשונים של ההריון אינם מומלץ היה שאין מידע מספק על בטיחות התרופה. אם הירך בהריון ניתן להשתמש בDALACIN פטילות ואגינליות רק לאחר התיעצות עם הרופא אשר יחליט אם הטיפול בתכשיר מתאים לך.

אם הירך מניקה, הרופא יחליט אם DALACIN פטילות ואגינליות מתאימה לך, לאחר שהחומר הפעיל עלול לעברך להחלב האם.

למרות שלא סביר שתינוק יונק יצורו הרבה הרבה מהמרכיב הפעיל מתוך חלב האם אותו הוא יונק, אם התינוק שלך סובל משלשל דמי או מראה סימני מחלת כלשהם, ספרי על כך לרופא מיד. עליך להפסיק להניך במקרה זה.

הניגזה ושימוש במכוונות לא סביר כי תרופה זה תשפייע על יכולת הניגזה שלך ויכולת הפעלת מכונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

שימי לב - אין לבלווע!

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוחה בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון המומלץ של התרופה הינו פטילה אחת המוחדרת עמוק לנתיק, בערך לפני השינה, במשר 3 ערבים רצופים. לאחר החדרה הפטילה תיםם ותיעלם.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אין להשתמש בתכשיר אם עטיפת האלומיניום המכילה את הפטילה קרוועה, פתוחה או שאינה אטומה לחלווטין. יש לשמור שלא ללחם את הפטילה מאחר שהחימום עלול לרך ולעוזת את צורתה.

אופן השימוש:

- הוציאי את הפטילה מעטיפת האלומיניום.
- שכבי על גבר תוך כדי כיפוף הברכיים לכיוון החזה.
- החדרי את הפטילה לתוך הנרתיק בעזרת קצה האצבע השלישית (אמצעית), עמוק ככל שניתן, מבלילו.
- לגרום לתחשות אי נוחות.

תמיד שטפי את ידייך לאחר השימוש בפטילותות.

אם השתמשת בעותם במינון גבוה יותר ספרי על כך לרופא. אל תשתמשי בפטילותות נוספות עד שהרופא ינחה אותך.

אם בעותם בעלILD מן התרופה, פני מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והביאי את אריזת התרופה איתך.

אם בלעת DALACIN פטילות ואגינליות

אם הפטילה נבלעה או נאכלת צרי קשר עם הרופא. לא סביר שהפטילותות תגרמנה לנזק כלשהו, אולם הרופא יכול לסייע לך מה לעשות.

אם שכחת לחשוף בתרופה, ועבורי מספר שעות בלבד מהפטילה שנשכחה, השימוש בפטילה מיד כשנזכרת.

אם כבר הגיע הזמן לפטילה הבאה, דלאג'י על זו שנשכחה. אין להשתמש במנה כפולה. קח'י את הפטילה הבאה בזמן הרגיל והיועצ'י ברופא.

המשך להשתמש בפטילותות בזמןים הקבועים.

אין ליטול תרופות בחושך! בדק'י התווית והמנה בכל פעם שהירך נוטلت תרופה. הרכיבי משקפיים אם הירך זקוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועצ'י ברופא או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה השימוש בDALACIN פטילות ואגינליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשות. אל תיבחלי למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבלי מכך אחד מהן.

ספרי לרופא מיד אם הירך:

- מפתחת שלשול חמור, מתמשך או דמי (אשר עלול להיות מלאה בכאבי בטן או חום). זהה תופעת לוואי לא שכיחה אשר עלולה להתறחש לאחר טיפול באנטיביוטיקות וככליה להיות סימן לדלקת חמורה בעעי או לדלקת של דופן המעי הגס (pseudomembranous colitis).

- חוווה תגובה אלרגית חמורה או תגובות עוריות. אלו תופעות לוואי מאוד נדירות.

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שימושicas ב-10-1 משמשות מתחזק 100:

- זיהומיים פטריאיטיים, זיהום על ידי פטריאית שמר
- כאב ראש
- כאב בטן, שלשול, בחילה
- גרד (לא באזורי החדרה)
- פטרת נרתיקית, אי נוחות בנרתיק, הפרעה בנרתיק

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) תופעות שימושicas ב-10-1 משמשות מתחזק 1000:

- הקאה
- פריחה
- כאבים בבטן עליונה או כאבגב
- חום או צמרמוורות, תחושת חול'
- כאב במתן שתן, דם בשתן, שתן עכו או שמרי רע, עליה בתכיפות או בדחיפות מתן שתן
- זיהום בנרתיק, הפרשות מהנרתיק, וסת לא סדירה
- כאב (באזור החדרה), גרד, נפיחות מקומית

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר את סובלת מטופעת לוואי **שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אוצר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרמי להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזקה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחזרן של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוספת

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Hard Fat Ph Eur. (Witepsol H-32)

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה:
dalacyn פטיולות וגינליות הן פטיולות מוצקות, חלקות, בצבוע לבן שמנת.
כל ארזה מכילה 3 פטיולות ארוזות בעטיפת אלומיניום.

בעל הרישום וכותבתו: פיבר פ. א. פ. א' פרמצבטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

dalacyn פטיולות וגינליות: 122-32-30218

ערוך ב- 07/2024