

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ז - 1986
התרופה משוקחת על פי מרשם רופא בלבד

ולטסה 8.4 גרם אבקה לייצור תרחיף לבליעה.
ולטסה 16.8 גרם אבקה לייצור תרחיף לבליעה.

כל שקיית מכילה 8.4 גרם של פטירומר (סorbitex calcium סידן). Patiromer (as sorbitex calcium) (סorbitex calcium סידן) כל שקיית מכילה 16.8 גרם של פטירומר (סorbitex calcium) (סorbitex calcium סידן).

לרשימה של חומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה סעיף 6.

קראו בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ולטסה משמשת לטיפול במבוגרים עם רמות גבוהות של אשlagen בדם.

רמה גבוהה מדי של אשlagen בדם יכולה להשפיע על האופן שבו העצבים שלוטים על שריריהם. מצב זה יכול להוביל לחולשה או אפילו לשיתוק. רמה גבוהה של אשlagen יכולה לגרום ל��ב לב לא-סדיר, שיכול להשפיע בצורה חמורה על קצב הלב שלך.

ולטסה נקשרת לאשlagen במערכת העיכול. באופן זה ולטסה מונעת מאשlagen להגיע לדם ובכך מורידה את רמת האשlagen בדם בחזרה לרמה הנורמלית.

קבוצה רפואיית: תרופות לטיפול בהיפרקלמיה והיפרפרוספטמייה.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין לשימוש בתרופה אם:

- | |
|--|
| • הנר רגיש (אלרגי) לפטירומר או לכל מרכיב אחר בתרופה זו (ראה סעיף 6). |
|--|

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בולטסה, ספר לרופא אם:

- יש לך בעיות לבליעה – אם אין לך לבלווע תרופה זו, היא לא תפעל.
- יש לך בעיות חמורות בקיבה או במעי – תרופה זו עלולה לגרום עצירות או שלשול במטופלים מסוימים.
- עברת ניתוח גדול בקיבה או במעי – תרופה זו פועלת בזמן שהיא עוברת במעי, כך שניתוח גדול באותו זמן עשוי להשפיע על פעילות התרופה.

ילדים ומתבגרים

ולטסה משמשת לטיפול במבוגרים.

אין לתת ולטסה לילדים מתחת לגיל 12, מאחר והוא לא נבדק בקבוצת הגיל הזאת.

בדיקות ועקב

נטילת ולטסה עלולה להוביל לרמות נמוכות של מגנזיום בדם. הרופא שלך יבדוק את רמות המגנזיום שלך בתחילת הטיפול, לפחות בחורף חדש מתחילת הטיפול ובהתאם לצורכי הקלייני.

אינטרקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- צ'יפרופולוקסצין: תרופה לטיפול בziehomim חידק'ים.
- לובוטירוקסין: תרופה לטיפול בחסר בהורמון התירואיד.
- מטפורמיין: תרופה לטיפול בסוכרת.
- מיקופנולאט מופטייל: תרופה למניעת דחיה של אברים מושתלים.
- קוונינדין: תרופה לטיפול בקצב לב בלתי-סדיר.
- טלמייסטרן, ביסופרולול, קרבידילול, נביבולול: תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה ובעיות לב.

יש ליטול ולטסה לפחות 3 שעות לפני או אחרי נטילה של תרופות אחרות במתן פומי. ישן תרופות שאין מושפעות מניטילת ולטסה, אך שיתוך שהרופא או הרוקח יניחו אותך אחרית בהתאם ליתר התרופות שאתה מטל. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח.

שימוש בתרופה ומזון
יש ליטול את התרחיף המוכן של ולטסה עם או ללא אוכל.

הריון והנקה
אם הנך בהריון או מניקה, חשוב שתאת בהריון או מתכנת להרות, התיעצי עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת תרופה זו.

השתמשי בולטסה בהריון והנקה רק אם הרופא שלך סבור כי הדבר הכרחי.

נהיגה והפעלת מכונות
לולטסה אין השפעה או שהשפעתה זניחה על יכולתך לנוהג ולהפעיל מכונות.

מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של התרופה
ולטסה מכילה سورביטול. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך סבירות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא שלך לפני נטילת תכשיר רפואי זהה. תכילות הסורביטול היא כ-4 גרם (4.0.4 קילוקלוריות) לכל 8.4 גרם של פטירומר. سورביטול עלול לגרום לחסור נזחות במערכת העיכול ולהשפעה משולשת קלה. ולטסה מכילה סידן. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך להגביל את צריכת הסידן, היועץ ברופא לפני נטילת תכשיר רפואי זהה. הרופא יבדוק את רמת הסידן במשך חדש ככל הפחות מתחילת הטיפול בתרופה זו.

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מינון התחלתי: 8.4 גרם פטירומר (תכילות שקיית אחת של 8.4 גרם) פעמיים ביום.
• מינון מקסימלי: 25.2 גרם פטירומר (תכילות שקיית אחת של 8.4 גרם ושמיית אחת של 16.8 גרם) פעמיים ביום.

יתכן שהרופא שלך ייתאים את המינון לפי רמת האשלגן בدمך.

יש ליטול ולטסה לפחות 3 שעות לפני או אחרי נטילה של תרופות אחרות במתן פומי אלא אם כן הרופא או הרוקח יניחו אותך אחרת.

אין לעבר על המונה המומלצת.

אופן המתן

- יש לערבות את ולטסה עם הנזלים והמזונות הרכיכים המפורטים מטה ולבוחש היטב באופן הבא:
- יש להכין כ-40 מ"ל מהנזול או ממזון הרך (3 כפות) בכוס/קערה.
 - יש להוסיף את המספר הדורש של שקיות ולטסה ולבוחש.
 - יש להוסיף עוד כ-40 מ"ל נזול או מזון רך (3 כפות) ולבוחש היטב. האבקה אינה מתמשסת אולם נוצר תרחיף, שייתכן שייה גרגרי.
 - ניתן להוסיף עוד נזול או מזון רך לתערובת כדי להקל על בילעת התרופה. שים לב שככל שכמות הנזלים גדולה יותר, האבקה תשקע מהר יותר.
 - יש לשתוות או לאכול את התערובת תוך שעה מהכנתה. אם נותרת אבקה בכוס/קערה לאחר השתייה או האכילה, יש להוסיף נזול או מזון רך, לבוחש ולשתות/לאכול מיד. יתכן שתצטרך לעשות זאת פעמיים נספחים כדי לוודא ששסיימת את כל האבקה.

ניתן להשתמש במים או בנזלים או במזונות הרכיכים הבאים להכנת התערובת באופן המתואר מעלה: מיץ תפוחים, מיץ חמוץות, מיץ אננס, מיץ תפוזים, מיץ עגבבים, מיץ אגסים, נקטר משמש, נקטר אפרסק, יוגרט, חלב, מסמיר (לדוגמה: עמילן טירס), רוטב תפוחים, פודינג וניל או שוקולד.

כאשר משתמשים בנזלים או במזונות ריכים שכאלה, יש לעקוב אחר המלצות התזונתיות לצריכת האשלגן. בדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אין בטוח.

יש לשתוות רק כמויות מודדות (פחות מ-400 מ"ל ליום) של מיץ חמוץות שכן הוא יכול להשפיע על תרופות אחרות.

קח את התרחיף המוכן של ולטסה עם או ללא אוכל. עדיף בשעה קבועה בכל יום. לעולם אל תחמס את ולטסה או תוסיף אותה למזונות או משקאות מוחוממים. אין לקחת את ולטסה כאבקה יבשה.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר של התרופה

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר או אם בטעות בעליל מין התרופה, הפסיק את הנטילה של ולטסה ופנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה אליו.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול מנה אחת, קח אותה בהקדם האפשרי באותו יום. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכח. אם שכחת ליטול יותר ממנה אחת, פנה לרופא שלך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ ע"י הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אל תפסיק לקחת את התרופה ללא אישור רופא, מכיוון שרמות האשלגן בדרך כלל עלולות לעלות.

אין ליטול תרופות בחושרי! בדוק התווית ומהנה **בכל פעם** שאתה נטול תרופה. הרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בולטסה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

יש להפסיק ליטול את התרופה ולפנות לטיפול רפואי דחוף אם הבחנת בכל אחת מהתופעות הלואוי הבאות:

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- **תגובה אלרגיות:** התסמנים כוללים פריחה, סרפתת, התנפחות של השפתיים, הלשון או הגרון.

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שימושיות ב-10-1 ממשתמשים מתוך 100:

- עצירות.
- שלשול.
- כאב בטן.
- בחילה.

- גזים.
- רמות נמוכות של מגנזיום בدم שנראות בבדיקות.

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) - תופעות שמצוינות ב-10-1 מעתמשים מתוך 1,000:
• הכאה.

אם הופעה **תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עיר להתייעץ עם הרופא.**

דיווח על תופעת לוואי
ניתן לדוח על תופעת לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעת לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעת לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמנוע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריך תאריך התפוגה המופיע על גבי אריזת הקרטון או השקית אחרי המילה EXP. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לשמור ולהוביל בקירור (C° 8 – 2°).
ניתן לאחסן את ולטסה בטמפרטורה הנמוכה מ- C° 25 למשך 6 חודשים לכל יותר.

6. מידע נוספת:

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
xanthan gum
- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:
צבע האבקה המיועדת לתרחיף לנטילה דרך הפה הינו בין אופ-וויט (קרם) לחום בהיר.
ולטסה זמין באזיות המכילות 30 שקיות.
- בעל הרישום וכתובתו: צט בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון, ישראל
שם היצרן וכתובתו:
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd., Switzerland.
Rechenstrasse 37 CH-9017 St. Gallen, Switzerland.
- מספרי רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
ולטסה 8.4 גר' – 161-52-35491
ולטסה 16.8 גר' - 161-53-35492

עלון זה נערך בתאריך 07/2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפניות ולהקלת הקראיה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.