نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - <u>1986</u>

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

دوپیکسنت 300 ملغ

محلول للحقن ضمن محقنة جاهزة للإستعمال مع واقي إبرة

المادة الفعالة:

تحتوى كل محقنة جاهزة للإستعمال من دوپيكسنت 300 ملغ على 300 ملغ دوپيلوماب (dupilumab). المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 والفقرة 6.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. إحتفظ بهذه النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية. تحتوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة. وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

 علاج إلتهاب الجلد التأتبي بدرجة خطورة متوسطة حتى شديدة، لدى الكبار والأطفال من عمر 6 أشهر وما فوق، عندما لا يتم ضبط المرض بشكل كاف بمساعدة أدوية بموجب وصفة طبيب لعلاج موضعي للجلد أو عندما لا يستطيع المتعالج إستعمال العلاج الموضعي.

بالإمكان إستعمال دوپيكسنت مع أو بدون كورتيكوستيروئيدات للعلاج الموضعي.

• علاج داعم في الربو بدرجة خطورة متوسطة حتى شديدة لدى الكبار والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق، بمشاركة أدوية إضافية لعلاج الربو عند متعالجين لديهم الربو غير مسيطر عليه بواسطة الأدوية التي يتلقونها للربو. يساعد دوپيكسنت بمنع نوبات شديدة للربو ويمكنه تحسين التنفس. كذلك قد يساعد دوپيكسنت في خفض كمية الكورتيكوستيروئيدات بالإعطاء عن طريق القم (بلع)، التي يتناولها المتعالج أثناء منع نوبات الربو الشديدة وتحسين التنفس.

لا يُستعمل دوپيكسنت لعلاج مشاكل التنفس المفاجئة. • يُستعمل دوپيكسنت 300 ملغ بمشاركة أدوية إضافية لعلاج

إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية يترافق بسلائل أنفية لدى كبار مرضهم خارج عن السيطرة. • يُستَعملُ دوييكسنت 300 ملغ لعلاج إلتهاب المريء اليوزيني

لدى الكبار والأطفال من عمر 12 سنة، الذين يزنون 40 كلغ • يُستعمل دوپيكسنت 300 ملغ لعلاج الحكاك العقيدي بدرجة

خطورة متوسطة حتى شديدة، لدى الكبار المرشحين لعلاج (3) كيفية إستعمال الدواء؟

الفصيلة العلاجية: علاجات للحلد والتهاب الحلد، والتي ليست

يعمل دوپيكسنت عن طريق حجب پروتينين إثنين يسببان _ يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضا-(eczema/atopic dermatitis)، في الربو، في إلتهاب مزمن وطريقة العلاج بالمستحضر.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء: إذا كنت حساساً (أليرجي) لـ دوپيلوماب أو لكل واحد من المركبات لإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء تحدث مع الطبيب قبل العلاج بدوييكسنت عن كل حالاتك الطبية، وهذا

• وُجدت لديك مشاكل في العينين. • وُجد لديك تلوث طفيلي في الأمعاء.

• كنت مقبلاً على تلقى لقاحات. لا يجوز تلقى "لقاحاً حياً" مباشرة قبل وخلال العلاج بدوپيكسنت. الأطفال والمراهقون

• دوييكسنت غير مخصص لعلاج إلتهاب الجلد التأتبي لدى الأطفال دون دوپیکسنت غیر مخصص لعلاج الربو لدی الأطفال دون عمر 6 سنوات.

• دوييكسنت غير مخصص لعلاج إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية يترافق بسلائل أنفية لدى أطفال ومرآهقين دون عمر 18 سنة. • دوپيكسنت غير مخصص لعلاج إلتهاب المريء اليوزيني لدى أطفال

دون عمر 12 سنة ويزنون 40 كلغ على الأقل. دوپيكسنت غير مخصص لعلاج الحكاك العقيدي لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكِ للطبيب أو للصّيدلي

عن ذلك، بالأخص إذا: • كنت تتناول أدوية الكورتيكوستيروئيدات عن طريق البلع، بالإستعمال الموضعي أو بالإستنشاق. • وُجِد لديكُ ربو وكنت تتناول أدوية لعلاج الربو.

وُجد لديك إلتهاب جلد تأتبي، إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية يترافق بسلائل أنفية، إلتهاب المريَّء اليوزيني أو الحكَّاك العقيدي وأيضاً ربو. لا تغير أو تتوقف عن تناول الكورتيكوستيروئيدات خاصتك أو أدوية الربو خاصتك، بدون إستشارة الطبيب. هذا من شأنه أن يسبب لأعراض

أِخرى، التي كانٍ مسيطر عليها تحت العلاج بالدواء الكورتيكوستيروئيدي

الحمل، الإرضاع والخصوبة

أو دواء الربو، أن تظهر ثانية.

إستشيري طبيبك قبل تناولك أي دواء إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل، إن تأثير هذا الدواء على الجنين غير معروف.

• غير معروف إذا ما كان دوپيكسنت ينتقل إلى حليب الأم.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء يحتوي دوپيكسنت على أقل من 1 ميليمول (23 ملغ) من الصوديوم لمقدار دوائي قدره 300 ملغ، أي أنه في الحقيقة "خالِ من الصوديوم".

بشكل صحيح وأيضاً كيفية إلقاء محاقن دوپيكسنت المستعملة.

إقرأ جيداً "تعليمات الاستعمال" الملحقة بالنشرة من أجل تلق معلومات حول كيفية تحضير وحقن دوپيكسنت وكيفية تخزين الدواء

نوعاً من إلتهاب له دور رئيسي في إلتهاب الجلد التأتبي من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي

في الجيوب الأنفية يترافق بسلائل أنفيّة، إلتهاب المريء اليوزيني يُعطى دوپيكسنت بالحقن تحت الجلد (حقنة تحت الجلد).

إذا قرر كل من طبيبك أو الممرضة خاصتك بأنك أنت أو المعالج الخاص بك يمكنكما إعطاء حقنة دوپيكسنت، فسوف يتوجب عليك أو علَّى المعالج الخاص بك تلقى إرشاد حول الطريقة الصحيحة لتحضير وإجراء الحقز

كم دوپيكسنت عليك أن تحقن ولأي فترة من الزمن

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

تحتوی کل محقنة من دوپیکسنت 300 ملغ علی مقدار دوائی واحد من

المقدار الدوائي الموصى به لأطفال من عمر 6 سنوات حتى 17 سنة

15 كلغ حتى أقل | 600 ملغ (حقنتين من عيار | 300 ملغ كل 4 أسابيع

30 كلغ حتى أقل | 400 ملغ (حقنتين من عيار | 200 ملغ كل أسبوعب

| 60 كلغ أو أكثر | 600 ملغ (حقنتين من عيار | 300 ملغ كل أسبوعير

المقدار الدوائي الموصى به لأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات

15 كلغ حتى أقل من 30 كلغ | 300 ملغ (حقنة واحدة ذات

* بالنسبة لأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات الذين لديهم إلتهاب

المقدار الدوائي الموصى به لكبار وأطفال من عمر 12 سنة وما

600 ملغ (حقنتين من عيار 300 ملغ) المبوعين

المقدار الدوائي لمرضى لديهم ربو ومتعلقين بالكورتيكوستيروئيدات

الفموية أو لمرضى لديهم ربو يترافق بإلتهاب الجلد التأتبي المتوسط

حتى الشديد أو لدى كبار لديهم مرض إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية

يترافق بسلائل أنفية

600 ملغ (حقنتين من عيار 300 ملغ) السبوعين

الجُلد التَّأْتبي، لا يوصى بإعطاء مقدار دوائي تحميلي إبتدائي.

مقدار دوائى تحميلى

300 ملغ)

200 ملغ)

300 ملغ)

مقادير دوائية لاحقة

مقدار دوائي إبتدائی* ومقادیر

200 ملغ) كل 4 أسابيع

300 ملغ) كل 4 أسابيع

مقادير دوائية لاحقة

200 ملغ كل أسبوعين

200 ملغ (حقنة واحدة

حقنة دوييكسنت من قبل معالج.

• لاحقاً، 300 ملغ كل أسبوعين.

الذين لديهم إلتهاب الجلد التأتبي:

الذين لديهم إلتهاب الجلد التأتبي:

5 كلغ حتى أقل من 15 كلغ

المقدار الدوائي التحميلي الإبتدائي

| 400 ملغ (حقنتين من عيار 200 ملغ)

فوق الذين لديهم ربو:

دوپیکسنت (300 ملغ).

ىن 30 كلغ

من 60 كلغ

مقدار دوائي إبتد ومقادير دوائية لا	وزن الجسم	لا تحاول حقن دوپيكسنت قبل تلقيك إرشاد من الطبيب أو الممرضة. محقنة الدوپيكسنت غير مخصصة للإستعمال لدى الأطفال دون عمر
300 ملغ كل 4 أ	15 كلغ حتى أقل من 30 كلغ	6 أشهر.
200 ملغ كل أسب	30 كلغ أو أكثر	بالنسبة للأطفال من عمر 12 سنة وما فوق، من الموصى به أن تُعطى حقنة دوپيكسنت من قبل شخص بالغ أو تحت مراقبته.
لمى *بالنسبة لأطفال بعمر 6 حتى 11 سنة لديهم ربو، لا يوصى		بالنسبة للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر 12 سنة، يجب أن تُعطى

دوائي تحميلي إبتدائي. بالنسبة لأطفال بعمر 6 حتى 11 سنة الذين لديهم ربو يترافق بإلتهاب جلد تأتبي متوسط حتى شديد، يجب إتباع الجدول الذي يُظهر المقدار الدوائي الموصى به لأطفال من عمر 6 سنوات حتى 17 سنة الذين يعانون

المقدار الدوائي الموصى به لأطفال من عمر 6 حتى 11 سنة

من إلتهاب الجلد التأتبي، الذي يشمل مقدار دوائي تحميلي إبتدائي. المقدار الدوائي لكبار الذين لديهم إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية يترافق بسلائل أنفية: المقدار الدوائي الموصى به لكبار الذين لديهم إلتهاب الجلد التأتبي: مقدار دوائي إبتدائي ذو 600 ملغ (حقنتين من عيار 300 ملغ). إن المقدار الدوائي الموصى به هو 300 ملغ كل أسبوعين.

المقدار الدوائي لكبار وأطفال من عمر 12 سنة وما فوق الذين لديهم إلتهاب المريء اليوزيني: إن المقدار الدوائي الموصى به لكبار وأطفال من عمر 12 سنة وما فوق، الذين يزنون 40 كلغ على الأقل هو 300 ملغ كل أسبوع. المقدار الدوائي لكبار الذين لديهم الحكاك العقيدي: إن المقدار الدواتَّى الموصى به هو مقدار دوائي إبتدائي قدره 600 ملغ • تلوثات ڤيروس الهرپس

(حقنتين من عيار 300 ملغ) وبعد ذلك 300 ملغ كل أسبوعين. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به. إذا إستعملت أكثر مما هو مطلوب من دوييكسنت إذا إستعملت أكثر مما هو مطلوب من دوييكسنت أو إذا أعطى المقدار

الدوائى أبكر مما ينبغي، توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية. إذا نسيت إستعمال دوييكسنت إذا نسيت حقن مقدار دوائى من دوپيكسنت، توجه إلى طبيبك، الصيدلى و الممرضة.

إذا توقفت عن إستعمال دوپيكسنت لا يجوز التوقف عن إستعمال دوپيكسنت بدون إستشارة الطبيب أولاً. من شأن طبيبك أن يوصى بتناول أدوية إضافية بالمشاركة مع دوييكسنت

إستعمل الأدوية الأخرى بالضبط كما أوصاك به الطبيب لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي. 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال دوپيكسنت قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعانى أياً منها.

يمكن أن يسبب دوپيكسنت أعراضاً جانبية خطيرة تشمل: • ردود فعل تحسسية إيمكن أن يؤدي دوپيكسنت إلى ردود فعل تُحسسية التي أحياناً يمكن أن تكون خطيرة. توقف عن إستعمال دوپيكسنت وتوجه فوراً إلى طبيبك أو إلى مركز

الطوارئ، إذا ظهر واحد أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية: مشاكل في التنفس أو صفير، إنتفاخ في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة، إغماء، دوار، الشعور بدُّوخة، نبض سريع، سخونة، الشعور بوعكة عامة، إنتفاخ الغدد الليمفاوية، آلام في المفاصل، شرى، حكة، طفح جلدي، غثيان أو تقيق، تقلصات في منطّقة المعدة.

• مشاكل في العينين. توجه إلى الطبيب إذا وُجدت لديك مشكلة جديدة شروط التخزين: مى العينين أو تفاقم لمشكلة سابقة، بما فى ذلك ألم فى العين أو تغيرات لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة. يجب التخزين في في الرؤية، مثل تشوش الرؤية. من الجائز أن يرسلك طبيبك إلى طبيب

• التهاب في الأوعية الدموية. في أحيان نادرة المرضى الذين يعانون من الربو من شأنهم أن يطوّروا هذا العرض. يحدث هذا لدى أشخاص يتناولون أيضاً دواء من فصيلة الستيروئيدات عن طريق الفم لكنهم يتوقفون عن العلاج به أو أنه يتم خفض مقداره الدوائي. من غير فوراً إذا وُجد لديك: طفح، ألم في الصدر، تفاقم ضيق التنفس، الشعور بوخز/دبابيس أو خدر في الذرآعين أو في الرجلين، سخونة مستمرة. • ألام في المفاصل. يمكن أن تحدث آلام في المفاصل لدى الأشخاص الذين يستعملون دوييكسنت. بعض الأشخاص قاسوا من مشاكل في المشي أو في الحركة جراء أعراض في المفاصل لديهم، وفي بعض الحالات تطلب الأمر المبيت في المستشفّى إحكِ لطبيبك حول أعراض جديدة أو تفاقم الأعراض في المفاصلِ. من الجائز أن يوقف طبيبك العلاج بدوپيكسنت إذا تطورت لديك أعراض في المفاصل.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لـ دوپيكسنت: • ردود فعل في منطقة الحقن

• تلوثات في الطرق التنفسية العلوية • إلتهاب في العينين والجفنين، بما في ذلك إحمرار، إنتفاخ وحكة، أحياناً مع تشوش الرؤية • جفاف في العين

• أعراض النزلة (تلوث في الجهاز التنفسي العلوي) • ألم في الحنجرة (ألم في البلعوم)

• تقرحات البرد في الفم والشفتين • إرتفاع في تعداد خلايا دم بيضاء معينة (فرط الحمضات)

• آلام عضلية • صعوبات في النوم • ألم في الأسنّان

• إلتهاب في المعدة • تلوثات طفيلية في الأمعاء

بُلِّغ عن الأعراض الجانبية الإضافية التالية: • طفح أو إحمرار في الوجه إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما

تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة تم إعدادها في شباط 2024 بموجب تعليمات وزارة الصحة. الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدى ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلَّك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس

العلبة الأصلية للحماية من الضوء. يجب التخزين في البراد (8-2 درجات مئوية). لا يجوز التجميد. لا يجوز الخض. لا يجوز تسخين أو تعريض محقنة دوپيكسنت إذا تطلب الأمر، بالإمكان تخزين المحاقن في درجة حرارة الغرفة حتى 25 درجة مئوية لمدة 14 يوماً كحد أقصى. لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. إذا قمت بإخراج علبة الكرتون من البراد، قم بتدوين تاريخ الإخراج على العلبة الخارجية وإستعمل دوپيكسنت في غضون 14 يوماً. لا يجوز

لا يجوز إلقاء أدوية في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد بحاجتها. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كان عكراً، تغير لونه أو يحتوي على

6) معلومات إضافية يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:


تحتوى كل محقنة من دوپيكسنت 300 ملغ على: Sucrose (100 mg), L-arginine monohydrochloride, L-histidine monohydrochloride monohydrate. L-histidine, polysorbate 80, glacial acetic acid, sodium acetate trihydrate, water for injections. كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تحتوى كل محقنة زجاجية جاهزة للإستعمال على 300 ملغ دوپيلوماب في 2 ملل محلول رائق حتى قاتم قليلاً، عديم اللون حتى لون أصفر شاحب تحتوي العلبة على: 1 أو 2 أو 3 أو 6 محاقن جاهزة للإستعمال

من الجاتئز ألا تسوّق كافة أحجام العلب. لا تحتوى هذه النشرة على كافة المعلومات عن الدواء. إذا توفر لديك أي سؤال أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما، الرجاء توجه للطبيب.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي إسرائيل م.ض.، مُجَمّع چرينوورك، ص.ب. 47 ياكوم. رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 1602235266

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.



تعليمات الإستعمال

دوپيكسنت 300 ملغ محقنة جاهزة للإستعمال

لا تحقن لنفسك أو لشخص آخر حتى يعلموك كيفية حقن


يستطيع طاقم طبي أن يريك أو الذي يعالجك كيفية تحضير وحقن

معلومات هامة • إقرأً كافة التعليمات بتمعن قبل إستعمال المحقنة. • إستوضح من الطاقم المعالج الخاص بك حول الوتيرة التي بموجبها عليك حقن الدواء.

إقرأ تعليمات الإستعمال قبل إستعمال محقنة دوبيكسنت المعبأة

المرة الأولى. إحتفظ بهذه التعليمات للاستعمال المستقبلي. إتصل بالطاقم الطبي إذا توفرت لديك أسئلة.

أجزاء محقنة دوپيكسنت الجاهزة للإستعمال مع واقى إبرة تظهر




المرحلة 7: نظّف

دع جلدك يجف قبل الحقن.

نظُّف موقع الحقن بواسطة ممسحة كحولية.

هذه الأداة هي محقنة معبأة مسبقاً لمرة واحدة (تسمى "محقنة" في هذه التعليمات). هي تحتوي على 300 ملغ من دوپيكسنت للحقن تحت الجلد (حقن تحت الجلد).



• لا تعاود أبداً سحب قضيب المكبس. • لا تنزع غطاء الإبرة حتى قبيل الحقن مباشرة. • إرم المحقنة أحادية الإستعمال المستعملة فوراً بعد الإستعمال. • لَا تُستعمل ثانية نفس محقّنة دوپيكسنت.

• لا تلمس قضيب المكبس إلى أن تكون مستعداً للحقن.

• لا يجوز الحقن عبر الملابس. • لا يجوز إخراج فقاعات هواء من المحقنة.

• بدّل موقع الحقن بكل عملية حقن.

• لدى الأطفال من عمر 12 سنة وما فوق، من الموصى به أن يُعطى دوپيكسنت من قِبل شخصِ بالغ أو تحت مراقبته.

• لدى الأطفال بعمر 6 أشهر حتى دون عمر 12 سنة، فإن حقنة دوپيكسنت يجب أن تُعطى من قِبل معالِج.

• لا يجوز إستعمال المحقنة إذا سقطت على سطح صلب أو تضررت.

• لا يجوز إستعمال المحقنة إذا كان غطاء الإبرة ناقصاً أو أنه غير موصول

المرحلة 1: أخرج أخرج المحقنة من علبة الكرتون عن طريق مسك وسط جسم المحقنة. • لتقليل خُطُورة الوِخز من الإبرة بالخطأ، يوجد على المحقنة واقي إبرة الذي يعمل تلقائياً لتغطية الإبرة بعد الحقن.


▲ لا يجوز نزع غطاء الإبرة إلىأن تكون مستعداً للحقن. ▲ لا يجوز إستعمال المحقنة إذا سقطت على سطح صلب أو

كيفية تخزين دوپيكسنت

• لا يجوز خض المحقنة.

• لا يجوز تسخين المحقنة

• لا يجوز تجميد المحقنة.



أولى المرحلة 2: حضر المرحلة 1: حضر المرحلة 2: حضر المرحلة 2: حضر المرحلة 1: حضر المرحلة 2: حضر المرحلة 1: حمر ال

• إحفظ المحاقن في البراد، بدرجة حرارة ما بين 8-2 درجات مئوية.

• إحفظ المحاقن في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.
• بالإمكان تخزين المحاقن في درجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية) لمدة تصل إلى 14 يوماً. إرم المحاقن التي بقيت في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 14 يوماً.

• لا يجوز وضع محقنة دوپيكسنت تحت ضوء الشمس المباشر.

المرحلة 3: إفحص

تأكد من أن بحوزتك الأغراض التالية:


• محقنة الدوپيكسنت الجاهزة للإستعمال

ممسحة كحولية*
كرة قطنية أو ضماد شاشي*
وعاء مقاوم للثقب* (أنظر المرحلة 13)

عندما تحصل على محاقن دوپيكسنت خاصتك، إفحص دائماً أن: لديك المستحضر الصحيح والمقدار الدوائي الصحيح.
 تاريخ الصلاحية المسجل على المحاقن لم ينقض.

* هذه الأغراض غير مشمولة في علبة المستحضر.

△ لا يجوز إستعمال المحقنة إذا إنقضى تاريخ الصلاحية.



Lot EXP 3LNSBA 02/2018

المرحلة 5: إنتظر 45 دقيقة ضع المحقنة على سطح مستو ودعه يبلغ بشكل طبيعى درجة حرارة

أمعن النظر بالدواء عبر نافذة العرض التي على المحقنة.

تأكد من أن السائل رائق وعديم اللون حتىَّ لونَّ أصفر شاحب.

▲ لا تستعمل المحقنة إذا تغير لون السائل أو كان عكراً، أو كان يحتوي على فتات أو جسيمات ظاهرة للعين.


نافذة العرض

ملاحظة: من الجائز أن ترى فقاعة هواء؛ هذا الأمر طبيعي.

الغرفة لمدة 45 دقيقة على الأقل. △ لا تسخن المحقنة.


المرحلة 4: إفحص

△ لا تضع المحقنة تحت ضوء الشمس المباشر. الا تترك دوپيكسنت بدرجة حرارة الغرفة لفترة تزيد عن
 14 يوماً. إرم محاقن دوپيكسنت التي بقيت في درجة حرارة الغرفة لفترة تزيد عن 14 يوماً.




المرحلة 8: إنزع غطاء الإبرة المرحلة 9: أقرص طية جلد في موقع الحقن (الفخذ أو البطن، ما عدا 5 سم حول سرتك، أدخل كامل الإبرة داخل طية أن المرحلة 9: أن المرحلة عبداً أن المرحلة بعيداً أن المرحلة

إحقن دواءك مباشرة بعد نزع غطاء الإبرة.




🛦 لا تعد غطاء الإبرة إلى مكانه.



أو في المنطقة الخّارجيّة لأعلى ألذراع إذا كان دوپيكسنت يُحقن من قبل الجلد بزاوية قدرها 45 درجة


المرحلة 11: إدفع

حرر القرصة. بإخراج المحقنة من موقع الحقن. بِعَمَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مُوتِعَمِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ببطء وبثبات حيثما يصل للمكان إضغط بلطف بواسطة كرة قطنية أو الضماد الشاشي على موقع الحقن،



المرحلة 12: أخرج وحرر







المرحلة 12: أخرج وحرر المرحلة 13: إرم المرحلة 13: إرم المرحلة 13: إرم المرحلة 13: إرم المحتملة المحتملة المحتملة الإبرة في الوعاء المقاوم للثقب، مباشرة بعد الإستعمال. ▲ لا ترم الإبر، محاقن دوپيكسنت وأغطية الإبر إلى النفايات المنزلية الخاصة بك.

= الحقن الذاتي أو الحقن من قِبل الشخص الذي يعالجك

الحقن فقط من قبل الشخص الذي يعالجك

المرحلة 6: إختر موقع الحقن الخاص بك • بإمكانك أن تحقن في الفخذ أو البطن، عدا 5 سم من حول

إذا كان الشخص الذي يعالجك هو من يحقنك، فبإمكانه أن يحقن أيضاً في المنطقة الخارجية في أعلى ذراعك.

• إختر موقع حقَّن مختلف في كل مرة تحقن فيها دوپيكسنت.

🛦 لٍا يجوز الحقن لداخل جلد حساس، مصاب، عليه كدمات

🛦 لا تعد غطاء الإبرة إلى مكانه.

