

יולי 2024

רופא/ה נכבד/ה  
רוקח/ת נכבד/ה,

חברת אלי לילי ישראל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון העלונים לרופא ולצרכן של התכשירים, Trulicity 0.75mg ו-Trulicity 1.5mg

בהודעה זו נכללים השינויים המהותיים בלבד. שינויים המהווים החמרה מסומנים בצהוב, מידע שהתווסף מסומן בכחול ומידע שהוסר מסומן באדום. ישנם עדכונים נוספים.

העלונים המעודכנים מפורסמים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום:  
אלי לילי ישראל בע"מ, רח' השיזף 4, רעננה, טל': 09-9606234

בברכה,

הדס השכל  
רוקחת ממונה

### Trulicity 0.75 mg

### Trulicity 1.5 mg

**צורת מינון:**

Solution for injection

**מרכיב פעיל:**

Dulaglutide

**התוויה המאושרת לתכשיר:**

Type 2 Diabetes Mellitus

Trulicity is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise

- as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications
- in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes

**להלן העדכונים העיקריים בעלון לרופא:**

Severe gastrointestinal disease

Dulaglutide has not been studied in patients with severe gastrointestinal disease, including severe gastroparesis, and is therefore not recommended in these patients. Events related to impaired gastric emptying, including severe gastroparesis, have been reported. Monitor and consider dose modification or discontinuation in patients who develop severe gastrointestinal symptoms while on treatment.

**להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן:**

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- **לפני הטיפול בטרוליסטי ספר לרופא אם:**  
(...)

**תסמינים, לעיתים חמורים, של התרוקנות איטית של תכולת הקיבה כגון הרגשת מלאות, בחילה ו/או הקאה דווחו במטופלים המשתמשים בטרוליסטי. ספר לרופא אם במהלך השימוש בטרוליסטי, אתה מפתח בעיות חמורות בהתרוקנות הקיבה שלך שאינן חולפות.**