

סומטרידקן® 50, 100, קפליות

כל קפליה מכילה סומטריפטאן (סומטריפטאן (Sumatriptan (as succinate)) במינון 50 או 100 מ"ג בהתאם.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוספים" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

סומטרידקן משמשת להקלת אקוטית בהתקפי מיגרנה, עם או בלי כאורה. יש להשתמש בסומטרידקן רק כאשר ישנה אבחנה ברורה של מיגרנה.

קבוצה רפואיית: משככי כאבים: טריפטאנים - אגוניסטים סלקטיביים לקובלטן 1-HT-5.

تسمיני מיגרנה עלולים לגרום על ידי התרחבות זמנית של כלי דם בראש. סומטריפטאן נחשב כmphait את התרחבות של כלי דם אלה. זה כשלעצמו מסייע לשכך את כאב הראש ולהקל על תסמינים אחרים של התקף מיגרנה, כגון בחילה או הקאה ורגישות לאור ולקלול.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (סומטריפטאן) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אם יש לך בעית לב כגון היצרות של העורקים (מחלת לב איסכמית) או כאבים בחזה (תעוקת חזה), או אם היה לך התקף לב.
- אם יש לך בעיות בזרימת הדם ברגלייך אשר גורמות לכאבים דמו"י התכווצות בזמן הליכה (מחלת כלי דם ריקפיים).
- אם היה לך אירוע מוחי או אירוע מוחי חולף (מכונה גם התקף איסכמי חולף או AIT).
- אם יש לך לחץ דם גבוה. יתכן שתוכל להשתמש בסומטרידקן אם לחץ הדם הגבהה שלך הוא מתון ומטופל.
- אם יש לך מחלתCBD חמורה.
- עם תרופות אחרות למיגרנה, כולל אלו המכילות ארגוטאמין או תרופות דומות כגון מתיסרגיד מלאט (methysergide maleate) או כל טריפטאן או אגוניסט 1-HT-5 (כגון נארטריפטאן או צולמייטריפטאן).
- עם כל אחת מהתרופות נוגדות הדיאקון הבאות:
 - מעכבי מונואמין אוקסידייז (MAOIs) או אם לקחת DOI בשבועיים האחרונים.

אם אחד מ אלה מתייחס אליו:

← ספר לרופא שלך ואל תשתחש בסומטרידקן.

ażhorot miyohdot haenguvot li-shimush batrufa

l-peni htipol basomteridkan, sefer l-rofaya;

אם יש לך גורמי סיכון נוספים כלשהם

- אם אתה מעשןCBD או משתמש בטיפול בתחליבי ניקוטין, ובמיוחד
- אם אתה גבר מעל גיל 40, או
- אם את אישה לאחר גיל המעבר

במקרים נדירים מאוד, אנשים פיתחו בעיות לב חמורות לאחר שימוש בסומטרידקן, אף על פי שלא היו להם סימנים של מחלת לב לפני כן. אם אחת מהנקודות מעלה מתיחות אליר, יתכן שיש לך סיכון גדול יותר לפתח מחלת לב, לכן:

← ספר לרופא שלך כדי שתפקיד הלב שלך יוכל לבדוק לפני שסומטרידקן נרשם עבורה.

אם יש לך היסטוריה של התקפים (פרכוסים)

או אם יש לך מצבים אחרים אשר עלולים להגביר את הסיכון שהיה לך התקף – לדוגמה, FAGIUT ראש או אלכוהוליזם:

← ספר לרופא שלך כדי שתוכל להיות תחת מעקב הדוק יותר.

אם היה לך לחץ דם גבוה, יתכן שסומטרידקן לא מתאימה לך

← ספר עלך לרופא שלך או לרוקח לפני השימוש בסומטרידקן.

אם יש לך מחלת CBD או כליה

אם אחד מ אלה מתיחות אליר:

← ספר עלך לרופא שלך או לרוקח לפני השימוש בסומטרידקן.

אם אתה אלרגי לאנטיביוטיקות הנקרואות סולפונאמידים

אם כך, יתכן שתהיה אלרגי גם לסומטרידקן. אם אתה יודע שאתה אלרגי לאנטיביוטיקה אך אין בטוח אם היא סולפונאמיד:

← ספר לרופא שלך או לרוקח לפני השימוש בסומטרידקן.

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון הנקרואות SSRIs

(מעכבי סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרotonin) או SNRIs (מעכבי ספיגה חוזרת של סרotonin וnorepinephrine), או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים):

← ספר לרופא שלך או לרוקח לפני השימוש בסומטרידקן. ראה גם סעיף "תגובהות בין תרופתיות" להלן.

אם אתה משתמש בסומטרידקן לעתים קרובות

שימוש תכוף מדי בסומטרידקן עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.

← ספר לרופא שלך אם זה מתיחות אליר. הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק השימוש בסומטרידקן.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש בסומטרידקן

תופעות אלה עלולות להיות עצות ארכן בדרך כללחולפות במהירות. אם אין חולפות במהירות, או שאתה מחמיר:

← פנה מיד לקבלת עצה רפואי. סעיף 4 (מופייע בהמשך) כולל מידע נוסף על תופעות לוואי אפשריות אלה.

תגובהות בין תרופתיות

ישנן תרופות שאסורה לקחת עם סומטרידקן ואחרות עלולות לגרום לתופעות לוואי אם הן נלקחות עם סומטרידקן.

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על

- כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקחת:
- ארגוטאמין שגム משמשת לטיפול במיגרנה, או תרופות דומות כגון מתיסרגיד (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשמש בסומטרידקס באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסיק לחתת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני שימוש בסומטרידקס. אל תיקח שוב כל תרופה המכילה ארגוטאמין או מרכיבים הדומים לארגוטאמין לפחות 6 שעות לאחר השימוש בסומטרידקס.
 - טריפטאנים/אגוניסטים לקולטן 1HT-5 אחרים (כגון נאראטրיפטאן, ריזאטראטראטאן או זולמיטריפטאן), המשמשים גם לטיפול במיגרנה (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשמש בסומטרידקס באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסיק לחתת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש בסומטרידקס. אל תיקח שוב טריפטאן/אגוניסט לcoleutן 1HT-5 נוסף לפחות 24 שעות לאחר השימוש בסומטרידקס.
 - **תרופות MAOIs** המשמשות לטיפול בדיכאון. אם לךות אותן בשבועיים הבאים אל תשמש בסומטרידקס.
 - **תרופות SSRIs ו-TCA** (נוגדי דיכאון טריציקליים) המשמשות לטיפול בדיכאון. שימוש בסומטרידקס יחד עם תרופות אלה עלול לגרום לתסמונת סרוטונין (אוסף של תסמים שיכולים לכלול חוסר מנוחה, בלבול, הדעה, הדעת, רפלקסים מגברים, התכווצויות שרירים, צמרמות, עלייה בדופק ורעד). ספר לרופא שלך מידית אם אתה מושפע באופן זה.
 - **היפריקום פרפורטום** (St John's Wort). נטילת תרופות צמחיות המכילות היפריקום יחד עם סומטרידקס עלולה להעלות את הסבירותות לתופעות לוואי.

היריון, הנקה ופוריות

- אם את בהיריון, **חוسبת שיiticן** שאת בהיריון או מתכנתת להרות, היועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. יש מידע מוגבל בלבד על הבטיחות של סומטרידקס בנשים בהיריון, אם כי עד כה אין ראייה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידוע איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש בסומטרידקס כשאת בהיריון.
- **אל תניקי את תינוקך** במשך 12 שעות לאחר השימוש בסומטרידקס. אם את שואבת חלב במהלך זמן זה, השליכי את החלב ואל תניקי אותו לתינוקך.

נהיגה ושימוש במכונות

תרופה זו או תסמיini המיגרנה עלולים לגרום לך לנמנום. אם אתה מושפע, **אל תנעה או תעפעיל מכונות.**

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- תרופה זו מכילה לקטוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבירות לסתורים מסוימים, היועץ ברופא לפני תחילת הטיפול בתרופה זו.
- תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לkapelia, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד לשמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

מתי לוקח סומטרידקס

- עדיף לחתת סומטרידקס ברגע שאתה מרגיש **شمיגרנה מתחילה**, אם כי אתה יכול לחתת אותה בכל זמן במהלך התקף.
- **אין להשתמש בסומטרידקס** כדי לנסוטו למניע התקף – השימוש בה רק לאחר שתסמיini המיגרנה של מתחילה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- המינון המקבול למבוגרים **בגיל 18 עד 65** הוא **קפליה אחת של סומטרידקס 50 מ"ג**. יתכן שמטופלים מסוימים יזדקקו למינון של 100 מ"ג – עליך לפעול בהתאם להמלצת הרופא שלך.
- **ילדים מתחת לגיל 18**
- **סומטרידקס** אינה מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל 18 שנים.
- **סומטרידקס** אינה מיועדת לשימוש באנשים מעל גיל 65.
- **אין לעבור על המנה המומלצת.**

אם התסמינים שלך מתחwilים לחזרה

- אתה יכול ללקחת קפליה שנייה של **סומטרידקס** אם חלפו לפחות שעתיים מהקפליה הראשונה. **אל תיקח יותר מ-300 מ"ג בסך הכל ב-24 שעות.**
- **אם لكפליה הראשונה לא הייתה השפעה**
- **אל תיקח קפליה שנייה או כל תכשיר אחר המכיל סומאטריפטאן לאחר התקף.** ניתן עדין להשתמש בסומטרידקס להתקף הבא שלך.
- **אם סומטרידקס לא הקלה עליך כלל:**
- ← פנה לרופא שלך או לרופך לקבלת ייעוץ.

צורת הנטילה

יש לבלווע את הקפליה בשלהמotaה עם מים.
אסור להחזות את הקפליה בשל היעדר קו ח齐ה. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה.

אם נטלת בטיעות מינון גבואה יותר

- **אל תיקח יותר משש קפליות של 50 מ"ג או שלוש קפליות של 100 מ"ג (300 מ"ג בסך הכל) ב-24 שעות.**
- נטילה של יותר מדי **סומטרידקס** יכולה לגרום לך לחЛОות. אם ללקחת יותר מ-300 מ"ג ב-24 שעות:
← פנה לרופא שלך או לרופך לקבלת ייעוץ.
- אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בלבד לצד מינון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל תרופה. **הרכב משקפיים** אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברופחת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסומטרידקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשיתמת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן. חלק מהתסמינים עלולים להיגרם על ידי המיגרנה עצמה.

תגובה אלרגית: פנה מיד לרופא לקבלת עזרה רפואי

תופעות הלואוי הבאות התרחשו אך שכיחותן המדוייקת אינה ידועה.

- **סימני האלרגיה כוללים פריחה, חרקת (פריחה מגרדת); צפצופים; עפיפותים, פנים או שפטים נפוחים; קרייסת מערכות מוחלטת.**

אם אתה חווית אחד מתסמינים אלה זמן קצר לאחר השימוש **בסומטרידקס**:

← אל תשתמש יותר בתרופה. פנה מיד לרופא.

תופעות לוואי נספנות

توفעות לוואי שכיחות (توفעות شمופיעות بـ 10-10% من المستخدمين متוך 100):

- כאב, כאדות, לחץ או מתח בחזה, בגרון או בחלקים אחרים בגוף, או תחושות לא רגילות, הכוללות חוסר תחושה, עקצוץ וחום או קור. توفעות אלה עלולות להיות עזות אך בדרך כלל חולפות במהירות.

אם توفעות אלה ממשיכות או מחריפות (במיוחד הכאב בחזה):

- ← פנה לקבלת עזרה רפואייה בדחיפות. במספר קטן מאוד של אנשים מסוימים אלה יכולים להיגרם בשל התקף לב.

תופעות לוואי שכיחות אחרות כוללות:

- בחילה או הקאה, אם כי זה עלול להיות עקב המיגרנה עצמה
- עייפות או נמנון
- סחרחות, תחושת חולשה או גלי חום
- עליה זמנית בלחץ הדם
- קוצר נשימה
- שרירים כאבים

توفעות לוואי נדירות מאוד (توفעות شمופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- שינויים בתפקוד הגוף. אם עלייך לערוך בדיקות דם לתקופדי כבד, ספר לרופא שלך שאתה לוקח סומטרידקן.

توفעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (توفעות שכיחותן טרם נקבעה):

- פרוכסיטים/התקפים, רעדות, התכווצות שרירים קצר-מושען/זמןית (שעלולה להשפיע על תנועת הלסת), קישון עורף
- הפרעות ראייה כגון הבוהוב, ירידת בראייה, ראייה כפולה, אובדן ראייה ובמקרים מסוימים אפילו ליקויים בלתי הפיכים בראייה (אם כי אלה עלולות להיות בגלל התקף המיגרנה עצמו)
- בעיות לב, בהן הדופק שלך עלול להיות מהיר יותר, איטי יותר או לשנות קצב, כאבים בחזה (תעוקת חזה) או התקף לב
- עור חיוור, בגין חלחול /או כאב באכזבות הידיים והרגליים, באוזניים, באף או בלסת שלך בתגובה לקור או למתח (تופעת ריננו)
- תחושת עילפון (לחץ הדם עלול לדנדת)
- כאב בצד השמאלי התחתון של הבطن ושלשול דמי (דלקת איסכמית של המעי הגס)
- שלשול
- אם הייתה לך לאחרונה פצעה או אם יש לך דלקת (כמו שיגרון או דלקת במעי הגס), יתכן שתחווה כאב או החמרה בכאוב באותו מקום הפצעה או הדלקת.
- כאב במפרקים
- תחושת חרדה
- קושי בבליעה
- הצעת יתר

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעlion, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב

טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov) המפנה לטופס המקיים לדיוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כר תמנוע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C .
- אין להשליך תרופה לביב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופה שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, acesulfame potassium, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

סומטרידק 50: קפליה לבנה עם הטבעה של "50" בצד אחד.

סומטרידק 100: קפליה לבנה עם הטבעה של "100" בצד אחד.

גודלי אrizה מאושרים: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 28, 30, 42, 48 קפליות. יתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.

נערך ביולי 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

סומטרידק 50: 00-30966-30-311

סומטרידק 100: 00-30967-31-311

לשם הפשתות ולהקלת הקיראה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת התרופה מיועדת לבני שני המינים.

צרן ובעל רישום: דקSEL בע"מ, רח' דקSEL 1, אור עקיבא 3060000, ישראל