

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

ספטל סקרב[®]
תמייסה לחיטוי
לשימוש חיצוני

הרכב
(Chlorhexidine Gluconate 4% w/v) 4% w/v

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".
קרה בעיון את **העלון עד סופו** בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת נסopia, פנה אל הרופא או אל הרווחח.
עליך להשתמש בתכשיר על פיה הוראות בסעיף הוראות השימוש עלון זה. היועץ ברוקח אם הנר' קוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

- שטיפת ידיים אנטיספטית
- חיטוי ידיים לפני ניתוח
- חיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח

קבוצה רפואיית: חומרים מחתאים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. במקרה ייחודי במטופלים עם היסטוריה של תגבות אלרגיות אפשריות הקשורות לכלהקסידין.
- אם קיים חשש מגע עם העיניים, האוזן התיכונה, המוח וקרום המוח (העור המכסה את המוח ועמוד השדרה).

اذירות מיעודות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אין להשתמש בחלי הגוף (לדוגמה אף או אוזניים).
- יש להשתמש בהירות ביולדים, במקרה שאין לו שណלו לפני הזמן. ספטל סקרב עלול לגרום לכויות כימיות בעור.
- הסר כל בד סופג, אריג או באגד לפני שימושו. אין להשתמש בكمויות מוגזמות ואין לאפשר לתמייסה להצבר בקפלי העור או מתחת למטופל או לטperfץ על הסדים או דבר אחר שנמצא בmagic' שיר עט המטופל. כאשר ישנו צורך לשימוש תחבושות על אזורים בעור שנחשפו לספטל סקרב, יש לנתקו בהירות על מנת להבטיח שום עודפי תמייסה לא נשארו בטרם חביית האיזור.
- אין לאפשר מגע עם העיניים בגין חשש לפגיעה בראיה. אם נגרם מגע עם העיניים - שטוף באופן מיידי וisoft עם מים. במקרה של גורו, אודם או כאב בעין, או הפרעה לראייה פנה לייעוץ רפואי באופן מיידי. מקרים חמורים של פצעה מתמשכת בקרנית (פצעה במשטח העין) שעלולה לדרש השתלת קרנית דוחה כאשר מוצרים דומיים באו בטיעות מגע עם העין במהלך פרוץחות כירורגיות, בחולים בהרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

תగובות בין-תרופתיות:
אם אתה לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

3. כיצד תשמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעוון נוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

שים לב
אין לבולו! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

הוראות השימוש:
אין למחול את התמייסה.

לשטיpit ידימ אנטיספטית:

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
2. הוסיף 5 מ"ל של ספטל סקרב לא מהול ורץ את הידיים במשך כדקה
3. שטוף היטב במים
4. יבש היטב את הידיים

לחיטוי ידימ לפני ניתוח:

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
2. הוסיף 5 מ"ל של ספטל סקרב לא מהול ורץ את הידיים במשך כדקה
3. נקה את החיפורים באמצעות מברשת
4. שטוף את הידיים במים
5. חזר על הפעולה פעמיים נוספת במשך 2 דקות
6. שטוף היטב במים
7. יבש היטב את הידיים

לחיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח:

1. שטוף את כל הגוף עם 25 מ"ל של ספטל סקרב, לפחות פעמיים, בדרך כלל פעמיים אחד ביום שלפני הניתוח ופעם שנייה ביום הניתוח.
2. שטוף היטב במים
3. יבש היטב את הגוף.

אין לעבור על המנה המומלצת

אם בטעות בלעת ספטל סקרב
אם בטעות בלעת ספטל סקרב, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרפופה אליו.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם שנהן נוטל תרפופה.** הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרפופה, השימוש בספטל סקרב עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אף אחת מהן.

לעתים נדירות כלורהקסידין עלול לגרום לריגישות יתר כולל שוק אנפילקטית (התנפחות של הגרון או השفتים ולחץ דם נמוך). תופעות לוואי נוספות שכיחותן אינה ידועה:
• תגובות אלרגיות (לדוגמה דלקת העור, גירוד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפה, גירוי בעור, שלפוחיות).
• פגעה בקרנית (פגיעה במשטח העין), ונזק קבוע לעיניים כולל ליקוי ראייה קבוע (בעקבות חסיפה מקרית של העיניים במהלך ניתוח ראש, פנים וצואר) בחולמים תחת הרדמה כללית (שינוי عمוקה ללא כאבים).
אם מתחרשת אחת מהתగובות האלה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לקבלת טיפול רפואי מיד.

תופעות לוואי בילדים:
כוויות כימיות (שכיחות לא ידועה).

אם הופיעו תופעות לוואי, אם אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעולון,
עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

יתן לדוחות על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לינק הקישור "דוחות על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי"
שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוחות על תופעות לוואי, או
על ידי כניסה לקישור:

5. <https://sideeffects.health.gov.il> איך לאחסן את התרפופה?

מנע הרעללה! תרפופה זו וכל תרפופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות
ועל ידי כרך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרפופה אחרי תאריך התפוגה (Date of exp.) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון
של אותו חודש.

יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
לאחר הפעילה הראשונה ניתן להשתמש במשך 2 חודשים, אך לא יותר מתקופת התוקף של התכשיר.

6. מידע נוסף

• נסוך על המרכיבים הפעילים בתרופה מכילה גם:

Pluronic PE 6800, ammonyx M, isopropanol, D-gluconolactone, herbacol 15.393/T(B), spectracol ponceau 4R, sodium hydroxide (for pH adjustment), Purified water.

• כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץיה:

נוזל צמיג, צולע עד מעט עכור בצבע אדום.
כל בקבוק מכיל 500 מ"ל תמיישה.

שם הייצן:

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת.ד 114 בניינה.

בעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ תל אביב.

נערך באוגוסט 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00.18.23618.08.043