

## עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ג - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

### **סטלהרָה<sup>TM</sup> 45 מ"ג וואל, תמייסה להזרקה**

### **סטלהרָה<sup>TM</sup> מזרק מוכן לשימוש, 45 מ"ג, תמייסה להזרקה**

### **סטלהרָה<sup>TM</sup> מזרק מוכן לשימוש, 90 מ"ג, תמייסה להזרקה**

#### **חומר פעיל וממותו:**

כל בקבוקון מכיל:

45 mg/0.5 ml ustekinumab (אוסטיקינומאב 45 מ"ג/0.5 מ"ל)

כל מזרק מוכן לשימוש 0.5 מ"ל מכיל:

ustekinumab 45 mg (אוסטיקינומאב 45 מ"ג)

כל מזרק מוכן לשימוש 1 מ"ל מכיל:

ustekinumab 90 mg (אוסטיקינומאב 90 מ"ג)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 " מידע נוספים".

**קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עلون זה מכיל מידע תמציתית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נסופות, פנה אל הרופא או אל הרווקח.**  
תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

##### **פסורייזיס רובדי**

סטלהרָה מיועדת לטיפול בפסורייזיס רובדי בדרגת חומרה בינונית עד חמורה במטופלים מבוגרים (בני 18 שנים ומעלה) שהטיפול בהם נכשל, שאינם יכולים לקבל טיפול או אינם יכולים לסייע טיפולים סיסטמיים אחרים כולל ציקלוספורין, מתוטרקסט או פסוראלן בשילוב UV (PUVA).

##### **פסורייזיס רובדי בילדים**

סטלהרָה מיועדת לטיפול בפסורייזיס רובדי בדרגת חומרה בינונית עד חמורה במטופלים ילדים ומתבגרים מגיל 6 שנים ומעלה שהטיפול בהם לא משפייע כראוי, או שאינם יכולים לסייע טיפולים סיסטמיים אחרים או טיפולים באור.

#### **דלקת מפרקים ספקטיבית (PsA)**

סטלהרָה, טיפול בודד או בשילוב עם מתוטרקסט, מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספקטיבית פעילה במטופלים מבוגרים, כאשר התגובה לטיפול קודם בתרופות שאינן ביולוגיות הנוגדות פעילות ריאומטית (DMARDs), לא הייתה מספקת.

#### **מחלת קrhohn**

סטלהרָה מיועדת לטיפול במטופלים מבוגרים החולים במחלת קrhohn פעילה בדרגה חמורה בינונית עד חמורה, שהטיפול בהם נכשל, שアイבדו תגובה או שאינם יכולים לסייע טיפול קונבנציונלי או טיפול בנוגדי TNF או שיש להם התווויות נגד רפואות לטיפולים אלה.

#### **קוליטיס כיבית**

סטלהרָה מיועדת לטיפול במטופלים מבוגרים החולים במחלת כוליטיס כיבית פעילה בדרגה חמורה בינונית עד חמורה, שהטיפול בהם נכשל, שאיבדו תגובה או שאינם יכולים לסייע

טיפול קוגניציונלי או ביולוגי או שיש להם התווית נגד רפואות לטיפוליים אלה.

**קבוצה רפואיית:** מעכבי אינטראלקינים סטלהר מכילה את החומר הפעיל אוסטakinומאב שהוא נוגדן מונוקלוני. נוגדים מונוקלוניים הינם חלבונים אשר מזהים ונקשרים באופן ספציפי לחלבונים מסוימים בגוף. סטלהר שיכת לקבוצת תרופות הנקראת "מדכאי המערכת החיסונית". דרך הפעולה של תרופות אלה היא על-ידי החלשת חלק מערכות החיסון.

## 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה המפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף".
- אתה סובל ממחלה זיהומית פעילה שהרופא שלך חושב שהיא חשובה. אם אין בטוח שהכתב מעלה רלוונטי לך, הייעץ ברופא או ברוקח לפני תחילת השימוש בסטלהר.

### اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

דבר עם הרופא טרם תחילת השימוש בסטלהר. הרופא ידוק את מצבך לפני כל טיפול. ספר לרופא על כל מחלת שיש לך לפני כל טיפול. כמו כן, אמרו לרופא אם הייתה לך אחרת ליד אדם שעשי להיות חוליה בשחפת. הרופא ידוק אותך ויבצע בדיקה לשחפת לפני תחילת הטיפול בסטלהר. אם הרופא יחשוב שהיןך בסיכון לשחפת, הוא עשוי לתת לך טיפול תרופתי.

### שים לב לתופעות לוואי חמורות

סטלהר עשויה לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל תגובות אלרגיות ודיזומים. עליך לשים לב לסימנים מסוימים של מחילות במהלך הטיפול עם סטלהר. ראה "תופעות לוואי חמורות" בסעיף 4 "תופעות לוואי" לרשימה מלאה של סימנים אלה.

### לפני הטיפול בסטלהר ספר לרופא:

- אם סבלת אי פעם מתגובה אלרגית לסטלהר. אם אין בטוח, שאל את הרופא.
- אם סבלת אי פעם מסוג סרטן כלשהו - זאת מאוחר שמדכאי מערכת חיסון כדוגמת סטלהר מחייבים חלק מערכת החיסון. הדבר עלול להגדיל את הסיכון לסרטן.
- אם טופלת בעבר בפסורי-אדים בתרופות ביולוגיות אחרות (תרופה המיצרת ממוקר ביולוגי וניתנת בדרך כלל בהזרקה), הסיכון לסרטן עשוי להיות גבוה יותר.
- אם אתה סובל או סבלת לאחרונה מזמן.
- אם יש לך שינויים בגושים או גושים חדשים באזורי הפסורי-אדים או על אזור של עור בריא.
- אם הייתה לך אי פעם אלרגיה לטלקס או לזריקת סטלהר: המזדקן לשימוש מכל גומי מסוג לטלקס, אשר עלול לגרום לאלרגית חמורה באנשים הרגישים לטלקס. ראה "תופעות לוואי חמורות" בסעיף 4 לתסמינים של תגובה אלרגית.
- אם היןך מקבל כל טיפול אחר לפסורי-אדים /או לדלקת מפרקים ספקטיבית, כגון טיפול מדכאי חיסון אחר או טיפול באור (פוטותרפייה, טיפול באור מסוג UV). טיפולים אלו עלולים גם להחליש חלק מערכת החיסון. טיפולים אלו בשילוב עם סטלהר לא נבדקו. למרות זאת, טיפול שכזה עלול להגבר את הסיכון למחלות הקשורות במערכת חיסונית מוחלשת.
- אם אתה מקבל או שקיבלת אי פעם דרישות לטיפול באלרגיה - לא ידוע אם סטלהר עלולה להשפיע עליך.
- אם גילך 65 שנים ומעלה - אתה עלול ללקות בזיהומים בסביבות גבוהה יותר.

אם אין בטוח אם אחד מהמצבים המתוארים מעלה חלים עליו, יש להיעזר ברופא לפני השימוש בסטלהר.

חלק מהמטופלים חוות תగובות דמויות זאבת, כולל זאבת בעור או תסמנות דמוית זאבת במהלך הטיפול באוסטיקינומאב. שוחח מיד עם הרופא שלא אם אתה חווה פריחה אדומה, מורתת וקשאית, לפחות עם גבול כהה יותר, באזורי בעור החשופים לשמש או עם כאבי פרקים.

#### **התהף לב ושבץ**

התהף לב ושבץ נצפו במחקר בחולים עם פסורייזיס שטופלו בסטלהר. הרופא שלא יבדוק באופן קבוע את גורמי הסיכון שלא למחלות לב ושבץ על מנת להבטיח שהם מטופלים נכון. פנה מיד לטיפול רפואי אם אתה מפתח כאבים בחזה, חולשה או תחושה חריפה הצד אחד של גוףך, צנחת פנים או הפרעות בדיור או בראייה.

#### **ילדים ומתבגרים**

סטלהר אינה מיועדת לטיפול בפסורייזיס ילדים מתחת לגיל 6 ובдельקת מפרקים ספחתית, במחלת קrhoן או בקוליטיס כיבית ילדים מתחת לגיל 18, כיוון שלא נבדקה בקבוצת גילים זו.

#### **אינטראקטיות/תגובה בין תרופות**

אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת **כולל תרופות ללא מרשם, תוספי תזונה וחיסונים**, ספר על כך לרופא או לרוקט. במיוחד אם לאחרונה קיבלת חיסון או שאתה עומד לקבל חיסון. אין לקבל חיסונים מסוימים (המקילים תרכיב ח'י) במהלך הטיפול בסטלהר. אם קיבלת סטלהר במהלך ההריון, ספר לרופא של תינוקך על הטיפול בסטלהר לפני שהתינוק מקבל חיסון כלשהו, כולל חיסונים חיים, כגון חיסון BCG (המשמש למניעת שחפת). חיסונים חיים אינם מומליצים לתינוק בששת החודשים הראשונים לאחר הלידה אם קיבלת סטלהר במהלך ההריון, אלא אם כן הרופא של תינוקך ממליץ אחרת.

#### **הירון והנקה**

- אם את בהריון, חושבת שאת עלולה להיות בהריון או מתכוננת להרות, הייעוץ עם הרופא המטפל לפני נטילת התרופה.
- לא נצפה סיכון גבוה יותר למומים מולדים בתינוקות שנחשפו לסטלהר ברחם. עם זאת, קיים ניסיון מוגבל בסטלהר לבנים בהריון. לכן, עדיף להימנע משימוש בסטלהר בהריון.
- אם הינך אישת בגיל הפוריות, עלייך להימנע מכינסה להריון באמצעות שימוש באמצעי מניעה מתאימים, במהלך הטיפול בסטלהר, ולפחות 15 שבועות לאחר הטיפול האחרון בסטלהר.
- סטלהר יכולה לעבור דרך השלה לעובר. אם קיבלת סטלהר במהלך ההריון, תינוקך עלול להיות בסיכון גבוה יותר ללקות בזיהום.
- חשוב שתספר לרופאים של תינוקך ולאנשי צוות רפואי אחרים אם קיבלת סטלהר במהלך ההריון לפני שהתינוק קיבל חיסון כלשהו. חיסונים חיים כגון חיסון BCG (המשמש למניעת שחפת) אינם מומליצים לתינוק בששת החודשים הראשונים לאחר הלידה אם קיבלת סטלהר במהלך ההריון, אלא אם כן הרופא של תינוקך ממליץ אחרת.
- אוסטיקינומאב, בכמויות קטנות מאד, עלול לעبور לחלב אם. ספר לרופא אם הינך מניקה או מתכוננת להנין. את ורופא צריכים להחליט אם תנייק או שתשתמשי בסטלהר. אין לעשות את שניהם יחד.

#### **היגיה ושימוש במכונות**

סטלהר אינה משפיעה או משפיעה במידה זניחה על יכולת הניגה והשימוש במכונות. Stelara PFS\_PVP\_PIL\_08\_2024

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

סטלהרा מיועדת לשימוש רפואי הוראות ופיקוח רופא המנוסה בטיפול במצבים להם סטלהרা מיועדת.

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.  
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.  
יש לדבר עם הרופא לגבי מועד מתן הזריקות ומועד הביקורת.  
המיןון, תדריות, משך הטיפול ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.  
המיןון המקובל בדרך כלל הוא:

#### **מבוגרים מעל גיל 18:**

##### **במחלת פסורייזיס או בדלקת מפרקים ספחתית**

• המנה ההתחלתית המומלצת היא 45 מ"ג סטלהרा. חולים שמשקלם מעל 100 קילוגרם (ק"ג) עשויים להתחילה במנה של 90 מ"ג במקום 45 מ"ג.

• לאחר קבלת המנה ההתחלתית, תינתן המנה השנייה כעבור 4 שבועות ובמשך כל 12 שבועות. המנות העוקבות בדרך כלל זהות למנה ההתחלתית.

##### **במחלת קרונה או בקוליטיס כיבית**

• במהלך הטיפול, המנה הראשונה, כ- 6 מ"ג/ק"ג, תינתן לך על-ידי הרופא המטפל באמצעות עירוי בווריד בזרוע (עירוי תור-ורידי). לאחר קבלת המנה ההתחלתית, תקבל את המנה הבאה של 90 מ"ג סטלהרा בזריקה תת עורית (מתחחת לעור) אחרי 8 שבועות, וכל 12 שבועות לאחר מכן.

• לאחר קבלת הזריקה התת עורית הראשונה, יתכן שחלק מהמטופלים יקבלו סטלהרा 90 מ"ג כל 8 שבועות. הרופא יחליט متى عليك לקבל את הזריקה הבאה.

#### **ילדים ומתבגרים בני 6 ומעלה במחלת פסורייזיס**

• הרופא יחשב את המנה המתאימה לך כולל כמות (נפח) סטלהרा שיש להזריק המכילה מנתן. המנה המתאימה תלויה במשקל גופך בעת המנתן.

• ניתן להשתמש בסטלהרा 45 מ"ג ויאל בילדים אשר צריכים לקבל פחות מהמנה המלאה של 45 מ"ג.

• אם משקלך פחות מ- 60 ק"ג, המנה המומלצת היא 0.75 מ"ג סטלהרा לכל ק"ג משקל גוף.

• אם משקלך בין 60 ל-100 ק"ג, המנה המומלצת היא 45 מ"ג סטלהרा.

• אם משקלך יותר מ- 100 ק"ג, המנה המומלצת היא 90 מ"ג סטלהרा.

• לאחר קבלת המנה הראשונה, תינתן המנה השנייה אחרי 4 שבועות ובמשך כל 12 שבועות.

##### **אין לעבר על המנה המומלצת.**

##### **כיצד סטלהרा ניתנת:**

• סטלהרा ניתנת בהזרקה מתחת לעור (תת עורית). בתחילת הטיפול, אחות או איש צוות רפואי יכולים להזריק את התרופה.

• עם זאת, אם תחליט עם רופאך כי הינך יכול להזריק סטלהרा באופן עצמי, יהיה عليك לעבור הדרכה כיצד להזריק את התרופה בעצמך.

• להוראות כיצד להזריק סטלהרा יש לעיין ב"הוראות שימוש" בסוף העלאן.  
היוועץ ברופא אם יש לך שאלות בנוגע להזרקה עצמית של התרופה.

#### **אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר:**

צורך קשר מייד עם הרופא או הרוקח. הבא איתך את האזינה החיצונית של התרופה אפילו

**אם היא ריקה.**

**אם שכחת ליטול את התרופה:**  
יש ליצור קשר עם הרופא או הרוקח אם שכחת להזריק מנה של סטלהר. אסור להזריק שתי  
מנות כדי לפצות על מנה שנשכחה.  
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:**  
אין זה מסוכן להפסיק טיפול בסטלהר. עם זאת, הפסקת הטיפול עלולה להביא לחזרת סימני  
המחלה. יש להיוועץ ברופא אם אתה מעוניין להפסיק את הטיפול.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב  
משקפיים אם הינך זקוק להם.  
אם יש לך שאלות נוספת נוספת לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.**

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בסטלהר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל  
תיבהל למקרא רשות תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהם.  
**תופעות לוואי חמורות -** חלק מהחולמים עלולים לסבול מטופעות לוואי חמורות הדורשות טיפול  
דחוף.

(X) **תגובה אלרגית -** ייתכן שיידרש טיפול דחוף. יש לדוח מיד לרופא או לפנות לחדר  
מיון לקבלת טיפול רפואי דחוף אם הבנתה באחד מהסימנים הבאים:  
תגובה אלרגית חמורה (אנפילקטיס) היא נדירה (rare) בחולמים המטופלים בסטלהר (עלולה  
להופיע بعد משתמש אחד מトー 1000 משתמשים). הסימנים כוללים:  
• קשיי נשימה או בליעה  
• לחץ דם נמוך שעלו לגרום לסתורות או תחשות סחרור  
• התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה או הגרון  
סימנים נפוצים (common) של תגובה אלרגית כוללים פריחה בעור וחרקת (היכולים להופיע  
بعد משתמש אחד מトー 100 משתמשים)

במקרים נדירים, תגובה אלרגית ריאטיבית ודלקת בריאות דוחו בחולמים המטופלים  
באוסטיקינומאב. ספר לרופא מיד אם החלו להתפתח תסמינים כגון שיעול, קוצר נשימה  
וחום.

אם הינך חווה תגובה אלרגית חריפה, ייתכן שהרופא יחליט כי אין יכול לשמש יותר  
בסטלהר.

(X) **זיהומיים -** ייתכן שיידרש טיפול דחוף. דוח לרופא מיד אם הינך מביח באחד  
מהסימנים הבאים:  
• זיהומיים של האף או הגרון והצטננות מופיעים לעתים שכיחות (common) (יכולים להופיע  
بعد משתמש אחד מトー 100 משתמשים)  
• זיהומיים בחזה, אינם שכיחים (uncommon) (יכולים להופיע بعد משתמש אחד מトー 100  
משתמשים)  
• דלקת ברקמה מתחת לעור (צלוליטיס), אינה שכיחה (uncommon) (יכולה להופיע بعد  
משתמש אחד מトー 100 משתמשים)  
• שלבקת חוגרת (shingles) (סוג של פריחה כואבת עם שלפוחיות), אינה שכיחה  
(uncommon) (יכולה להופיע بعد משתמש אחד מトー 100 משתמשים)

סטלהרָה עלולה להחליש את יכולת הגוף להילחם בזיהומיים. זיהומיים מסוימים עלולים להחמיר, ועשויים לכלול זיהומיים הנגרמים על-ידי וירוסים, פטריות, חיידקים (כולל שחפת), או טפילים, כולל זיהומיים המופיעים בעיקר אצל אנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת (זיהומיים אופורטוניסטיים). זיהומיים אופורטוניסטיים של המוח (דלקת מוח – אנטיפאליטיס, דלקת קרום המוח), הראות והעיניים דוחוו בחולים המטופלים באוטקינומאוב.

עליך לעקוב אחריו תסמינים של זיהום במהלך השימוש בסטלהרָה. התסמינים כוללים:

- חום, תסמיינים דמוּי שפעת, הצעת לילה, ירידת משקל
- תחושת עייפות או קוצר נשימה, שיעול שאינו עבר
- עור חם, אדום וכואב או פריחה כואבת עם שלפוחיות
- תחושת צריבה/שריפה בעת מתן שתן
- שלשול

הפרעות ראייה או אובדן ראייה

• כאב ראש, נוקשות צוארית, רגשות לאור, בחילה או בילבול יש לדוח לרופא מיד אם הinker מביח בתסמיני הזיהום הללו. אלו יכולים להיות תסמינים של זיהומיים כמו זיהום בchnerה, זיהום בעור, שלבקת חוגרת או זיהומיים אופורטוניסטיים אשר עלולים להיות להם סיבוכים חמורים. יש לדוח לרופא אם יש לך זיהום שלא עבר או שמשיר לחזור. הרופא יכול להחליט שאין יכול להשתמש בסטלהרָה עד אשר הזיהום יעבור. במקרה של רופא אם יש לך חתכים פתוחים או פצעים בעור, לאחר שהם עלולים להזדהם.

(X) **התkalpotot ha'uro - עלייה באדמוניות והתקלפות העור באזורי נרחבים בגוף, עלולות להיות תסמיינים לפסוריאזיס אריתרודרומה (erythrodermic psoriasis) או דלקת עור מסוג exfoliative dermatitis, שם מצבים עוריים חמורים. יש לדוח לרופא מיד אם הבנתה באחד מסימנים אלו.**

#### תופעות לוואי נוספות:

**10 תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שכיחות להופיע بعد משתמש אחד מתוך 10**

משתמשים:

- שלשלולים
- בחילה
- הקאות
- עייפות
- סחרחות
- כאב ראש
- גרד
- כאבי גב, כאבי שרירים או כאבי מפרקים
- כאב גרון
- אדמוניות וכאב באזורי מתן ההזרקה
- זיהום בסינוסים

**100 תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שכיחות להופיע بعد משתמש אחד מתוך 100 משתמשים:**

- זיהומי שיניים
- זיהום פטריטי בנרתיק
- דיכאון
- אף סתום או גודש באף
- דימום, חבורה, קשיות העור, נפיחות וגירוד/עקבוץ באזורי ההזרקה
- חולשה
- נפילה של העperf וחולשת שרירים מצד אחד של הפנים (שיתוך פנים, שיתוך על שם בל) -

לרוב תופעה זו זמנית

- שינוי בפסוריאזיס עם אדומותיות ושלפוחיות חדשות קטנות בצבע צהוב או לבן בעור, לעיתים מלווה בחום (pustular psoriasis)
- קילוף של העור (skin exfoliation)
- אקנה

#### **תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שכיחות להופיע בעד משתמש אחד מ��ור 1000 משתמשים:**

- אדומותיות וקילוף העור באזורי נרחבים בגוף, אשר עלולים להיות مجردים או כאבים (exfoliative dermatitis). תסמים דומים מתפתחים לעיתים כ שינוי טבעי בסוג תסמיין הפסוריאזיס (erythrodermic psoriasis).
- דלקת של כלי הדם הקטנים, אשר יכולה להוביל לפריחה בעור עם בליטות קטנות אדומות או סגולות, חום או כאב במפרקים (וסקוליטיס).

#### **תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) תופעות שכיחות להופיע בעד משתמש אחד מ��ור 10,000 משתמשים:**

- שלפוחיות בעור שעוללות להיות אדומות, مجردות וכואבות (בולוס פמפיקואיד - bullous pemphigoid)
- צابت בעור או תסמונת דמוית צابت (פריחה אדומה, מורמת וקשאית, באזורי החשופים לשמש, יתכן עם כאבי פרקים).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מטופעות הלואה חמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il))  
המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:  
<https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנع הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.  
אין להשתמש בתרופה:
  - אחרי תאריך הת滂גה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך הת滂גה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
  - אם הנוזל שינה צבע, עכור או ניתן לראות חלקיקים זרים צפים בו (ראה סעיף 6 "מידע נוספת").
  - אם אתה יודע או חשב שייתכן שהתרופה נחשפה לטמפרטורות קיצוניתות (כמו הקפאה או חימום בטיעות).
  - אם התכשיר עבר נייר גיר נמרץ.
  - אם מכסה הויאל (בקבוקון) שבור.

#### **תנאי אחסון:**

- יש לאחסן בקירור (2°C-8°C), אין להקפיא. לשימוש חד פעמי.

- יש לאחסן באזינה המקורית על מנת להגן מפני הרדיפה.
- אם יש צורך, ניתן גם לאחסן מזרק בודד של סטלהרה בטמפרטורת החדר עד  $30^{\circ}\text{C}$ , לתקופה של עד 30 יום לכל היותר, באזינה הקרטון המקורי כדי להגן מפני הרדיפה. יש לרשום את התאריך שבו המזרק הוצא לשימושו לראשונה מהAKER במקום המזוקן לכך על גבי האזינה החיצונית. תאריך ההשלכה לפחות המזוקן לא יכול להיות מאוחר יותר מאשר תאריך התפוגה המוטבע על גבי הקרטון. אם המזרק אוחסן בטמפרטורת החדר ( $30^{\circ}\text{C}$ ), אין להחזירו לAKER.
- יש להשליך את המזרק לפחות המזוקן לא נעשה בו שימוש במשך 30 ימי אחסון בטמפרטורת החדר או לאחר תאריך התפוגה המקורי, המוקדם מבין השניים.
- אין לנער את סטלהר. ניעור ממושך ונמשך עלול לגרום נזק לתרפופה.

סטלהר מיועדת לשימוש חד פעמי בלבד. כל תרפופה שנשארת במזרק או ביאל, יש לזרוק. אין להשליך תרפופות למי השפכים או לפחות האשפה הביתי. היועץ ברוקח כיצד להשליך תרפופות שאין בהן צורך. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

## 6. מידע נוספת

### נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, L-histidine, polysorbate 80, water for injection.

**כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:**

נוול להזרקה צלול עד מבריק במקצת (ברק פנינה) וחסר צבע עד גוון צהבהב במקצת. הנוזל עשוי להכיל מספר חלבניים קטנים של חלבון, שkopfim למחצה או לבנים. כל קופסה מכילה מזרק אחד מזוקן לשימוש/בקבוקן אחד.

**גודלי אזינה:**

- 1 לייל (בקבוקן) המכיל 45 מ"ג/0.5 מ"ל אוסטיקינומאב
- 1 מזרק מזוקן לשימוש המכיל 45 מ"ג/0.5 מ"ל אוסטיקינומאב
- 1 מזרק מזוקן לשימוש המכיל 90 מ"ג/1 מ"ל אוסטיקינומאב

**יצרן:** סילג AG, הווסטראסה 201, CH-8200, שפהאוזן, שוויץ

**בעל הרישום:** ג'י-ס' הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

### מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

סטלהר 45 מ"ג לייל: 142 36 32021

סטלהר מזרק מזוקן לשימוש: 146 81 33291


לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך באוגוסט 2024.  
מבוסס על עלון מדינת יהוס EU מיוני 2024.

### הוראות שימוש במזרק מזוקן לשימוש של סטלהר (להלן "מזרק"):

בתחילת הטיפול, תקבל סיוע מהצוות הרפואי בזריקה הראשונה. עם זאת, אם תחליט עם רופאך כי ניתן להזריק סטלהר באופן עצמאי, תעביר הדרכה כיצד להזריק את התרופה בעצמך. היועץ רפואי, אם יש לך שאלות בנוגע להזרקה עצמאית.

- אין לערबב את סטלהרा עם נזלים אחרים להזרקה.
  - אין לנער את מזרק סטלהרा. ניעור חזק וממושך עלול לפגום בתטרופה. אם התטרופה עברה ניעור חזק, אל תשתמש בה.
  - מזרק סטלהרा אינו מכיל משמרים ולכן אין לעשות שימוש בשאריות תמייסה שנשארו במזרק לאחר ההזרקה. מזרק סטלהרा הינו תכשיר סטרילי לשימוש חד פעמי.
- תמונה 1** מדמה איך נראה המזרק.



**תמונה 1**

### 1. בדוק את מספר המזרקים והכן את החומרים הנדרשים:

- הכנת המזרק לשימוש
- הוציא את המזרק מהמקרר. הנח למזרק לעמוד מחוץ לקופסה למשך חצי שעה, על מנת שהנווד שבתוכו ייגע לטמפרטורת החדר. אל תסיר את מכסה מהזרק בזמן שהוא מאפשר הגעה לטמפרטורת החדר.
  - אחוץ בגוף המזרק המוקן לשימוש כאשר המכוסה פונה כלפי מעלה.
  - אל תיגע בראש הבוכנה, בוכנה, בכנפי מגן המסת או במכסה המסת.
  - אל תמשוך את הבוכנה לאחר בשום אופן.
  - אל תיגע בלשוניות הפעלת מגן המסת (מוסומות בכוכיבות בתמונה 1) כדי למנוע CISIO המכוסה בטרם עת על-ידי מגן המסת.

בדוק את המזרק כדי לוודא:

- שמספר המזרקים וחוזקם נכון:

  - אם עלייר להזריק 45 מ"ג השתמש במזרק סטלהרा אחד בן 45 מ"ג.
  - אם עלייר להזריק 90 מ"ג יתacen שתשתמש במזרק מוקן לשימוש אחד של סטלהרा 90 מ"ג או שתשתמש בשני מזרקי סטלהרা בני 45 מ"ג כל אחד. במקרה השני יהיה עלייר להזריק לעצמו 2 זריקות. בחר 2 מקומות שונים בגוף (לדוגמה זריקה אחת בירך ימין והשנייה בירך שמאל) והזרק את הזריקות אחת אחרי השנייה.
  - שהתרופה נכונה.
  - שתאריך התפוגה לא חלף.
  - שהמזרק אינו פגום.

- שהתמייסה שבמזרק צולולה עד מבриיקה במקצת (ברק פנינה) וחסרת צבע עד גוון צהבהב בהיר ועלולה להכיל חלקיקים בודדים קטנים شكופים למראה או לבנים של חלבון, דבר שאינו יוצא דופן בתמייסות המכילות חלבון.
- שהתמייסה שבמזרק לא שינתה צבעה או עכורה או מכילה חלקיקים זרים.
- שהתמייסה שבמזרק אינה קופואה.
- שהכין מראש את כל הציוד הדרוש ולהניח על משטח נקי. ציוד זה כולל מגבון אנטיספטיק, כדור צמר גפן או פד גaza ומכל איסוף המועד לחמצים חדפים, יש להזכיר מריאש את כל הציוד הדרוש ולהניח על משטח נקי. ציוד זה כולל מגבון אנטיספטיק,

- 2. בחירה והכנת האזרור המועד להזרקה:**  
בחר את האזרור המועד להזרקה (תמונה 2):
- סטלהר ניתנת בהזרקה תת עורית.
  - אזרורים טובים להזרקה הם החלק העליון של הירך ומסביב לבטן, במרחק של לפחות חמישה סנטימטרים מהטבור.
  - הימנע ככל האפשר מהזרקה בעור נגוע בפსוריАЗיס.
  - אם אתה מקבל את הזרקה מיידי איש צוות רפואי או מטפל, הוא עשוי לבחור גם בחלק העליון של הזրע.



האזוריםocab פור מומלצים להזרקה


### תמונה 2

**הכן את האזרור המועד להזרקה:**

- שטוף ידיך בייסודיות באמצעות סבון ומים חמים.
- נגב את האזרור המועד להזרקה באמצעות מגבן אנטיספטין.
- אל תיגע באזור זה שוב לפני מתן הזרקה.

### 3. הסר את מכסה המחת (תמונה 3):

- אין להסיר את מכסה המחת לפני שהינך מוכן להזריק את המנה.
- הרם את המזרק המוכן לשימוש, אחוז בגוף המזרק ביד אחת.
- משור את מכסה המחת החוצה והשלך את המכסה. אל תיגע בובונת כאשר אתה עושה זאת.




### תמונה 3

- אתה עשוי להבחין בבעות אויר בתוך המזרק או בטיפת נוזל בקצה המחת - שניהם מצבים תקינים ואין צורך להסיר אותם.
- אל תיגע במחת ואיל תאפשר מגע שלה בשום משתח.
- אל תשתמש במזרק אם הוא נפל ומכסה המחת לא היה במקומו. במקרה זה עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח.
- יש להזריק את התרפופה מייד לאחר הסרת מכסה המחת.


**4. הזרק את המנה:**

- אחוז את המזרק ביד אחת בין האמה לאצבע והנח את האגודל על ראש הבוכנה. השתמש ביד השנייה כדי לצבוט קלות את העור הנקי בין האגודל לאצבע המורה. אל תמחץ את העור בחזקה.
- אל תמשוך לאחר את הבוכנה בשום מצב.
- החדר את מחת המזרק כל הנitin לתוך קפל העור שנוצר בתנועה אחת מהירה (תמונה 4).




**תמונה 4**

- הזרק את כל התרופה באמצעות לחיצה על הבוכנה עד שראש הבוכנה נמצא לחלוtin בין כנפי מגן המחת (תמונה 5).




**תמונה 5**

- לאחר שהבוכנה נלחצה ככל שניתן, המשך ללחוץ על ראש הבוכנה, הוציא את המחת ושחרר את העור (תמונה 6).



**תמונה 6**

- הסר לאט את האגודל מרأس הבוכנה כדי שהמזרק הריק יעלה עד שלם המחת מכוסה במגן המחת (תמונה 7).



**תמונה 7**


## 5. לאחר ההזרקה:

- הנחת מגבון אנטיספטטי על אזור ההזרקה ולחץ למשר מספר שניות.
- יתכן שתבחן בכמות מזערית של דם או נוזל באזור ההזרקה, מצב זה הינו נורמלי.
- אתה יכול להניח צמר גפן או פד גזה על אזור ההזרקה ולהחזיקו שם למשך עשר שניות.
- אל תשפשף את אזור ההזרקה. אם יש צורך, הדבק אגד מדבק על האזור.

## 6. השמדה:

מזרקים ומוחטים משומשים יש להשילר לתוך מכל המועד לחפצים חדים. למען ביטחוןך ובראיותך וביתחונם של الآخرين, **אסור בתכלית האיסור** לבצע שימוש חוזר במוחטים ובמזרקים.

בקבוקונים ריקים, מגבונים אנטיספטיים וכיוד אחר ניתן להשילר לאשפה. השילר את המזרק הריק לתוך מכל המועד לחפצים חדים (תמונה 8).



תמונה 8

## הוראות שימוש להזרקת סטלהר מבקבוקון:

בתחילת הטיפול, תקבל סיוע מהצוות הרפואי בזירה הראשונה. עם זאת, אם תחליט עם חופאר כי הינך יכול להזריק סטלהר באופן עצמי, תעבור הדרכה כיצד להזריק את התוropaה בעצמך. היועץ רפואי, אם יש לך שאלות בנוגע להזרקה עצמית.

- אין לערבע את סטלהר עם נזלים אחרים להזרקה.
- אין לנער את בקבוקון סטלהר. ניעור חזק עלול לפגום בתוropaה. אם התוropaה עברה ניעור חזק, אל תשתמש בה.
- בקבוקון סטלהר אין מיל משמרים ולכן אין לעשות שימוש בשאריות תמישה שנשארו בקבוקון לאחר ההזרקה. בקבוקון סטלהר הינו תכשיר סטילי לשימוש חד פעמי.

### 1. בדוק את מספר הבקבוקונים והן את החומרה הנדרשים:

הוצא את הבקבוקון מהמקרר. הנח לבקבוקון לעמוד בטמפרטורת החדר למשך כחצי שעה, על מנת שהנוול שבתוכו יגיע לטמפרטורה נוחה להזרקה (טמפרטורת החדר).

בדוק את הבקבוקון/נים כדי לוודא:


- מספר הבקבוקונים וחזקם נכון:
  - אם עלייך להזריק 45 מ"ג או פחות השתמש בקבוקון סטלהר אחד בן 45 מ"ג.
  - אם עלייך להזריק 90 מ"ג השתמש בשני בקבוקוני סטלהר בני 45 מ"ג כל אחד. יהיה עלייך להזריק לפחות 2 זריקות. בחר 2 מקומות שונים בגוף (לדוגמה זריקה אחת בירך ימין והשנייה בירך שמאל) והזרק את הזירות אחת אחרי השנייה. השתמש במוחט ומזרק חדשים לכל זריקה.
- שהתרופה נכונה.

- שתאריך התטוגה לא חלף.
  - שהבקבוקן אינו פגום והמכסה אינו שבור.
  - שהתמייסה שבבקבוקן צוללה עד מבריקה במקצת (ברק פניה) וחסרת צבע עד גוון צהבהב בהיר ועולה להכיל חלקיקים בודדים קטנים שקופים למראה או לבנים של חלבון, דבר שאינו יצא דופן בתמייסות המכילות חלבון.
  - שהתמייסה לא שינתה צבעה או עכורה או מכילה חלקיקים זרים.
  - שהתמייסה אינה קפואה.
- ילדים השוקלים פחות מ- 60 ק"ג צריכים מנה קטנה מ- 45 מ"ג. וזאת שאתה יודע את הכמות המתאימה (הנפח) שעלייך לשאוב מהבקבוקן וסוג המזרק החדש לך. אם איןך יודע מה הכמות המתאימה וסוג המזרק החדש, פנה לאחות, לרופא או לרוקח.
- יש להזכיר מראש את כל הצורך הדרוש ולהניח על משטח נקי. ציוד זה כולל מזרק 1 מ"ל, מחט, מגבונים אנטיספטיים, כדור צמר גפן או פד גזזה ומכל איסוף המיועד לחפצים חדשים עבור המזרק (תמונה 1).



**תמונה 1**

- 2. בחירה והכנת האזרור המועד להזרקה:**  
בחר את האזרור המועד להזרקה (תמונה 2):
- סטלהר ניתנת בהזרקה תת עורית.
  - אזרורים טובים להזרקה הם החלק העליון של הירך ומסביב לבטן, למרחק של לפחות חמישה סנטימטרים מהטבור.
  - הימנע ככל האפשר מהזרקה בעור נגוע בפסוריАЗיס.
  - אם אתה מקבל את הזרקה מיד איש צוות רפואי או מטפל, הוא עשוי לבחור גם בחלק העליון של הזרוע.



האזורים המודגשיםocab פור מומלצים להזרקה  
**תמונה 2**

**הן את האזרור המועד להזרקה:**

- שטוף ידיים בסודיות באמצעות סבון ומים חמים.
- נגב את האזרור המועד להזרקה באמצעות מגבן אנטיספטיק.
- אל תיגע באזרור זה שוב לפני מתן הזרקה.

**3. הכנת המנה להזרקה:**  
הסר את מכסה הבקבוקון (תמונה 3).



**תמונה 3**

- אל תסיר את מעצור הגוף.
- נקה את מעצור הגוף באמצעות מגבן אנטיספטיק.
- הניח את הבקבוקון על משטח ישר.
- אחוז במזרק והסר את מכסה המחת של המזרק.
- אין לגעת במחת או לאפשר למחת לגעת בדבר.
- החדר את מחת המזרק אל תוך הבקבוקון דרך מעצור הגוף.
- הפוך את הבקבוקון והמזרק הנעוץ בו כך ראש הבקבוקון יפנה כלפי מטה.
- משוך את בוכנת המזרק ומלא את המזרק בכמות הנוזל שרשם לך הרופא.
- יש לוודא שהמחת מציה תמייד בתוך הנוזל שבבקבוקון על מנת למנוע יצירת בועות אויר בתוך המזרק (תמונה 4).



**תמונה 4**

- הוציא את המחת מהבקבוקון.
- אחוז במזרק כשהמחת פונה כלפי מעלה ובודק אם קיימות בועות אויר בתוך המזרק.

- אם יש בועות אויר, טפח קלות על גוף המזרק עד שכל בועות האויר ינועו כלפי מעלה (תמונה 5).



**תמונה 5**

- לחץ על בוכנת המזרק עד שכל האויר (אך לא הנוזל) יצא.
- אל תניח את המזרק ואל תאפשר למחת לגעת בדבר.

#### 4. הזרקת התרופה:

- צבוט קלות את העור הנקי באמצעות האגולול והאצבע המורה. אל תמחץ את העור בחזקה.
- החדר את מחת המזרק לתוך קפל העור שנוצר.
- לחץ על בוכנת המזרק באמצעות האגולול לאט ובאופן אחיד, תוך כדי שמירה בעדינות על קפל העור, פנימה ככל האפשר, על מנת להזריק את כל תכולת המזרק.
- לאחר שלחצת על בוכנת המזרק עד הסוף הוציא את המחת ושחרר את קפל העור.

#### 5. לאחר ההזרקה:

- הנה מגבון אנטיספטטי על האזור המזרק ולחץ למשר מספר שנויות.
- יתכן שתבחן בכמות מצערית של דם או נוזל באזור ההזרקה, מצב זה הינו נורמלי.
- אתה יכול להניח צמר גפן או פד גזה על האזור ההזרקה ולהחזיקו כר למשך עשר שנויות.
- אל תשפשף את אזור ההזרקה. אם יש צורך, הדבק אגד מדבק על האזור.

#### 6. השמדה:

- מזרקים ומחותים משומשים יש להשליך לתוך מכל המיועד לחפצים חדים. למען ביטחון ובריאותך וביטחונם של الآخرين, **אסור בתכלית האיסור** לבצע שימוש חוזר במחותים ומזרקים.
- בקבוקונים ריקים, מגבונים אנטיספטיים וכיוד אחר ניתן להשליך לאשפה.