

سوتيكتو 6 ملغ  
أقراص مطليّة

المادة الفعالة وكيفيتها:

يحتوي كل قرص مطلي على 6 ملغ ديوكرافسيتنيب (deucravacitinib) مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر. انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فنوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء وصف للعلاج من أجلك. لا تعطه لآخرين. لأنّه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

يُستطب بـ سوتيلكتو لعلاج الصدفية اللويحية (psoriasis) (plaque psoriasis) المتوسطة حتى الشديدة، لدى البالغين المرشحين للعلاج الجهازي.

المجموعة العلاجية: مثبطات جهاز المناعة

يحتوي سوتيلكتو على المادة الفعالة ديوكرافسيتنيب، التي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات التيروزين كيناز 2 (TYK2)، والتي تساعده على تقليل الالتهاب المرتبط بالصدفية (psoriasis).

الصدفية اللويحية هي حالة التهابية تؤثر على الجلد ويمكن أن تسبب بقع حمراء، حرشفيّة، سميكّة، مثيرة للحكّة ومؤلمة على الجلد وتؤثر أيضًا على فروة الرأس والأظافر، راحتي اليدين والقدمين.

كيف يعمل سوتيلكتو

يُحجب سوتيلكتو بشكل انتقائي نشاط الإنزيم المسمى TYK2 والذي يشارك في العملية الالتهابية. بواسطة الحد من نشاط هذا الإنزيم، سوتيلكتو يمكن أن يساعد في السيطرة على الالتهاب المرتبط بالصدفية اللويحية وبالتالي يقلل من العلامات (جلد جاف، متشقّق، مع قشرة، متساقط أو منتشر، أحمر ونارّ) ولذلك يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض مثل الحكة، الألم، الشعور بحرقان، وخز وشعور بشد في الجلد.

أظهر سوتيلكتو أيضًا تحسناً في جودة حياة المتعالجين المصابين بالصدفية. وهذا يعني أن حالة المرض يجب أن يكون لها تأثير أقل على الأنشطة اليومية للمتعالج، العلاقات بين الأشخاص والعوامل الأخرى وذلك مقارنة بالتأثير في الماضي.

2. قبل استعمال الدواء  
يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) لـ ديوكرافسيتنيب أو لأحد المرکبات الأخرى التي يحتويها الدواء (كما هو مفصل في الفصل 6).
- إذا كنت تعاني من عدوى يعتقد الطبيب أنها ذات أهمية، بما في ذلك مرض سل نشط ((tuberculosis (TB)).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء  
قبل العلاج بـ سوتيلكتو، أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا:

- وجدت لديك عدوى لا تزول أو تتكسر
- يوجد لديك أو كان لديك مرض السل ((TB))
- كان لديك سرطان، وذلك لأنّ الطبيب سيحتاج أن يقرر ما إذا كان لا يزال بالإمكان إعطاؤك سوتيلكتو

• يوجد لديك مشاكل في القلب أو حالة طيبة تزيد من احتمال تطور مرض قلبي - ليس من الواضح ما إذا كان سوتيلكتو يزيد من خطر الإصابة بمرض قلبي. كنت مصاباً أو معرضاً لخطر الإصابة بخثرات دموية في أوردة الرجلين (خثار الأوردة العميق) أو في الرئتين (انصمام رئوي). أخبر الطبيب إذا يوجد لديك انتفاخ مؤلم في الرجل، ألم في الصدر أو صرقة في التنفس لأن هذه يمكن أن تكون علامات لحدث خثرات دموية في الأوردة. ليس واضحاً ما إذا كان سوتيلكتو يزيد من خطر الإصابة بخثرات دموية

- تلقيت لقاً مؤخراً أو تخطّط لتقاي لقاح

الأطفال والمراهقون

سوتيكتو غير معد للأطفال والمراهقين تحت عمر 18 سنة. لا توجد معلومات بالنسبة لسلامة ونجاعة استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا، أو من شائق أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إذا تلقيت لقاً مؤخراً أو تخطّط لتقاي لقاح أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا يفترض أن تلتقي لقاً من نوع معين (لقاحات حية) عندما تستعمل سوتيلكتو.

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول القرص مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع

الحمل:

إذا كنت حاملاً أو تعتدين أنك قد تكوني حاملاً أو تخططين لتحمل، استشيري الطبيب قبل تناول هذا الدواء. وذلك لأنّه من غير المعروف فيما إذا كان سوتيلكتو يؤثّر على الجنين.

الإرضاع:

من غير المعروف ما إذا كان سوتيلكتو يطرح في حليب الأم، وبالتالي لا يمكن استبعاد وجود خطر على الرضيع أو الطفل الصغير الذي يرضع. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، استشيري الطبيب فيما إذا كان عليك التوقف عن الإرضاع أو الامتناع عن تناول العلاج.

السيادة واستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثّر سوتيلكتو على القرة على السيادة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء

يحتوي سوتيلكتو على الالكتوز

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي سوتيلكتو على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم لكل قرص، أي أنه عملياً "خلٌ من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الحصول مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة وطريقة العلاج سيحدّدهما الطبيب، فقط. الجرعة المُتبعة، عادة، هي قرص واحد (6 ملغ) كل يوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

• يجب ابتلاع القرص بشكله الكامل

• يمكن تناول القرص مع أو بدون طعام

• يُمنع سحق، شطر أو مضاع الأقراص

مدة العلاج

سوف يقرّر الطبيب المدة الزمنية لاستعمال سوتيلكتو.

إذا لم تتحسن حالتك بعد 6 أشهر من العلاج، تحدث مع الطبيب.

إذا تلقيت عن طريق الخطأ جرعة أعلى من سوتيلكتو، أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

من الجائز أن تعايش بعض الأعراض الجانبية المفصّلة في البند 4.

إذا نسيت تناول سوتيلكتو، يجب تناول الجرعة الاعتيادية في اليوم. يُمنع تناول جرعة مضاعفة للتتويّض عن الجرعة المناسبة.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على تلك الصحية، يمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

#### إذا توقف عن تناول سوتيكتو

يُمنع التوقف عن تناول سوتيكتو دون التحدث أولاً مع الطبيب. إذا تم إيقاف العلاج، قد تعود أعراض الصدفية.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال سوتيكتو أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدبر عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل أن تعاني من أيٍ منها.

**أعراض جانبية شائعة جداً - (very common)** أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- حالات عدوى في الطرق التنفسية العلوية (أنف وحنجرة) مع أعراض مثل آلم الحنجرة وأحتقان الأنف

**أعراض جانبية شائعة - (common)** أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

- عدوى فيروسية في الفم (مثل قروح البرد)
- ارتفاع في مستوى إنزيم في الدم يسمى فوسفوكيناز الكرياتين (CPK)
- تقرحات في الفم
- طفح جلدي يشبه حب الشباب
- التهاب جريبات الشعر

**أعراض جانبية غير شائعة - (uncommon)** أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- القوباء المنطقية (الهربس النطقي)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترنت للت bliغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يخزن الدواء؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهذا تجنب التسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على الشرط وعبوة الكرتون. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### شروط التخزين

- يُمنع التخزين في درجة حرارة تزيد عن 30°C.

يُمنع استعمال الدواء إذا لاحظت ضرراً في الأقراص أو علامات فتح للعبوة. يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. أسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.