

יולי 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: עדכון עלון לרופא ולצרכן
ALCOHOL 70% FLORIS

אנו מבקשים להודיעכם כי העلون לצרכן של התכשיר שבנדון עודכן. עדכון העلون כולל חמרות. בנוסף, ישם עלון חדש לרופא.

צורת התכשיר:

Solution

ההתווויות המאושרות:

Antiseptic

הרכב וחוזק חומר פועל:

Alcohol

70% V/V

בפירוט שלහן מובא המידע בו בוצעו שינויים מהותיים בלבד.
תוספת טקסט או טקסט בעל שינוימשמעות מסומן בצלע. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.
העדכנים בעלון לצרכן נעשו בסעיפים הבאים:

אין לשימוש בתרופה:

X אין לשימוש בתרופה:

- אם אתה רגיס (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרישימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוספת".
- במגע עם העיניים, המוח, קרומי הגוף, באוזן התיכונה או באוזן החיצונית כאשר עור התוף מוחור.
- בザקנה.
- בפתחי הגוף (לדוגמה: אף, אוזניים).

אזורות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם התרופה ניתנת בעוטה באינפוזיה - ייתכן שעירוי דם יהיה הכרחי כדי לנטרל את ההמוליזה.
- יש להמניע מגעה עם העור.
- במקרה של מגע, יש לשטוף עם הרגה מים.
- אם הנק רגיס למזון כלשהו או לתרופה כלשהו, עליך לרופא לפניו נטילת התרופה.
- אין לקרב את המוצר למקורות חום או אש



- **אלכוהול הינו חומר דליק. אין להדליק סיגירה או להיחשף לאש עד ליבוש מוחלט של התכשיר.**

אינטרקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לוקח לך אחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כן לרופא או לרוקח.

מידע חשוב על כלך מהמרכיבים של התרופה מכל אלכוהול חומר דליק

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח **בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה.**

אין לעבר על המנה המומלצת.

צורת הנטילה:

אין לבולען!

התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

יש להמנע מגע עם העיניים ועם רקמות ריריות. במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים ולפנות לרופא מיידית הצורך.

מינון: המינון המקובל בדרך כלל הוא עפ"י הצורך.

אופן השימוש:

יש לנגב את האזור המועד לחיטוי **בצמר גפן ספג באלכוהול -**בכל פעם שנדרש. יש לפזר את התמייסח על כל משטח השער ולהזכיר את הדיסס עד להתקפות מוחלטות של התמייסחה.****

אין לעבר על המנה המומלצת.

אין לבולען!

התרופה משועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

{..}



5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה!
- תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי בך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:**

 - אחסון במקום קרייר, בטמפרטורה הנמוכה מ- -25°C .
 - סגור היטב.
 - זהירות! חומר דליק, **הרכק שומר בפני אש**.
 - **אחסן באירועה המקורית.**

- לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש בתרופה עד תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

6. ניתן להשתמש במכשיר לאחר הפתיחה, עד שפג תוקפן?

מידע נוספת:

נוספַּח על החומרים הפעילים בתרופה מכילה גם:

Purified water

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

נוול צלול ללא צבע.

תכולה: 100 מ"ל, 200 מ"ל, 1000 מ"ל.

ויתכן שלא כל גודלי האריזה משווים.

{..}

העלונים המעודכנים נשלחו לפרוטום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות [il](http://www.health.gov.il). ניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לחברת בן- שמעון פלורייש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ב. משגב 2017400, ישראל- 800-336-636

בברכה,
מיהה ספקטור
רוקחת ממונה
בן- שמעון פלורייש בע"מ

