

دوبيكست 300 ملخ

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للإستعمال

المادة الفعالة:

لا يجوز إستعمال الدواء:
إذا كنت حساساً (أميرجي) لـ دوبيلوماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء
(انظر الفقرة 6).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة تحضير وحقن دوبيكست وكيفية تخزين الدواء بشكل صحيح وكذلك حول أعراض جديدة المستعلمة.

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة تحضير العلاج بالمستحضر.

يعطي دوبيكست بالحقن تحت الجلد (حقنة تحت الجلد).

إذا قرر كل من الطبيب أو الممرضة خاصتك بأنك أنت أو المعالج الخاص بك يمكنك إعطاء حقنة دوبيكست، فسوف يتوجب عليك أو على المعالج الخاص بك تلقي إرشاد حول الطريقة الصحيحة لتحضير وإجراء الحقن.

لا تحاول حقن دوبيكست قبل تلقيك إرشاد من الطبيب أو الممرضة.

دوبيكست غير مخصص لعلاج إلتهاب الجلد التأسي لـ الأطفال دون عمر 6 أشهر.

دوبيكست غير مخصص لعلاج الربو لدى الأطفال دون عمر 6 سنوات.

دوبيكست غير مخصص لعلاج التهاب مزمن في الجيوب الأنفية يتراافق بسلاسل الأنفية لدى أطفال و Maherineen دون عمر 18 سنة.

علاج إلتهاب الجلد التأسي بدرجة خطورة متوسطة حتى شديدة، لدى الكبار والأطفال من عمر 6 أشهر وما فوق، عندما لا يتم ضبط المرض بشكل معالجين يزنون أقل من 40 كيلو.

دوبيكست غير مخصص لعلاج الحفاظ العقدي لدى الأطفال والراهقين دون عمر 18 سنة.

يمكن إستعمال دوبيكست مع أو بدون كورتيكosteroides للعلاج الموضعي.

علاج داعم للربو بدرجة خطورة متوسطة حتى شديدة، لدى الكبار والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق، بمشاركة أدوية بدون وصفة طبية لعلاج الربو لدى

متالجين يزنون أقل من 40 كيلو.

دوبيكست قد يساعد في خفض المرض بشكل ملحوظ.

دوبيكست غير مخصص لعلاج الحفاظ العقدي لدى الأطفال والراهقين دون عمر 18 سنة.

التدابير/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام تلقي دوبيكست من ذلك، بالأشخاص إذا:

كانت تتناول أدوية كورتيكosteroides عن طريق البول، بالإستعمال الموضعي أو بالإستنشاق.

وُجد لديك ربو و كنت تتناول أدوية لعلاج الربو.

الجيوب الأنفية يتراافق بسلاسل الأنفية، إلتهاب المريء اليوزيني أو الحفاظ العقدي وأيضاً ربو.

لا يستعمل دوبيكست عن تناول الكورتيكosteroides خاصتك، بدون إستشارة الطبيب.

يستعمل دوبيكست 300 ملخ بمشاركة أدوية إضافية لعلاج إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية يتراافق بسلاسل الأنفية لدى كبار مرضهم خارج عن السيطرة.

الحمل، الإرضاus والخصوبة

يستشيري طبيبك قبل تناولك أي دواء إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل، تخططين للحمل أو مرضعة.

إن تأثير هذا الدواء على الجنين غير معروف.

غير معروف إذا ما كان دوبيكست ينتقل إلى حليب الأم.

الفصيلة العلاجية: علاجات للجلد وإلتهاب الجلد، والتي ليست كورتيكosteroides.

يعلم دوبيكست عن طريق حجب بروتينين إثنين يسببان نوعاً من إلتهاب له دور رئيسي في إلتهاب

الجلد التأسي (eczema/atopic dermatitis)، في الربو، في إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية يتراافق

بسلاسل الأنفية، في إلتهاب المريء اليوزيني وفي الحفاظ العقدي.

يسبيبان نوعاً من إلتهاب له دور رئيسي في إلتهاب

من الصوديوم لمقدار دوائي قدره 300 ملخ، أي أنه في الحقيقة "خلٌ من الصوديوم".

3) كيفية إستعمال الدواء؟

اقرأ جيداً "تعليمات الإستعمال" الملحة بالنشرة من أجل تلقي معلومات حول كيفية تحضير وحقن دوبيكست وكيفية تخزين الدواء بشكل صحيح وكذلك حول أعراض جديدة طيبة.

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة تحضير العلاج بالمستحضر.

يحدث مع الطبيب قبل العلاج بـ دوبيكست حالات الطبية، وهذا يشمل إذا:

• وُجدت لديك تلوث طفيلي في الأمعاء.

• كنت مقلباً على تلقي لقاحات، لا يجوز تلقي "لقاحاً حياً" مباشرة قبل وخلال العلاج بدـ دوبيكست.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب، الصيدلي أو المرضية.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخر.

هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطيبة مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

علاج إلتهاب الجلد التأسي بدرجة خطورة متوسطة حتى شديدة، لدى الكبار والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق، عندما لا يتم ضبط المرض بشكل ملحوظ.

دوبيكست غير مخصص لعلاج الحفاظ العقدي لدى الأطفال والراهقين دون عمر 18 سنة.

يمكن إستعمال دوبيكست للعلاج الموضعي.

كورتيكosteroides للعلاج الموضعي.

علاج داعم للربو بدرجة خطورة متوسطة حتى شديدة، لدى الكبار والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق، بمشاركة أدوية بدون وصفة طبية لعلاج الربو.

دوبيكست قد يساعد في خفض المرض بشكل ملحوظ.

دوبيكست غير مخصص لعلاج الحفاظ العقدي لدى الأطفال والراهقين دون عمر 18 سنة.

لا يستعمل دوبيكست في علاج مشاكل التنفس.

يُستخدم دوبيكست 300 ملخ بمشاركة أدوية إضافية لعلاج إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية يتراافق بسلاسل الأنفية لدى كبار مرضهم خارج عن السيطرة.

الحمل، الإرضاus والخصوبة

يستشيري طبيبك قبل تناولك أي دواء إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل، تخططين للحمل أو مرضعة.

إن تأثير هذا الدواء على الجنين غير معروف.

غير معروف إذا ما كان دوبيكست ينتقل إلى حليب الأم.

الفصيلة العلاجية: علاجات للجلد وإلتهاب الجلد، والتي ليست كورتيكosteroides.

6 أشهر حتى 5 سنوات لديهم إلتهاب الجلد التأسي:

يُستخدم دوبيكست عن طريق حجب بروتينين إثنين يحتوي دوبيكست على أقل من 1 ملليمول (23 ملخ)

الجلد التأسي (eczema/atopic dermatitis)، في

الربو، في إلتهاب مزمن في الجيوب الأنفية يتراافق

بسلاسل الأنفية، في إلتهاب المريء اليوزيني وفي الحفاظ العقدي.

يُستخدم دوبيكست عن طريق حجب بروتينين إثنين يسببان نوعاً من إلتهاب له دور رئيسي في إلتهاب

من الصوديوم لمقدار دوائي قدره 300 ملخ، أي أنه في الحقيقة "خلٌ من الصوديوم".

2) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء:

إذا كنت حساساً (أميرجي) لـ دوبيلوماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء

(انظر الفقرة 6).

المقدار الدوائي الموصى به لأطفال من عمر 6 أشهر حتى 12 سنة وما فوق لديهم ربو:

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات

الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة

العلاج بالمستحضر.

يُعطي دوبيكست بالحقن تحت الجلد (حقنة تحت

الجلد).

إذا قرر كل من الطبيب أو الممرضة خاصتك بأنك

أنت أو المعالج الخاص بك يمكنك إعطاء حقنة دوبيكست، فسوف يتوجب عليك أو على المعالج

الخاص بك تلقي إرشاد حول الطريقة الصحيحة لتحضير وإجراء الحقن.

لا تحاول حقن دوبيكست قبل تلقيك إرشاد من

الطبيب أو الممرضة.

دوبيكست غير مخصص لعلاج إلتهاب الجلد

التأسي لدى الأطفال دون عمر 6 أشهر.

دوبيكست غير مخصص لعلاج الربو لدى الأطفال

دون عمر 6 سنوات.

دوبيكست غير مخصص لعلاج التهاب مزمن في

الجيوب الأنفية يتراافق بسلاسل الأنفية لدى أطفال

ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب، الصيدلي أو المرضية.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخر.

هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطيبة مشابهة لحالتك.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء:

إقرأ جيداً "تعليمات الإستعمال" الملحة بالنشرة

من أجل تلقي معلومات حول كيفية تحضير وحقن دوبيكست وكيفية تخزين الدواء بشكل صحيح وكيفية إلقاء أقلام دوبيكست

المستعملة.

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات

الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة

العلاج بالمستحضر.

يُعطي دوبيكست بالحقن تحت الجلد (حقنة تحت

الجلد).

إذا قرر كل من الطبيب أو الممرضة خاصتك بأنك

أنت أو المعالج الخاص بك يمكنك إعطاء حقنة دوبيكست، فسوف يتوجب عليك أو على المعالج

الخاص بك تلقي إرشاد حول الطريقة الصحيحة لتحضير وإجراء الحقن.

لا تحاول حقن دوبيكست قبل تلقيك إرشاد من

الطبيب أو الممرضة.

دوبيكست غير مخصص لعلاج إلتهاب الجلد

التأسي لدى الأطفال دون عمر 6 أشهر.

دوبيكست غير مخصص لعلاج الربو لدى

الأطفال والراهقون

دون عمر 6 سنوات.

دوبيكست غير مخصص لعلاج التهاب مزمن في

الجيوب الأنفية يتراافق بسلاسل الأنفية لدى أطفال

ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب، الصيدلي أو المرضية.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخر.

هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطيبة مشابهة لحالتك.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء:

إقرأ جيداً "تعليمات الإستعمال" الملحة بالنشرة من أجل تلقي معلومات حول كيفية تحضير وحقن دوبيكست وكيفية تخزين الدواء بشكل صحيح وكيفية إلقاء أقلام دوبيكست المستعملة.

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات

الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة

العلاج بالمستحضر.

يُعطي دوبيكست بالحقن تحت الجلد (حقنة تحت

الجلد).

إذا قرر كل من الطبيب أو الممرضة خاصتك بأنك

أنت أو المعالج الخاص بك يمكنك إعطاء حقنة دوبيكست، فسوف يتوجب عليك أو على المعالج

الخاص بك تل

تعليمات الإستعمال




دوبيكستن 300 ملغم

قلم أحادي الإستعمال جاهز للإستعمال

تعليمات الإستعمال تحتوي على معلومات

شرح كيفية حقن دوبيكستن.

أجزاء قلم دوبيكستن الجاهز للإستعمال معروضة أدناه:




أ. تجهيز الحقن

ب. إختر وجهز موقع الحقن


ب2: إختر موقع الحقن

- نظف موقع الحقن بمنديل كحولي.
- البطن، ما عدا 5 سم من حول سرتك.
- يمكن للعلاج أن يحقن أيضاً في المنطقة الخارجية من أعلى ذراعك.
- ⚠ لا تلمس موقع الحقن مرة أخرى ولا تزفر عليه قبل الحقن.
- ⚠ إختر موقع حقن مختلف في كل مرة تحقن فيها دوبيكستن.
- ⚠ لا يجوز الحقن داخل جلد حساس، متضرر، به كدمة أو ندبة أو في مناطق فيها أوردة ظاهرة للعين.
- ⚠ لا يجوز الحقن عبر الملابس.

ب3: جهز موقع الحقن



ب4: إغسل يديك جيداً بالصابون والماء




ب5: انتظر 45 دقيقة

- ضع قلم دوبيكستن على سطح مستو ودعي يسخن بشكل طبيعي بدرجة حرارة الغرفة، التي هي دون 25 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة على الأقل.
- ⚠ لا تسخن قلم دوبيكستن في الماء الساخن أو في ضوء الميكرويف، في الماء الساخن أو في ضوء الشمس المباشر.



أ4: إفحص الدواء

- أمعن النظر بالدواء عبر النافذة يجب أن يكون رائقاً وعديم اللون حتى لون أصفر شاحب.
- إنته من الجائز أن ترى فقاعات هواء، هذا الأمر طبيعي.
- ⚠ لا تستعمل القلم إذا تغير لون السائل أو كان عكرأ، أو إذا كان يحتوي على فتات أو جسيمات ظاهرة للعين.



أ3: أمعن النظر في الملصقة

- إفحص المستحضر والمقدار الدوائي
- لا يجوز بحوزتك المستحضر الصحيح وإنقضى تاريخ الصلاحية.
- وألمقدار الدوائي الصحيح.



أ1: جهز المعدات


- لا تستعمل قلم دوبيكستن إذا تضرر.
- لا تستعمل قلم دوبيكستن إذا كان تأكيد من أن لديك الأشياء التالية:
- قلم دوبيكستن *منديل كحولي
- كرة قطنية أو ضماد شاشي
- *وعاء مقاوم للثقب (أنظر المرحلة د)
- *هذه الأشياء غير مشمولة في علبة المستحضر

د. التخلص من قلم دوبيكستن المستعمل

- كيفية التخلص من قلم دوبيكستن**
تخلص من أقلام دوبيكستن المستعملة والأغطية الخضراء في وعاء مقاوم للثقب، مباشرة بعد الإستعمال.
لا ترم أقلام دوبيكستن مستعملة وأغطية خضراء في القمامنة المنزلية.




ج4: إنزع



- بعد إتمام عملية الحقن، إسحب بشكل مستقيم لإخراج قلم دوبيكستن من الجلد. سينطلي غطاء الإبرة الأخضر الإبرة.
- إذا رأيت دماً في موقع الحقن، إمسح برفق بواسطة كرة قطنية أو ضماد شاشي.
- ⚠ لا تفرك الجلد بعد الحقن.
- إذا لم تتحول النافذة إلى صفراء تماماً، أو إذا كان يدو أن الدواء لا يزال يخرج من القلم، فمن الجائز أنك لم تلتقم المقدار الدوائي الكامل. تخلص من القلم وتوجه فوراً إلى الطاقم الطبي الخاص بك.
- ⚠ لا تعط مقدار دوائي ثانياً بدون إستشارة الطاقم الطبي.

ج3: إضغط نحو الأسفل ← أنظر إلى النافذة حتى تتحول صفراء تماماً → ثم عد حتى 5




- يستمر في الضغط على قلم دوبيكستن مقابل الجلد وأنظر إلى النافذة حتى لا يمكنك رؤية غطاء الإبرة الأخضر.
- ستتحول النافذة إلى صفراء تماماً، ومن ثم سوف تسمع صوت "كليك" ثاني.
- يستمر في الضغط على قلم دوبيكستن مقابل الجلد.
- تبدأ التحول إلى الأصفر.
- لا يتطلب قرص الجلد لدى الكبار والأطفال من عمر مقابل الجلد.

ج2: أقرض الجلد وضع

- أمسك قلم دوبيكستن بحيث تتمكن من رؤية النافذة.
- ضع غطاء الإبرة الأخضر على الجلد.
- ضع غطاء الإبرة الأخضر على الجلد بزاوية 90 درجة تقريباً.
- لا يتطابق قرص الجلد لدى الكبار والأطفال من عمر 12 سنة وما فوق.

ج1: إنزع الغطاء الأخضر



- إنزع الغطاء الأخضر عن طريق سحبه كما هو موضح في الرسم. لا تدور الغطاء الأخضر.
- لا تزعن الغطاء الأخضر إلى أن تكون مستعداً للحقن.
- لا تلمس أو تضغط على غطاء الإبرة الأخضر بأصابعك. الإبرة موجودة في الداخل.

⚠ لا تقوم بإعادة الغطاء الأخضر إلى القلم بعد نزعه.