



5. כיצד לאחסן את התרופות?

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוחה ראייהם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:
אין לאחסן תרופות שונות באאותה אריזה. יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מפני יש לאחסן במרקם (2° - 8°). אין להקפי. אין לנו. אין לחמם או לחסוך את עט הדופיקנסטן לאור שימוש ישיר.

אם נדרש, ניתן לאחסן את העטים בטמפרטורת החדר של עד 25° במשך 14 ימים לכל היותר. אין לאחסן בטמפרטורה מעל 25° . אם אתה מוציא את הקרטון מהמרקם, כתוב את תאריך ההוצאה על האריזה החיצונית והשתמש הדופיקנסטן בתוך 14 ימים. אין להזכיר את התופפה למקרר.

אין להשתמש בתרופה אם היא עכורה, שינה צבעה או שמכילה חלקיקים. אין להשליך תרופות שאלו את הרוקח שלך אויר להשליך תרופות שאינן זוקק להן יותר. אמצעים אלו יערו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את החומרים הבלווים פעילים הבאים:

כל עט של דופיקנסטן 200 מ"ג מכיל: Sucrose (57 mg), L-arginine monohydrochloride, L-histidine monohydrochloride monohydrate, L-histidine, polysorbate 80, glacial acetic acid, sodium acetate trihydrate, water for injections.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
כל עט מוכן לשימוש מכיל 200 מ"ג של דופילומאב-ב-1.14 מ"ל תמייה צולחה עד מעת אטומה, חסרת צבע עד גוון צהוב חיוור. האריזה מכילה: 1 או 2 או 3 או 6 עיטים מוכנים לשימוש עם מגן מחת.

ייתכן ולא כל גודלי האריזות משוקרים. עלון זה לא כולל את כל המידע על התרופה. אם יש לך שאלת כלשהו או אין לך בטווח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

בעל הרישום והיבואן וכותבו: סאנופי ישראל בע"מ, מתחם גריינורוק, ת.ד. 47. 910. מס' רישום תרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1644236128. לשם הפשתות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בפברואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מינון מומלץ לילדים מגיל 6 עד 11 שנים עם אסתמה:

משקל גוף	מנת התחלתי*
15 ק"ג עד פחות 300 מ"ג כל 4 מ-30 ק"ג	300 מ"ג כל שבועות 30
30 ק"ג או יותר	200 מ"ג כל שבועיים 30

*Uber ילדים בני 6 עד 11 שנים עם אסתמה, שזריקת דופיקנסטן תינתן על ידי מבוגר או תחת פיקוחו.

Uber ילדים מגיל 6 וחודשים עד לגיל 12 שנים, זריקת דופיקנסטן צריכה להינתן על ידי מטופל בלבד.

כמה דופיקנסטן להזריק ולמשך כמה זמן

הминון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

כל עט של דופיקנסטן 200 מ"ג מכיל מנת אחת של דופיקנסטן (200 מ"ג).

מינון מומלץ למבוגרים עם אסתמה:

משקל גוף	מנת התחלתי*
300 מ"ג כל 4 שבועות	600 מ"ג עד 30 ק"ג (שתי זריקות של 300 מ"ג)
200 מ"ג כל שבועיים	400 מ"ג עד 30 ק"ג (שתי זריקות של 200 מ"ג)

*менה התחלתי של 600 מ"ג (שתי זריקות של 300 מ"ג). לאחר מכן 300 מ"ג כל שבועיים.

מינון מומלץ לילדים מגיל 6 שנים עד 17 שנים עם אסתמה:

משקל גוף	מנת התחלתי*
300 מ"ג כל 4 שבועות	600 מ"ג עד 15 ק"ג (שתי זריקות של 300 מ"ג)
300 מ"ג או יותר	600 מ"ג עד 30 ק"ג (שתי זריקות של 300 מ"ג)

*менה התחלתי של 600 מ"ג (שתי זריקות של 300 מ"ג). לאחר מכן 300 מ"ג כל שבועיים.

טראומות הלועאי השכיחות ביותר של דופיקנסטן:

- תגובהה באtor ההזרקה
- זיהומיים בדרכי הנשימה העליונות
- דלקת בעיניים ובפעפיים, כולל אדומות,
- נפיחות וגירוד, לפעמים עם מטרופתשת
- יובש בעיני
- תסמיין התקרכרות (היום במערכת הנשימה העליונה)

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהנרגן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנרגן זוקק להם.

אם אתה מפסיק לשימוש הדופיקנסטן אין להפסיק שימושו ללא התיעצויות עם הרופא. עם הרופא שלך, לרוקח או לאחות.

הרופא שלך ישרו להמליך על נטילת תרופה נוספת ייחד עם דופיקנסטן. השתמש בתרופה נוספת בדיקות כפי שהרופא מורה לך.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהנרגן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנרגן זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש הדופיקנסטן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

קשהם בשינה אל תיבלה למקרה רשות תופעות הלועאי. יכולת בקיבה אל שביןיהם יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

דופיקנסטן יכולת לגרום לתופעות לוואי

• זיהומיים טיפיליים במעטם

• תגובהות אלרגיות. דופיקנסטן יכולת לגרום לתגובה אלרגית שיכולה לעפעמים

להיות חמורות.

הפסיק את השימוש הדופיקנסטן ונפה מיד לרופא שלך או לרוקח או לאחות.

בזורה נשים או צוינה בעלו, מטרופתשת בעור, נפיחות, כאבי שיניים, כאב שיניים, כאבי שרירים,

• כאב גרון (כאב בלוע)

• פצעי קור בהפה ושבשתים

• סחרחוורת

• כאבי שרירים

• שלשול

• כאבים בשינה

• כאב שיניים

• דלקת בקיבה

• כאבי מפרקים

• כאב גרון

• כאב טיפיליים

