

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי **עלון לצרכן לפי הקטגורי הרחבים (מכשירי "המשמרי" 1986** התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

# ויגהמוקס

## טיפות עיניים, תמיסה.

**הרכב:** מוקסיפלוקסצין (הכידורכולויד) 0.5% Moxifloxacin (as Hydrochloride) 0.5% מרכיבים הבלתי פעילים מופיעים בסך הכל 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון על העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמת עבורך. אל תעביד אותה לאחרים. היא עלולה להזיק לך ואפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בדיקות בלחמית האטית הנגרמות על ידי חיידקים הרגישים לתרופה.

**קבוצה תרופוטי:** האנטיביוטיקה המגשפחת הפלואורוקווינולונים דור רביעי.

### 2. לפני השימוש בתרופה

- ❗ **אין להשתמש בתרופה אם:**
- דווחו עליך רגישות למוקסיפלוקסצין (Moxifloxacin) או לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אנטיביוטיות אחרות מסוג הקווינולונים.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**  
**אלרגיה אם:** אם הנך חש תגובת אלרגיה ל**מוקסימוקס**. תגובות אלרגיה אינן נפוצות ותגובות אלרגיה חמורות הינן נדירות. אם הנך חש תגובת אלרגיה כלשהי או תופעת לוואי כלשהי, אגז רגא סידוף 4.

**אם הנך מרכיב עדשות מגע -** הפסק את השימוש בעדשות המגע אם מופיעים סימנים או סימפטומים של זיהום בעין. הרכב משקפיים במקום. אין להרכיב את עדשות המגע על פני סימני הזיהום חלפו ולפני שהפסקת את השימוש בויגהמוקס.

• נפוחות וקרע בגיד מופיעים באנשים שנוטלים פלואורוקווינולונים דרך הפה או על ידי הזרקה תוך ריודית, במיוחד במטופלים מבוגרים ובלאה שמטופלים במקביל בקורטיקוסטרואידים. הפסק את השימוש בויגהמוקס אם אתה מפתח כאב או נפוחות בגידים (דלקת גבד).

• אפשר להשתמש בויגהמוקס עבור ילדים, מטופלים מבוגרים ומטופלים עם הפרעות בתפקוד הכליות או הכבד.

בדומה לכל אנטיביוטיקה, שימוש ממושך בויגהמוקס עלול להוביל לזיהומים אחרים.

❗ **אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, שפך על כך לרופא או לרוקח.**

❗ **הריון והנקה**  
 אם הנך בהריון, מתכננת הריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

❗ **הגיהה שימוש בטכונות**  
 הנך עלול לחוש בטשטוש בריאה לזמן קצר אחרי השימוש בתרופה. אין לנהוג או להפעיל מכונות עד שתופעו זו חולפת.

❗ **טיפול בילדים ובתינוקות:**  
 ההכשר והגומוקס בטוח ויעיל לשימוש בילדים ותינוקות. אין מסיק מידע על השימוש בויגהמוקס בילודים, לכן עבורם השימוש אינו מומלץ.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?


תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:** טיפה אחת בעין המטופלת 3 פעמים ביום למשך 4 ימים. אין לעבור על המנה המומלצת. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. כבדי להימנע מזיהום, אין לתת לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה). יש לשמור על הבקבוק סגור היטב.

ייתכן ובקבוק הטיפול אינו מלא; הדבר נועד לאפשר שליטה טובה יותר על קצב הטיפול. אין לסחוט את הבקבוק, לחיצה עדינה על בסיס הבקבוק מספיקה להוצאת הטיפה.

• כיצד להשתמש בטיפות: שימוש במראה יכול להקל על השימוש בתרופה. ראשית, רחץ את ידך. הטה את הראש לאחור. בעזרת האצבע המורה, משוך כלפי מטה את העפעף החתונות, לצירת מעין "כיס" (אור 1). יש לטפטף את התרופה אל תוך הכיס" שנוצר (אור 2). עצום עיניך בעדינות. אין למצמצם. השאר בעיניים עצומות למשך 2 עד 2 דקות. בנוסף להוראות שימונן לעיל - מיד לאחר טפטוף הטיפה אל העין, לחץ באמצעות האצבע האמצעית על הפינה הפנימית של העין (אור 3). יש להמשיך בלחץ עד 2 דקות לאחר הטפטוף אל העין. פעולה זו עוזרת להימנע מספיגת התרופה אל תוך הגוף ובכך עוזרת למנוע תופעות לוואי.

לאחר השימוש בתרופה, שטוף היטב את ידך בכדי לנקותן משאריות של תרופה. כבדי להימנע מהפצת זיהום, אם השתמש באותו בקבוק של תרופה ליותר מאדם אחד.



• אם אתה עלול לטפטף לתוך העין - נסה שוב. אין לעלץ לשים טיפה פני השנייה, יש לשטוף ידים כדי למנוע מעבר זיהומים מעין אחת לשנייה ולאחר מכן לחזור על ההוראות לעיל גם בעין השנייה.

• סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש. • במידה ואתה משתמש ביותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יש להמתין לפחות 10-15 דקות בין נטילת הויגהמוקס לטיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות ליעילים רק לאחר סיום נטילת טיפות עיניים.

❗ **אם נטלת טיפות מינון גבוה יותר,** עליך לשטוף את העין במים פושרים. אין לנטל מנת יתר או טיפות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד להדריך מיון של בית-חולים, והבא אריות התרופה איתך.

❗ **אם סכחת לישול תרופה** זו בזמן הדרוש, אין לישול מנה כפולה. יש לישול מנה מיד שכונורת. עם זאת, אם הנך קרוב לזמן נטילת המנה הבאה, יש ללדג על הגמה ששנכחה ולשוב למטטר המיון התקין עם הנטילת הבאה.

❗ **אם החל שימור** בטיפולו כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם אתה לשימור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. אין לישול תרופות בחיבורן יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוסטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בויגהמוקס עלול לגרום לתופעות לוואי. חלקן מהמשמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם הנך סובל מתגובת אלרגיה רצינית** **מאחת מהתופעות הבאות:** נפוחות בדידים, ברגליים, בקרסוליים, בפנים, בשפתיים, בפה או בגרון שעלולה לגרום לקושי בנשימה או בשכימה, פריחה או סרפדת (פריחת עור מקצצצצ), שלפוחיות, פצעים וכיבים.

תופעות לוואי נוספות:  
**תופעות לוואי נפוחות - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:**  
**תופעות בעיניים:** כאב בעין, גירוי בעין.

**תופעות לוואי שאינן נפוחות - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000:**  
**תופעות בעיניים:** עין יבשה, עין מגרדת, אדמומיות בעין, דלקת או הצטלקות בפני שטח העין, קריחה של כלי דם בעין, תחושה לא רגילה בעין, הפרעה בעפעף, גירוד, אדמומיות או נפוחות.

תופעות כלליות: כאב ראש וטעם רע בפה.  
**תופעות לוואי נדירות - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000:**  
**תופעות בעיניים:** הפרעה בקרנית, ראייה מטושטשת או ראייה פחותה, דלקת או זיהום בלחמית, התאמצות העיניים, נפוחות בעין.

**תופעות כלליות:** הקאות, אי נוחות באף, תחושת גוש בגרון, ירידה ברמת הברזל בדם, תוצאות בדיקות דם חרוגות של אנזימי הכבד, תחושה לא רגילה בעור, כאב, גירוי ברגון.

## תופעות לוואי שכיחות: אינה ידועה - תופעות שכיחות טורם נקבע:

תופעות בעיניים: זיהום בעין, עכירות בפני שטח העין, נפוחות בקרנית, משקעים בפני שטח העין, עלייה בלחץ בעין, שריטה בפני שטח העין, אלרגיה בעין, הפרשות מהעין, יצור מוצב לזמן קצר, רגישות לאור. תופעות כלליות: קוצר נשימה, קצב לב לא רגיל, סחרחורת, סימפטומים מוגברים של אלרגיה, גירוד, פריחה, אדמומיות בעור, בחילות ופריחת עור מקצצצצ (סרפדת).

### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על "כניסה לקישור":

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור ומחוץ לריגה ידם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. **אל תגורם להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.**
- סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותה חודש.
- אין לזרוק תרופות למערכת הביוב או לפח האשפה הביתי. יש להתייעץ עם הרוקח לגבי אופן ההיפטרות מתרופות לאחר סיום השימוש וזאת בכדי להגן על הסביבה.
- אחסן מתחת ל- 25°C. אין להשתמש בתרופה לאחר 28 יום מהפתיחה הראשונה.
- אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

### 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Sodium Chloride, Boric Acid, Hydrochloric Acid OR Sodium Hydroxide, Purified Water

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: התרופה הינה תמיסה המסוקפת באריזה המכילה בקבוק פלסטיק בנפח 5 מ"ל עם מכסה בורג.

בעל הרישום ותכונות: נוברטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 7126, תל אביב.

שם היצרן ותכונות: אלקון פארמאטיקלס בע"מ, פריבורג, שווייץ.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אוגוסט 2017.

מס' רישום התרופה שבנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 31054 10 133 לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.