

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"א-1986
התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

תריאולן[®]
משחה לעור

הרכב	%
chlormphenicol	3.0%
Prednisolone	0.5%

למיידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה פרק 2 "מיידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 - "מיידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרווקת.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

משחה אנטיביוטית ואנטי-דלקתית לשימוש על פני העור.

קלורומפניקול: אנטיביוטיקה
פרדニיזולן: קורטיקוסטרואיד נגד דלקת

**2. לפני השימוש בתרופה אם:
אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לקלורומפניקול, לפרדנייזולן, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילו התרופה (ראה בהמשך הפרק "מיידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה" ובפרק 6 "מיידע נוסף").
- היו לך בעיות בدم (במיוחד ירידה במספר כדוריות הדם) בזמן טיפול קודם עם קלורומפניקול.
- יש לך היסטוריה משפחתית של בעיות בדם כמו כמות נמוכה של כדוריות דם לבנות, אדומות או טסיות.
- לר או למיישהו מבני משפחתך היו בעיות במערכת הדם או במח העצם. בעיות אלה יכולות לכלול ירידה חמורה בכמות כדוריות הדם האדומות או ספירת דם נמוכה מהנורמה.
- אתה סובל מழימות נגיפיים כמו פצעי קור, הרפס או מאבעבועות רוח.
- אתה סובל מழימות פטריטיים, לדוגמא בכפות הרגליים, גזצת או פטרת בפה.
- אתה סובל משלפוחיות בעור או מפצעים שנגרמו על ידי זיהום חידקי כגון אימפטיגו, שחפת העור.
- במקרה של ניקוב בעור התוף.
- לא לשימוש בעיניים

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- במקרים של זיהומים חמורים, במקביל לשימוש בתרופה יש לתת טיפול סיסטמי מתאים.
- יש להמנע שימוש ממושך בתכשיר, כיוון שהוא עלול לגרום לעליה בסיכון להתקפות עמידות לתכשיר. אם זיהומים חדשים מופיעים במהלך הטיפול, יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות, על שטחי עור רחבים או על פצעים פתוחים.
- התכשיר מכיל קלורומפניקול העלול לגרום לשינויים בתמונה הדם בשימוש ממושך. לפיכך, יש להימנע משימוש ממושך בתכשיר.
- התכשיר אינו מיועד לשימוש בעיניים ואין לתת לתכשיר לבוא ב打仗 עין. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד עם מים.
- יש להיוועץ ברופא לפני השימוש במשחה עם אמצעי איטום כגון תחבות או חיתולים, כיוון שקיים סיכון לספיגה של התכשיר לדם.
- אם חלה הרעה במצבם בזמן הטיפול, יתכן אתה חוות תגובה אלרגית, זיהום או שנדרש טיפול אחר.

- אם אתה חווה חזרה למצבר שלפני הטיפול זמן קצר לאחר סיום הטיפול, תוך שבועיים, אין לחזור על הטיפול ללא התיעיצות עם הרופא, אלא אם הרופא הורה לחזור על הטיפול במקרה זה. אם מצבר השתרף, אך אתה חווה חזרה למצבר שלפני הטיפול והאדמדמית התפשה אל מעבר לאזור הנגוע לפני תחילת הטיפול ואתה חווה הרגשת בעירה, יש לפנות לרופא.
- המשחה מכילה פרפין. בדים (בגדים, מצעים, חבשות וכד') שהיו ב מגע עם תרופה זו עלולים להתלך ולבוער בקלות רבה יותר. אל תעשן ועל תחשף לאש גלויה בגלל הסיכון לכיווית חמורות. כביסת הבדים יכולה להקטין את הסיכון אבל לא להסירו כלוחטין.

ילדים ומתבגרים

זהירות מיוחדת נדרשת בשימוש אצל ילדים ומתבגרים. השימוש בגילאים אלה חייב להיות מלאה במקבב רפואי.

בדיקות ומעקב

התכשיר מכיל קלורומפנוקול העולול לגרום לשינויים בתמונה הדם בשימוש ממושך או בשימוש לטרוגן. לפיכך מומלץ לבצע בדיקות דם לפני תחילת הטיפול ובזמן קצובים במהלך הטיפול, על מנת לאጥר הפרעות בתמונה הדם.

תגובה בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופק, במיוחד אם אתה לוקח תרופות המשpieутות על תפוזו של מה העצם (תרופות המורידות את הפעולות של מה העצם וגורמות לספרת דם נמוכה) כמו אצתיפרין או אם אתה מקבל טיפול ימודרטיבי.

הירון והנקה

אין להשתמש בתרייאולן בזמן ההריון או בתקופת ההנקה, אלא אם הרופא החליט שהשימוש חיוני, כיוון שההשפעות של התרופה אין ידועות. אם הינך בהריון או מניקה, חשוב שתאת בהריון או מתכנתת הריון, יש להיעזר ברופא או ברופק לפני השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל את המרכיב Lanolin anhydrous אשר עלול לגרום לגירוי בעור (למשל דלקת עור מגע).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או עם הרופק אם ניתן בטוח בוגע למינון ולأופן הטיפול בתכשיר.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
 - המינון המקובל בדרך כלל הוא:
אם לא נרשם אחרת, יש למרוח את האזור הנגוע בשכבה דקה 4-2 פעמיים ביום.
• אין למרוח באזורי העיניים.
• אם לא חל שיפור במצב תוך מספר ימים או אם חלה הרעה במצב יש לפנות לרופא שנייה.
• אין לטפל בתכשיר בתינוקות ובילדים מתחת לגיל 4 שנים יותר משבעים, אלא על פי הוראה מפורשת של הרופא, במיוחד באזורי המכוונים על ידי חיתולים.
• אם לא הומלץ על ידי הרופא, יש להימנע מחבישה אוטמת באזור הנגוע (חיתולים מפלסטיים מהווים חבישה אוטמת).

אין לעור על המנה המומלצת

צורת השימוש

- אין לבלווע, לשימוש חיצוני בלבד.
- יש להימנע מגע עם עיניים, רקמות ריריות (כגון בפה, באף ובאזור).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעלILD מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש בתרופה זו בזמן המיעוד, אין להשתמש במנה הבאה בזמן הריגול והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אם אמ' חל شيء במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם רופא.
אין ליטול תרופות בחושן! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהרייאולון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהם.

- **אם מופיעות תופעות הלואוי הבאות, יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא מיד:**
 - **תגובה אלרגיות כולל: קוצר נשימה, חום, נפיחות בפניים, בשפטים או בלשון, גירוד או פריחה עם התנפחות העור (הפריחה יכולה להיות עם נפיחות או עם כתמים, או להיראות כמו שלפוחיות קטנות), פצעים בפה או כאב גרון הגורמים לקשיי בילעה או נשימה, נפיחות בידים, ברגליים או בקרסולאים.**
 - **גרון כאב, חבלות או אי יכולת להתגבר על זיהומיים. במקרים נדרים מאוד, חולמים שטופלו בקלורומפניקול חוו שינויים בתאי הדם שגרמו לעייפות גדולה או היפצעות בклות.**
 - **שימוש בקלורומפניקול לעור, יכול לפעמים לגורם להתרחשות מיקרו-אורגניזמים עמידים כמו פטריות. אם מתפתח זההום חדש בזמן הטיפול במשחה, יש לדוח לרופא.**
 - **מצב העור מחמיר או שהעור מתנפח בזמן הטיפול. יתכן שאתה אלרגי לתרופה, יש לך זההום או שאתה צריך טיפול אחר.**

תופעות לוואי אפשריות כוללות:

- **צריבה**
- **עקבוץ קל**
- **דלקת קלה של העור (דרמטיטיס)**
- **גירוי או גירוד במקום בו מורחים את המשחה.**
- **צמיחה שיער מגברת ושינוי בצבע העור.**

- תופעות לוואי אם אתה משתמש במשחה במשך זמן ממושך, בכל פעם בכמות משחה גדולה או שאתה משתמש במשחה תחת תחבושת אוטמת או חיתול
- **הדקוקות העור וshallול להינזק בклות רבה יותר עליה במשקל, התעגלות של הפנים ולחץ דם גבוה. תופעות אלה יכולות להופיע יותר בתינוקות ובילדים.**

תופעות לוואי נדרות כוללות:

- **דיכי מות עצם (מציב בו מוח עצמות לא מסוגל לייצר כדוריות דם)**
- **יצור מופחת ומוגבל של כדוריות דם אדומות (אנמיה)**

תסמיini גמilia מסטרואידיים: לאחר שימוש רציף לתקופות ארוכות, עם הפסקת השימוש תיתכן הופעה של **תסמיini גמilia הcoldilis:** אדמומיות של העור העוללה להתרפש מעבר לאזור הטיפול הראשוני, הרגשה של בעירה או עקבוץ, גירוד עז, קילוף של העור, פצעים מפרישים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לשמר תכשיר זה במקום חסוך מתחת ל- 25°C .

אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתיית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוספת:

נוסך על המרכיבים הפעילים בתרופה מכילה גם:

Petrolatum yellow (paraffin, yellow soft), lanolin anhydrous (wool fat), mineral oil (paraffin liquid), colloidal silicon dioxide.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה

משחה בצבע צהבהב.

הاريזה מכילה שפופרת של 10 גרם

שם היוצר ובעל הרישום, וכותבותו

טבע ישראל בע"מ,

רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

עלון זה נערך באוגוסט 2024.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 027 40.21618

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.