

ناقيلبين™**30 ملغ****كبسولة ليننة****ناقيلبين™ 20 ملغ****كبسولة ليننة**

المادة الفعالة وكيفيتها:

تحتوي كل كبسولة ليننة على:

فينوريلبين (على شكل

تارتات) 30 ملغ

Vinorelbine

(as tartrate) 30 mg

(as tartrate) 20 mg

لقائمة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر، الرجاء

أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

ناقيلبين مخصص لعلاج سرطان الرئتين (non-small cell)، علاج سرطان الثدي في مرحلته المتقدمة.

الفصيلة العلاجية: يحتوي ناقيلبين على المادة الفعالة فينوريلبين (على شكل تارتات) وينتمي إلى فصيلة الأدوية لعلاج السرطان التي تسمى فصيلة. الثُّنِكَا (قلوانيات ثُّنِكَا).

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة فينوريلبين، أو لأي مادة أخرى من فصيلة أدوية السرطان التي تسمى قلوانيات ثُّنِكَا أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها هذا الدواء (المعلومات إضافية الرجاء أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء").
- كنت مرضعة.
- كنت تعاني من مرض كبد شديد.

- إجترت عملية جراحية في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة أو إذا كنت تعاني من مشاكل في الأمعاء التي تؤثر على إمتصاص الطعام. قد يؤثر هذا على طريقة إمتصاص ناقيلبين في جسمك.
- كان تعداد خلايا الدم البيضاء (الكريات البيضاء، العدلات) لديك منخفضاً، أو في حال وجود تلوث شديد أو الذي حدث حتى أسبوعين قبل موعد تناول الدواء.

- كان تعداد صفيحات الدم لديك منخفضاً (قلة الصفيحات).
- تلقيت مؤخراً أو أتت تنوء تلقي لقاحاً ضد الحمى الصفراء (Yellow Fever).
- كنت بحاجة لعلاج طويل الأمد بالأوكسجين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ ناقيلبين، إحكِ للطبيب إذا:

- عانيت في الماضي من نوبة قلبية أو من آلام شديدة في الصدر. إنخفضت جداً قدرتك على أداء نشاطات يومية.
- وُجدت لديك مشاكل في الكبد أو خضعت لعلاجات بالأشعة (علاج إشعاعي) بحيث أن منطقة العلاج شملت الكبد.

- كانت تظهر عليك علامات لتلوث (مثل سخونة، قشعريرة، آلام مفصلي، سعال).
- كنت تنوء تلقي لقاح.
- كنت حاملاً.

الأطفال والمرأهقون

هذا الدواء غير موصى به لعلاج الأطفال دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

يجب إجراء فحوص تعداد خلايا الدم قبل وخلال فترة العلاج بـ ناقيلبين، وذلك للتتأكد بأن تناول الدواء آمن بالنسبة لك. إذا كانت نتائج فحوص الدم غير سليمة، فمن الجائز أن يتم تأجيل العلاج وتكون حاجة لإجراء فحوص إضافية حتى تُظهر نتائج فحوص دمك قيماً سليمة.

التدخلات/ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكِ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

على طبيب الإنذار إذا كنت تتناول إحدى الأدوية التالية:

- أدوية لتمبيع الدم (مضادات تخثر)
- دواء لعلاج الصرع باسم فينيتوثين
- دواء لعلاج السل باسم ريفامبيسين
- أدوية لعلاج تلوث فطري مثل إيتراكونازول وكيتوكونازول
- دواء لعلاج السرطان باسم ميومايسين C أو لاپاتينيب
- أدوية مثبتة للجهاز المناعي مثل سيكلوسبورين وتاكروليموس

لقالات كثيرة (القالات حية مضغفة) غير موصى بها خلال العلاج، خاصة لدى متعالجين لديهم ضعف في جهاز المناعة. يجب إعلام طبيبك إذا تطلب منك تلقي لقالات.

في حال كنت تتلقى ناقيلبين سوية مع أدوية (مثل سيسپلاتين) التي تؤثر على نخاع العظم لديك، هذا قد يفاقم أعراضًا جانبية معينة.

إستعمال الدواء والطعام

يوصى بتناول الدواء سوية مع وجبة خفيفة. لا يجوز شرب مشروب ساخن مع الدواء، لأنه قد يؤدي إلى ذوبان الكبسولة أسرع مما ينبغي.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنه حامل أو تخططين للحمل، يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء لأنه يوجد مخاطر محتملة بالنسبة للطفل.

لا يجوز الإرضاع إذا كنت تتناولين ناقيلبين.

إذا كنت إمرأة ذات قدرة على الحمل، عليك إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل في فترة العلاج ولمدة 7 أشهر من إنتهاء العلاج.

إذا كنت رجلاً معاًجاً بـ ناقيلبين، فمن الموصى به من أجلك لا تتسبب في حمل إمرأة خلال العلاج ولمدة 4 أشهر بعد تناول الكبسولة الأخيرة.

عليك إستشارة طبيبك بخصوص حفظ المني قبل بدء العلاج لأن ناقيلبين يمكن أن يؤثر على خصوبتك. عليك إستعمال وسائل منع حمل ناجعة خلال العلاج ولمدة 4 أشهر بعد إنتهاء العلاج.

السياحة وإستعمال الماكولات

لم يتم إجراء أبحاث حول التأثيرات على القدرة على السياحة وتشغيل الماكولات. مع ذلك، كما هو الحال في جميع الحالات، عليك عدم السياحة إذا كنت لا تشعر بشكل جيد أو إذا نصحت طبيبك عدم السياحة.

معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء

يحتوي الدواء على سوربيتول، كحول وصوديوم.

إذا قال لك الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، إستشر الطبيب قبل تناول الدواء.

يحتوي ناقيلبين 20 ملغ على 5.36 ملغ سوربيتول في كل كبسولة.

يحتوي ناقيلبين 30 ملغ على 8.11 ملغ سوربيتول في كل كبسولة.

يحتوي ناقيلبين 20 ملغ على 5 ملغ كحول (إيثanol) في كل كبسولة.

يحتوي ناقيلبين 30 ملغ على 7.5 ملغ كحول (إيثanol) في كل كبسولة.

إن كمية الكحول في كل كبسولة من هذا الدواء (ناقيلبين 20 ملغ، ناقيلبين 30 ملغ) تساوي على الأقل 1 ملل من البيرة أو 1 ملل من النبيذ. إن كمية الكحول القليلة في هذا الدواء، لن تكون لها أية تأثيرات ملحوظة.

يحتوي هذا الدواء (ناقيلبين 20 ملغ، ناقيلبين 30 ملغ) على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الكبسولة، وبالتالي يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إعطاء ناقيلبين تحت إشراف طبي من قبل طبيب مؤهل المُتمرس بعلاج مرض السرطان.

الدواء مخصص للتناول عن طريق الفم.

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. قبل وأثناء العلاج بـ ناقيلبين، سيقوم طبيبك بفحص تعداد خلايا دمك، لكي يحدد متى ستلتقي العلاج وأي مقدار دوائي ملائم لك. يقول لك طبيبك على عدد الكبسولات وعيارها التي يتوجب عليك تناولها. سيمت تحديد ذلك وفقاً لمساحة سطح جسمك، الذي سيحسبه طبيبك من وزن جسمك وطولك.

يتم تناول المقدار الدوائي الأسبوعي الإعتيادي بمقدار دوائي واحد ويُحسب وفقاً لـ 60 ملغ للметр المربع من مساحة سطح جسمك بالنسبة للمقادير الدوائية الثلاث الأولى من العلاج. بعد المقدار الدوائي الثالث سيقرر طبيبك إذا كان سيرتفع المقدار الدوائي وسيحسب المقدار الدوائي وفقاً لـ 80 ملغ للเมตร المربع من مساحة سطح جسمك. على أي حال، من الجائز أن يلائم طبيبك المقدار الدوائي من ناقيلبين.

في حال كنت تتلقى كبسولات ناقيلبين مع دواء آخر لعلاج حالتك الطبية، سيقرر طبيبك ما هو المقدار الدوائي الملائم لك.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الإجمالي ذو 160 ملغ للأسبوع.

لا يجوز تناول ناقيلبين أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

وتيرة إعطاء الدواء

ناقيلبين يُعطى عادة مرة في الأسبوع. وتيرة الإعطاء تُحدد من قبل طبيبك.

المستحضر سام للخلايا.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

مدة العلاج تُحدد من قبل طبيبك.

قبل فتح البليستر (لوحة) الذي يحتوي على ناقيلبين، تأكد بأن الكبسولة لم تتضرر، حيث أن السائل داخل الكبسولة يسبب التهيج وقد يسبب ضرراً عند ملامسته الجلد، العينين أو الأغشية المخاطية. إذا حدث تلامس، أشطف المنطقة المصابة فوراً وبعناية مع الماء.

لا يجوز بلع كبسولة تضررت: يجب إعادةها إلى طبيبك أو إلى الصيدلي.

فتح عبوة البليستر (لوحة):

1. يجب قصّ البليستر بمساعدة مقص على امتداد الخط المعلم (خط مُقطع أسود).

2. يجب تقطير الغطاء البلاستيكي اللين.

3. يجب دفع الكبسولة عبر ورقة الألومينيوم.

تناول كبسولة ناقيلبين:

- يجب بلع الكبسولة بكاملها مع الماء، من المستحسن تناول الدواء مع وجبة خفيفة. لا يجوز شرب مشروب ساخن مع الدواء، لأنه قد يؤدي إلى ذوبان الكبسولة أسرع مما ينبغي.
- لا يجوز مضغ أو مص الكبسولة.
- إذا قمت بمضغ أو بمحض الكبسولة عن طريق الخطأ، يجب شطف الفم جيداً بالماء والتوجه فوراً إلى الطبيب.
- إذا تقيأت خلال عدة ساعات من تناول الدواء، اتصل بطبيبك؛ لا يجوز معاودة تناول نفس المقدار الدوائي.

إذا كنت تتناول دواء ضد الغثيان/التقيؤات

قد يسبب ناقيللين التقيؤ (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية"). إذا وصف لك طبيبك دواء ضد الغثيان/التقيؤ، فيجب تناول هذا الدواء حسب تعليمات الطبيب.

تناول ناقيللين مع وجبة خفيفة؛ سيساعدك ذلك على تخفيف شعور الغثيان.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت ناقيللين أكثر من المقدار الدوائي الذي وصفه الطبيب، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب. أحياناً يمكن جسمك أن يستجيب بأعراض شديدة. جزء من الأعراض قد تتطور كأعراض لتوث (مثل سخونة، قشعريرة، سعال، آلام مفصلية). قد يتطور أيضاً إمساك شديد. إذا ظهرت هذه الأعراض الشديدة، يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. اتصل بطبيبك الذي سيقرر بالنسبة لتغيير موعد تناول المقدار الدوائي الخاص بك. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

سيقرر طبيبك متى يجب إيقاف العلاج. لكن، إذا كنت تريد إيقاف العلاج مبكرآ، عليك إستشارة الطبيب بخصوص خيارات أخرى.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ناقيللين قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوجه فوراً للطبيب إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض التالية أثناء العلاج بـ ناقيللين:

- ألم في الصدر، ضيق في التنفس وإغماء، التي قد تكون أعراضًا لخثرة دموية في الأوعية الدموية في الرئتين (احتشاء رئوي/إنصمام رئوي).
- صداع، تغير في الحالة الذهنية الذي قد يؤدي إلى إرتباك وسُبات، تشنج، تشوّش الرؤية وضغط دم مرتفع، التي قد تكون علامة لإضطراب عصبي مثل متلازمة الإعتلال الدماغي الخلفي العكوس.
- سعال، سخونة وقشعريرة التي يمكن أن تكون علامات لتلوث شديد أو تلوث عام (إنتان الدم) الذي قد يكون خطيراً.
- إمساك شديد يتراافق بألم في البطن، دون إفراج لمدة عدة أيام.
- دوران شديد أو دوران عند النهوض، علامة لانخفاض شديد في ضغط الدم.
- ألم شديد في الصدر ليس عاديًّا بالنسبة لك. العرض قد يكون بسبب اضطراب في وظيفة القلب نتيجة لتدفق دم غير كافٍ، الذي يُسمى نوبة قلبية (أحياناً قد يسبب الوفاة).
- صعوبة في التنفس، طفح منتشر في كل الجسم، إنتفاخ الجفنين، الشفتين أو الحنجرة التي قد تكون علامات لرد فعل تحسسي.

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة)

تلوثات في مناطق مختلفة؛ إضطرابات في الجهاز الهضمي؛ إسهال، إمساك، ألم في البطن، غثيان وتقيء؛ إلتهاب في الفم؛ إنخفاض في تعداد خلايا الدم الحمراء الذي قد يسبب شحوب، ضعف أو ضيق في التنفس؛ إنخفاض في تعداد الصفائح الدموية الذي قد يزيد من خطورة حدوث أنزفة أو كدمات؛ إنخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء، الذي يجعلك أكثر عرضة للتلوثات؛ فقدان ردة فعل إعكاسية معينة، أحياناً تغير في حاسة اللمس؛ تساقط شعر، عادة معتدلة؛ إرهاق؛ سخونة؛ شعور بعدم راحة؛ إنخفاض في الوزن، فقدان الشهية للطعام

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100)

صعبيات في تنسيق حركة العضلات؛ تغيرات في الرؤية؛ ضيق في التنفس، سعال؛ صعوبة في التنفس؛ أعراض إضافية في الجهاز التناسلي - البولي؛ صعوبات في النوم؛ صداع؛ دوران؛ تغير في الشعور بالطعم؛ إلتهاب في البلعوم، صعوبة عند بلع الطعام أو السوائل؛ ردود فعل في الجلد؛ قشعريرة؛ زيادة في الوزن؛ ألم في المفاصل، ألم في الفك، ألم عضلي؛ ألم في أجزاء مختلفة من الجسم وفي منطقة الورم؛ ارتفاع ضغط الدم؛ إضطرابات في الكبد (نتائج غير سليمة في فحوص الكبد)

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1000)

قصور القلب الذي قد يتجلّى بضيق في التنفس وإنفاس في الكاحلين، ضربات قلب غير منتظمة؛ قلة التحكم بالعضلات التي قد تجلّى بمشي غير سليم؛ تغيرات في النطق وحركات عينين غير عادية (رنح)