

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

مالוקס תרחיף

חומרים פעילים:

כל כפית (5 מ"ל) מכילה:
אלומיניום הידרוקסיד 175 מ"ג
מגנזיום הידרוקסיד 200 מ"ג

(aluminium hydroxide 175 mg)
(magnesium hydroxide 200 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קריאה בעיון את העalon עד סוף בטרכם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המופיע בעalon זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמנני המחלתה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

סוטר חומצה להורדת כמות החומצה בקיבתול והקלת על תחושת הצרבת.

קבוצה רפואיית: סוטרי חומצה.

תרחיף מאלוקס פועל על ידי הקטנת כמות החומצה בקיבתול.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם אתה:

- רגיש (אלרגי) לאלומיניום הידרוקסיד או מגנזיום הידרוקסיד או לאחד מרכיבי התרופה האחרים (ראה פרק 6). סימנים לתגובה אלרגית כוללים פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.
- מרגיש חלש מאוד וחסר אנרגיה.
- סובל מבעיות בכליות. חשיפה ממושכת לנזונות גבוזות של מאלוקס תרחיף עלולה להוביל לדמנציה.
- סובל מכאבים חזקים בבטן.
- סובל מחלת מעיים חלהית או מלאה.

אין לך את התרופה אם אחד מהסיעיפים הנזכרים מעלה נוגע אליו. אם אין לך בטוח, שוחח עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
פנה לרופא או לרוקח לפני תחילת הטיפול אם אתה בדיאטה דלת זրחן.

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 14.

אינטראקטיזיות/תגובהות בין תרופות
אם אתה לוקח או אם לך את תרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
אין לך תרחיף מאלוקס ותרופות אחרות באותו הזמן. זאת מכיוון שתרופות מסוימות יכולות להיות מושפעות מתרחיף מאלוקס או שהן יכולות להשפיע על הפעילות של תרחיף מאלוקס.

במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות לב, כמו דיאזקפאין, כינידין, מטופרולול, אנטונול ופרופראנולול
- תרופות لأنמיה, כמו מלחי ברזל
- תרופות לטיפול בכיבים וחומציות בקיבתול, כמו רנטידין או סימטידין (אנטגוניסטים-L-H)
- תרופות למלה, כמו כלורוקווין והידרוקסילורוקווין
- תרופות להפרעות מסוימות בעצמות, כמו בייספואספונטים

- תרופות לטיפול בתగבות אלרגיות או דלקתיות מסוימות או בתגובה לא תקינה מסוימת של מערכת החיסון, כמו גלאוקורטיקואדים
- תרופות להפרעות של הכליות, כמו ציטרטיים
- תרופות לשחפת, כמו אטמברול, איזונייזיד
- תרופות לטיפול בזיהומים, כמו טטרציקלי, ציפלוסופרינים (צפפודוקסים וצפדיינר), דלווטגריבר, אלבטגריבר, רלטגריבר פוטסיאום, טיפול אנט-ויראלי משולב של טנופוביר לאפנמיך פומרט/אמטריציט宾/ביבקטגריבר סודיום, רילפיוירין
- תרופות לטיפול במחלת נפש (פסיכזה), כמו קלופרומאזין, פנותיאזינים נירולפטיים
- תרופות לטיפול בבעיות מוגדלות של אשlagen בגוף, כמו פוליסטרן סולפונט
- תרופות לצאב, כמו דיפלוניל, אינדומטאצין
- תרופות בשימוש בטיפולי שניים, כמו סודיום פלאוריד
- תרופות לטיפול בתת-פעילות של בלוטת התannis, כמו לבוטירוקסן
- תרופות לכאבי מפרקים ולטיפול בתגבות כימיות לא תקינות בגוף, כמו פניציאלאמין
- תרופות להפחחת כולסטרול, כמו רוזבוטסטין
- תרופות לסרען, כמו נילוטיניב, דסטיניב מונוהידרט
- תרופות לטיפול בהפרעות דם, כמו אלטרומבווג אולמיין (יתר לחץ דם ריאתוי), כמו ריסיגואט
- סליצילטים
- ויטמינים

כאמצעי זהירות, יש לשמר על מרוחה של שעתים לפחות בין זמני המtan של כל תרופה הניתנת דרך הפה לבין סותר החומצה (4 שעות עברו פלאורוקווינולוניים).

שימוש בתרופה ומזון

ניתן לקחת את התרופה עם מים או חלב.
יש לשותה את התרחיף 20 דקות עד שעה לאחר הארוחות וכן לפני השינה.

הירין והנקה

יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה אם:

- את בהירין, עשוי להיכנס להירין או חשבת שתאות בהירין. אין לשמש בתרופה בשלושת חודשי ההירון הראשוניים.
- את מניקה או מתכנתת הנקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

مالוקס תרחיף מכיל سورביטול. תרופה זו מכילה 50 מ"ג سورביטול בכל מנתה של 5 מ"ל. سورביטול הוא מקור לפראקטווז. אם הרופא אמר לך כי אתה סובל מבעיה של חסור סבליות או הפרעה בעיכול של סוכרים מסוימים, או אם אבחנתה כסובל מאיסבילות תורשתית לפראקטווז (hereditary fructose intolerance [HFI]), הפרעה גנטית נדירה, שהסובלים منها אינם יכולים לפרק פרוקטווז, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

mailtoxs תרחיף מכיל פחות מ-1 מיילימול (23 מ"ג) נתרן במננה של 5 מ"ל, אך נחשב כ"נתול נתרן".

3. כיצד תשמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
יש לנער היטב לפני השימוש, מיועד למtan דרך הפה. אם נכון, ניתן לקחת את התרופה עם מים או חלב.
עליך לשמש בכפית מדידה או בכוסית מדידה המיעודת למדידת הכמות הנכונה של התרופה. אין לשמש בכפית ביתית לצורך מדידת כמות התרופה. הכיפות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה.

המינון המקובל لمבוגרים, קשישים ומתבגרים מעל גיל 14:
20-10 מ"ל 20 דקות עד שעה לאחר הארוחות וכן לפני השינה או על פי הוראות הרופא.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 14.

אין לעבורי על המנה המומלצת.

אם התסמים לא חולפים יש לפנות לרופא.
אין לקחת את התרופה יותר מאשר ימים ללא הוראת רופא.

אם נטלה בטיעות מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. במרקחה שכזה אתה עלול לסבול משלשול, כאב בטן, תחושת נפיחות והתקכווציות בבטן, הקאות, בעיות עיכול, צרבת, קיבת רגישה, עצירות, אובדן תיאבון, יובש בפה. אלו יכולים להיגרם מהתקכווצות או מחסימת מעיים.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה השימוש במלוקס תרחייף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

הפסיק ללקחת את התרופה ופנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים אם:
אתה סובל מפריחה אדומה וגבשושית, נפיחות בעפupyים, בפנים, בשפטים, בפה או בלשון, גרד, קשיי נשימה או בליעה. זו יכולה להיות תגובה אלרגית. השכיחות של תופעת לוואי זו אינה ידועה.

פנה לרופא או לרוקח אם **תופעות הלואו הבאות חמירות או נמשכות יותר מספר ימים:**

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות אצל עד משתמש אחד מתוך 100):

- עצירות
- שלשול

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות אצל עד משתמש אחד מתוך 10,000):

- היפרמאנזמייה (רמה גבוהה של מגנזיום בדם), כולל באבחנה לאחר שימוש ממושך במטופלים עם פגיעה בתפקוד הכלליות.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- היפופוטמייה – הפרעה אלקטרוליטית שבה יש רמה גבוהה באופן חריג של פוספט בדם. היא עלולה להופיע בשימוש ממושך או במינון גבוה של התכשיר, ואף במינון נורמלי, בעיקר במקרים הנמצאים בדיאטה דלת זרחן.
- כאב בטן
- היפראלומינמייה – הפרעה אלקטרוליטית שבה יש רמה גבוהה באופן חריג של אלומיניום בדם.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואו חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי **שלא ציינה בעلون**, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעללה. אין לגרום להקלאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התוגה (exp. date) המופיע על גבי אריזת התכשיר. תאריך התוגה מותיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- -25°C . אין להקפיא. יש לשמור את הבקבוק סגור היטב.
לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים.

אין להשליך תרופות לשפכים או לפסולות הביתיים. התיעץ עם הרוקח איך להשליך תרופות שאין צורך להן יותר. אמצעים אלו יעזרו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוספַּח עַל הַחֲומָרִים הַפְּעִילִים הַתְּרוּפָה מֵכֶלֶת גֶּם:

Sorbitol liquid 70% (non-crystallizing), hydrochloric acid 10%, mannitol, citric acid monohydrate, hydrogen peroxide solution 30%, saccharin sodium, peppermint oil, domiphen bromide, purified water.

כַּיְצֵד נְרָאֵת הַתְּרוּפָה וּמָה תֹּוכֵן הָאֲרִיזָה:

תרחיף בצבע לבן הארוז בבקבוק לבן בנפח של 250 מ"ל או 355 מ"ל וכוסית מדידה.

"תֹּכֵן שֶׁלֹּא כָּל הַגָּדְלִים מְשׂוֹוקִים.

בָּעֵל הַרְישׁוּם וְהַיבָּאוּן וְכַתּוּבָתוֹ: פרמישלום בע"מ, רח' המלאכה 21, ראש העין 4809157.

נערך באוגוסט 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 048-59-24105

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.