

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

שם התקשייר וצורתו:

צרבת איקס טבליות לעיסה בטעם מנטה

Tzarevet X Mint Flavour chewable tablets

צרבת איקס טבליות לעיסה בטעם מלון

Tzarevet X Melon Flavour chewable tablets

כל טבלייה מכילה: 500 מ"ג קלציום קרבונט (200 מ"ג סידן זמין)
 Calcium Carbonate 500 mg (elemental calcium 200 mg)
 כשר סתרת חומצה לטבלייה: EQ 10.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 " מידע נוספים" וסעיף " מידע חשוב"
 על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קראו בעיון את העלון עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך ליטול את התקשייר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוספת. עליך לפנות אל הרופא במידה ותסמנני המחלת (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 ימים.

אין ליטול צרבת איקס בו זמן יותר אחרות כדי שמוופיע בפרק 2 "תגובהות בין תרופתיות".

1. למה מיועדת התרופה?

להקלת צרבת וחומציות בקיבה.

קבוצה רפואיית: נוגדי חומצה.

2. לפני השימוש בתרופה:

X אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל קלציום קרבונט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- הינך בעל עודף סידןدم (היפרקלצמיה) או עודף סידן בשתן (היפרקלציאוריה).
- הינך נמצא בדיאטה דלת זרחן (פוספט).
- הינך סובל מבעיות בעקבות בלוטות יתרת התannis.
- הינך סובל מתפקוד לקוי של הכל潦ות.
- הינך סובל מותסמנות זולנינגר-אליסון.
- הינך מקבל גליקוזיד של הלב (לדוגמה: דיגוקסין).

! ילדים ומתבגרים
 אין להשתמש בתרופה ילדים מתחת לגיל 12.

! אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- משתנים מסווג תיאזידים.
- ביסופסונאטים לטיפול בדלקול עצם.
- טטראציקלינים וציפרופולוקסצין (אנטיביוטיקות).

מומלץ להמתין פרק זמן של 3-2 שעות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות במשךן דרך הפה.

! הריאן, הנקה ופוריות:

לא נצפו סיכונים אצל נשים בהריון או מניקות שנטלו קלצינום קרבונט במינונים המומליצים. אם הינך בהריון, מתכוננת להרות או מניקה, יש להיעזר ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה. ראי עסיף 3 – "כיצד תשתמש בתרופה?".

! גרגיה ושימוש במכונות:

לא נצפו השפעות של קלצינום קרבונט על יכולת הנהיגה והשימוש במכונות.

! מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

כל טבליה של צרבת איקס טבליות לעיסה בטעם מנטה מכילה כ-7 מ"ג אספרטם. כל טבליה של צרבת איקס טבליות לעיסה בטעם מלון מכילה כ-4.5 מ"ג אספרטם. אספרטם הינו מקור לפנילאלין, אשר עלול להזיק אם אתה סובל מפניליקטונוריה (PKU), הפרעה גנטית נדירה הגורמת להצטברות כמות גדולה של פנילאלין בגוף, משום שהגוף אינו מסוגל לפנותו כראוי.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעוון למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקבול בדרך כלל למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 הוא:

לעת 2-4 טבליות בעת הופעת התסמינים, או לפי המלצת הרופא.

אין לקחת יותר מ-15 טבליות ב-24 שעות.

אם את בהריון, אין לקחת יותר מ-9 טבליות ב-24 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול - אין להשתמש במנה המקסימלית במשך יותר משבועיים, אלא בהמלצה ובפיקוח של הרופא בלבד.

אין להשתמש בתרופה באם הסימפטומים נמשכים מעלה שבועיים, אלא בהמלצת הרופא.

כתישה/חציה/לעיסה
ניתן לנכוש/ללוועס את הטבליה.

אם נטלה מנת יתר

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

תסמינים של מינון יתר עלולים לכלול: אנורקסיה, צימאון, בחילות, הקאות, עצירות, כאבי בטן, חולשת שריריים, עייפות, הפרעות נפשיות, צימאון יתר, השנתנות יתר, כאב עצומות, הסתיידות בכליות, חצצת כליה ובמקרים חמורים הפרעות בקצב הלב. מינון יתר קיצוני של סידן עלול לגרום לתרדמת ולמוות.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיעזר ברופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהinic נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הinic **זקוק להם**.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לניהול התרופה, הייעזר ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בצרבת איקס טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואאי. יתכן שלא תסבול מכך אפילו ממהן.

עכירות, גדים, בחילות, גיוחקים עלולים להופיע לעתים רחוקות.

**אם הופעה תופעת לואן, אם אחת מתופעות הלואן מחייבת, או כאשר אתה סובל מטופעת לואן
שלא צינה בעלן, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדוח על תופעות לואן למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לואן עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il/) המפנה לטופוף המוקון לדוח על תופעות לואן, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנוע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן באזירה המקורית, במקום יבש, בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C .

6. מידע נוספים:

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
צרבת איקס בטעם מנטה:

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Aspartame, Peppermint flavour

צרבת איקס בטעם מלאן:

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Melangor flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?

צרבת איקס בטעם מנטה:

כל טבליית לעיסה הינה בצבע לבן, עגולה עם גומה ויש לה ריח מנטה אופייני.

צרבת איקס בטעם מלאן:

כל טבליית לעיסה הינה בצבע צהוב-ירוק, עגולה עם גומה ויש לה ריח מלאן אופייני.

האריזה מכילה 36, 36, 3, 6, 12, 18, 24, 1, 2, 3, 6, טבליות לעיסה ארוזות במגשיות.

יתכן שלא כל גדיי האריזות משוקרים.

يقرن/בעל הרישום וכתוותו: נחת תעשיות כימיות בע"מ, הקדמה 3, קריית מלאכי.

עלון זה נערך בתאריך 08/2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות:

מספר רישום צרבת איקס בטעם מנטה: 1311430847

מספר רישום צרבת איקס בטעם מלאן: 1311730850

לשם הפשתות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.