

Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

Название препарата и лекарственная форма:

Царевет Икс - таблетки для жевания со вкусом мяты

Tzarevet X Mint Flavour chewable tablets

Царевет Икс - таблетки для жевания со вкусом дыни

Tzarevet X Melon Flavour chewable tablets

Каждая таблетка содержит: 500 мг карбоната кальция (200 мг биодоступного кальция)

Calcium Carbonate 500 mg (elemental calcium 200 mg)

Кислотонейтрализующая способность на таблетку: 10 мЭкв.

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в пункте 6 («Дополнительная информация»), а также в пункте «Важная информация о некоторых из ингредиентов препарата».

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приёмом препарата.

Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Следует применять препарат в соответствии с изложенным в пункте «Дозировка» данной инструкции. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. При обострении признаков заболевания (симптомов) или отсутствии улучшения в течение 14 дней следует обратиться к врачу. Недопустим прием Царевет Икс одновременно с другими лекарствами, перечисленными в разделе 2 «Взаимодействие лекарственных средств».

1. Показания к применению:

Для облегчения изжоги и повышенной кислотности желудка.

Терапевтическая группа: Антациды.

2. Перед применением препарата:

❗ Не следует пользоваться препаратом в следующих случаях:

- при гиперчувствительности (аллергии) к активному ингредиенту – карбонату кальция или к любому другому компоненту, содержащемуся в лекарстве (перечень приведен в пункте 6);
- при избыточном содержании кальция в крови (гиперкальциемия) или избыточном содержании кальция в моче (гиперкальциурия);
- если вы придерживаетесь диеты с ограничением фосфора (фосфатов);
- при нарушении функции паращитовидных желез;
- при нарушениях функции почек;
- при синдроме Золлингера-Эллисона;
- если вы получаете лечение сердечным гликозидом (например, дигоксин).

❗ Дети и подростки

Данное лекарство не предназначено для детей в возрасте до 12 лет.

❗ Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Если вы принимаете другие лекарственные препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили лечение другим лекарством, сообщите об этом врачу или фармацевту. Это в особенности важно, если вы принимаете:

- диуретики группы тиазидов;
- бисфосфонаты для лечения потери плотности кости;
- тетрациклины и ципрофлоксацин (антибиотики).

Рекомендуется соблюдать интервал в 2-3 часа между приемом данного препарата и других лекарств, принимаемых перорально.

❗ Беременность, грудное вскармливание и фертильность:

Факторов риска для беременных или кормящих женщин, принимавших карбонат кальция в рекомендуемых дозах, не наблюдалось.

Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать данный препарат. См. пункт 3 – «Как использовать препарат?»

❗ Вождение и управление механизмами

Какого-либо влияния приема карбоната

кальция на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не наблюдалось.

❗ Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:

Каждая таблетка Царевет Икс для жевания со вкусом мяты содержит около 7 мг Аспартама.

Каждая таблетка Царевет Икс для жевания со вкусом дыни содержит около 4,5 мг Аспартама.

Аспартам является источником фенилаланина, который может оказать негативное воздействие при фенилкетонурии (PKU) - редком генетическом нарушении, приводящем к скоплению в организме большого количества фенилаланина ввиду нарушения способности к его нормальному выведению.

3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа приема препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Принятая дозировка для взрослых и подростков старше 12 лет:

разжевать 2-4 таблетки при появлении симптомов, либо в соответствии с рекомендацией врача.

Не следует принимать более 15 таблеток за 24 часа.

Беременным женщинам не следует принимать более 9 таблеток за 24 часа.

Не превышать рекомендуемую дозу. Продолжительность курса лечения:

Не следует принимать максимальную дозу свыше двух недель - за исключением случаев, когда длительный прием производится по рекомендации и под наблюдением вашего врача.

Не следует применять препарат, если симптомы не проходят более двух недель - за исключением случаев, когда длительный прием производится по рекомендации врача.

Измельчение/разрезание пополам/жевание

Можно растолочь/разжевать таблетку.

В случае передозировки

В случае передозировки или случайного приема препарата внутрь ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приёмный покой больницы; возьмите с собой упаковку препарата.

Возможные симптомы передозировки: анорексия, жажда, тошнота, рвота, запор,

боли в животе, мышечная слабость, усталость, психические расстройства, чрезмерная жажда, чрезмерное мочеиспускание, боли в костях, кальцификация почек, нефролитиаз (мочекаменная болезнь), в тяжелых случаях – нарушения сердечного ритма. Значительная передозировка кальция может вызвать кому и смерть.

Если вы забыли вовремя принять препарат, не принимайте двойную дозу.

Примите следующую дозу в обычное время и проконсультируйтесь с врачом.

Лекарства нельзя принимать в темноте!

При каждом приёме препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты:

Как и при приёме любого лекарственного препарата, приём таблеток Царевет Икс может привести к побочным эффектам у некоторых потребителей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Запор, метеоризм, тошнота, изредка может возникнуть отрыжка.

В случае появления или обострения какого-либо из побочных явлений, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения: для этого нужно пройти по ссылке «Сообщить о побочных действиях лекарства» на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il) и заполнить онлайн-форму, либо пройти по следующей ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. Как хранить препарат?

Не допустите отравления! Во избежание отравлений данный препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.

Не используйте препарат после истечения срока годности (EXP), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре ниже 25°C.

6. Дополнительная информация:

Помимо действующего вещества препарат содержит также:

Царевет Икс со вкусом мяты:

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Aspartame, Peppermint flavour

Царевет Икс со вкусом дыни:

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Melangor flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake

Внешний вид препарата и содержимое упаковок

Царевет Икс со вкусом мяты:

таблетки для жевания белого цвета круглой формы с углублением, имеют характерный запах мяты.

Царевет Икс со вкусом дыни:

таблетки для жевания желтовато-зеленоватого цвета круглой формы с углублением, имеют характерный запах дыни.

В упаковке содержится 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 таблеток для жевания в блистерной упаковке.

В продаже могут быть представлены не все размеры упаковок.

Владелец регистрационного удостоверения и его адрес: CTS Chemical Industries Ltd. Акидам 3, Кирьят-Малахи.

Данная инструкция была отредактирована 08/2024 в соответствии с предписаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре Министерства здравоохранения:

Царевет Икс со вкусом мяты -

регистрационный номер: 1311430847

Царевет Икс со вкусом дыни -

регистрационный номер: 1311730850

Для простоты и легкости чтения эта инструкция сформулирована в мужском роде. Тем не менее, данный препарат предназначен для представителей обоих полов.

