

**Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

**Название препарата и лекарственная форма:**

**Царевет Икс - таблетки для жевания со вкусом мяты**

**Tzarevet X Mint Flavour chewable tablets**

**Царевет Икс - таблетки для жевания со вкусом дыни**

**Tzarevet X Melon Flavour chewable tablets**

Каждая таблетка содержит: 500 мг

карбоната кальция (200 мг биодоступного кальция)

Calcium Carbonate 500 mg (elemental calcium 200 mg)

Кислотонейтрализующая способность на таблетку: 10 мЭкв.

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в пункте 6 («Дополнительная информация»), а также

в пункте «Важная информация о некоторых из ингредиентов препарата».

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приёмом препарата.**

Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы,

обратитесь к врачу или фармацевту.

Следует применять препарат в соответствии с изложенным в пункте «Дозировка» данной инструкции. Проконсультируйтесь с

фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. При

обострении признаков заболевания (симптомов) или отсутствии улучшения в течение 14 дней следует обратиться к врачу.

Недопустим прием Царевет Икс одновременно с другими лекарствами,

перечисленными в разделе 2 «Взаимодействие лекарственных средств».

**1. Показания к применению:**

Для облегчения изжоги и повышенной кислотности желудка.

**Терапевтическая группа:** Антациды.

**2. Перед применением препарата:**

**❗ Не следует пользоваться препаратом в следующих случаях:**

- при гиперчувствительности (аллергии) к активному ингредиенту – карбонату кальция или к любому другому компоненту, содержащемуся в лекарстве (перечень приведен в пункте 6);
- при избыточном содержании кальция в крови (гиперкальциемия) или избыточном содержании кальция в моче (гиперкальциурия);
- если вы придерживаетесь диеты с ограничением фосфора (фосфатов);
- при нарушении функции паразитовидных желез;
- при нарушениях функции почек;
- при синдроме Золлингера-Эллисона;
- если вы получаете лечение сердечным гликозидом (например, дигоксин).

**❗ Дети и подростки**

Данное лекарство не предназначено для детей в возрасте до 12 лет.

**❗ Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

**Если вы принимаете другие лекарственные препараты, включая**

**препараты, продаваемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили**

**лечение другим лекарством, сообщите об этом врачу или фармацевту.** Это в

особенности важно, если вы принимаете:

- диуретики группы тиазидов;
- бисфосфонаты для лечения потери плотности кости;
- тетрациклины и ципрофлоксацин (антибиотики).

Рекомендуется соблюдать интервал в 2-3 часа между приемом данного препарата и

других лекарств, принимаемых перорально.

**❗ Беременность, грудное вскармливание и фертильность:**

Факторов риска для беременных или кормящих женщин, принимавших карбонат кальция в рекомендуемых дозах, не наблюдалось.

Если вы беременны или кормите грудью,

проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать

данный препарат. См. пункт 3 – «Как использовать препарат?»

**❗ Вождение и управление механизмами**

Какого-либо влияния приема карбоната

кальция на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не наблюдалось.

**❗ Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:**

Каждая таблетка Царевет Икс для жевания со вкусом мяты содержит около 7 мг

Аспартама.

Каждая таблетка Царевет Икс для жевания со вкусом дыни содержит около 4,5 мг

Аспартама.

Аспартам является источником фенилаланина, который может оказать

негативное воздействие при фенилкетонурии (PKU) - редком

генетическом нарушении, приводящем к скоплению в организме большого

количества фенилаланина ввиду нарушения способности к его нормальному выведению.

**3. Как использовать препарат?**

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа приема препарата

проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

**Принятая дозировка для взрослых и подростков старше 12 лет:**

разжевать 2-4 таблетки при появлении симптомов, либо в соответствии с

рекомендацией врача.

Не следует принимать более 15 таблеток за 24 часа.

Беременным женщинам не следует принимать более 9 таблеток за 24 часа.

**Не превышать рекомендуемую дозу. Продолжительность курса лечения:**

Не следует принимать максимальную дозу

свыше двух недель - за исключением случаев, когда длительный прием

производится по рекомендации и под наблюдением вашего врача.

Не следует применять препарат, если

симптомы не проходят более двух недель - за исключением случаев, когда длительный прием

производится по рекомендации врача.

**Измельчение/разрезание пополам/жевание**

Можно растолочь/разжевать таблетку.

**В случае передозировки**

В случае передозировки или случайного приема препарата внутрь ребенком

немедленно обратитесь к врачу или в приёмный покой больницы; возьмите с

собой упаковку препарата.

Возможные симптомы передозировки: анорексия, жажда, тошнота, рвота, запор,

боли в животе, мышечная слабость, усталость, психические расстройства, чрезмерная жажда, чрезмерное мочеиспускание, боли в костях,

кальцификация почек, нефролитиаз (мочекаменная болезнь), в тяжелых случаях – нарушения сердечного ритма.

Значительная передозировка кальция может вызвать кому и смерть.

**Если вы забыли вовремя принять препарат,** не принимайте двойную дозу.

Примите следующую дозу в обычное время и проконсультируйтесь с врачом.

**Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом приёме препарата**

**проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.**

**Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования**

**препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.**

**4. Побочные эффекты:**

Как и при приёме любого лекарственного препарата, приём таблеток Царевет Икс

может привести к побочным эффектам у некоторых потребителей. Не пугайтесь при

чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с

одним из них.

Запор, метеоризм, тошнота, изредка может возникнуть отрыжка.

**В случае появления или обострения**

**какого-либо из побочных явлений, либо проявления иного, не указанного в**

**данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.**

Вы можете сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения; для этого

нужно пройти по ссылке «Сообщить о побочных действиях лекарства» на главной

странице веб-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) и

заполнить онлайн-форму, либо пройти по следующей ссылке:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

**5. Как хранить препарат?**

Не допускайте отравления! Во избежание

отравлений данный препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в

закрытом месте, недоступном для детей и находящемся вне их поля зрения. Не

вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.

Не используйте препарат после истечения срока годности (EXP), указанного на

упаковке. Срок годности относится к последнему дню

указанного месяца.

**Условия хранения:** Хранить в оригинальной упаковке в сухом месте при

температуре ниже 25°C.

**6. Дополнительная информация:**

Помимо действующего вещества препарат

содержит также: **Царевет Икс со вкусом мяты:**

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch

glycolate, Magnesium stearate, Aspartame, Peppermint flavour

**Царевет Икс со вкусом дыни:**

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch

glycolate, Magnesium stearate, Melangor flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake

**Внешний вид препарата и содержимое упаковок**

**Царевет Икс со вкусом мяты:**

таблетки для жевания белого цвета круглой

формы с углублением, имеют характерный запах мяты.

**Царевет Икс со вкусом дыни:**

таблетки для жевания желтовато-зеленоватого цвета круглой формы с

углублением, имеют характерный запах дыни.

В упаковке содержится 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36

таблеток для жевания в блистерной упаковке.

В продаже могут быть представлены не все

размеры упаковок.

**Владелец регистрационного удостоверения и его адрес:** CTS Chemical

Industries Ltd. Акидам 3, Кирьят-Малахи.

Данная инструкция была отредактирована

08/2024 в соответствии с предписаниями

Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер лекарственного

препарата в государственном реестре

Министерства здравоохранения: Царевет Икс со вкусом мяты -

регистрационный номер: 1311430847

Царевет Икс со вкусом дыни -

регистрационный номер: 1311730850

Для простоты и легкости чтения эта

инструкция сформулирована в мужском

роде. Тем не менее, данный препарат

предназначен для представителей обоих

полов.

