

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالنة (مستحضرات)-1986**  
يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

**تاكزيرو**  
**150 ملغ / 1 ملل**

**محلول للحقن تحت الجلد في محقنة جاهزة للاستعمال**

**التركيب:**

تحتوي كل محقنة جاهزة للاستعمال على 150 ملغ لاناديلوماب (lanadelumab 150 mg) في 1 ملل محلول

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر - انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي أو إلى ممرضة الطفل. هذا الدواء وُصف من أجل طفلك أو الطفل الذي تعتني به. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الطبية وحالتهم.

**1. لم أعد هذا الدواء؟**

تاكزيرو معد للاستعمال لدى المتعالجين من عمر سنتين وما فوق لمنع نوبات الوذمة الوعائية المتكررة، لدى المتعالجين الذين لديهم وذمة وعائية وراثية (HAE).

**الفصيلة العلاجية:** مستحضرات أخرى خاصة بمبحث الدم. أدوية تُستعمل لعلاج الوذمة الوعائية الوراثية.

**ما هي الوذمة الوعائية الوراثية (HAE)**

HAE هي حالة تنتقل عبر الوراثة لدى العائلات. في هذه الحالة، لا يحتوي دم المتعالج على كمية كافية من بروتين يدعى "مثبط C1" أو أن البروتين "المثبط لـ C1" لا يعمل بشكل سليم. تؤدي هذه الحالة إلى ارتفاع مستوى كاليكرين البلازما (plasma kallikrein)، الذي يؤدي أيضا إلى إنتاج مستويات عالية من براديكينين (Bradykinin) في دم المتعالج. تسبب مستويات عالية جدا من براديكينين إلى أعراض الوذمة الوعائية (HAE)، مثل تورم وألم في:

- كفتي اليدين والقدمين
- الوجه، الجفنين، الشفتين أو اللسان
- الحنجرة (Throat)، الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس
- الأعضاء التناسلية.

**كيف يعمل تاكزيرو**

تاكزيرو هو نوع من البروتين يعيق نشاط كاليكرين البلازما (plasma kallikrein). تساعد هذه الحالة على تقليل كمية براديكينين في دم المتعالج، وتمنع ظهور أعراض HAE.

**2. قبل استعمال الدواء**

**يُمنع استعمال الدواء إذا:**

- كانت لدى طفلك أو لدى الطفل المتعالج حساسية (أرجية) للمادة الفعالة - لاناديلوماب، أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر قائمة المواد غير الفعالة في البند 6).

**تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء**

- عليك التحدث مع الطبيب، الصيدلي أو مع ممرضة الطفل قبل استعمال تاكزيرو.
- إذا كان لدى الطفل رد فعل تحسسي حاد تجاه تاكزيرو مع أعراض مثل طفح، ضغط في الصدر، صفير أثناء التنفس، أو نبض سريع، أخبر فوراً طبيب، صيدلي أو ممرضة الطفل.

**الأطفال والمراهقون**

لا يوصى باستخدام هذا المستحضر لدى الأطفال دون عمر سنتين لأنه لم يتم بحثه في هذه الفئة العمرية.

**الفحوصات والمتابعة**

أخبر طبيب الطفل إذا كان الطفل يستخدم تاكزيرو قبل أن يخضع لفحوص مخبرية من أجل معرفة فيما إذا كان دمه يتخثر بشكل جيد. وذلك لأن وجود تاكزيرو في دم الطفل قد يؤدي إلى تشويش في فحوصات مخبرية معينة وقد يتسبب وجوده أيضاً بظهور نتائج غير دقيقة.

**التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية**

إذا كان الطفل يتناول أو إذا تناول مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر طبيبه أو الصيدلي بذلك. ليست هناك معلومات تشير إلى أن تاكزيرو يؤثر في أدوية أخرى أو أنه يتأثر بأدوية أخرى.

## الحمل والإرضاع

إذا كانت المتعالجة حاملاً أو مرضعة، تعتقد أنها حامل أو تخطط للحمل، عليها استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء باستعمال تاكزيرو. هناك معلومات محدودة حول أمان استعمال تاكزيرو أثناء الحمل والرضاعة.

لتوخي الحذر، يُفضَّل تجنب استعمال لاناديلوماب أثناء الحمل والإرضاع.

## الإرضاع

لا تتوفر معلومات بخصوص طرح لاناديلوماب في حليب-الأم. تُطرح المستحضرات من هذه الفصيلة في حليب-الأم خلال الأيام القريبة من الولادة، وبعد ذلك ينخفض مستواها. ولذلك لا يمكن استبعاد وجود المستحضر في حليب الأم في الأيام القريبة من الولادة. يمكن استعمال لاناديلوماب أثناء الإرضاع في حالة وجود حاجة سريرية.

## السياقة واستعمال الماكينات

لهذا الدواء لا يوجد تأثير أو تأثيره ضئيل على القدرة على السياقة، ركوب الدراجة الهوائية، اللعب بالقرب من الشارع أو استعمال الماكينات.

## معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل محقنة جاهزة للاستعمال، لهذا يُعتبر "خالياً من الصوديوم".

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

يُسَوَّق تاكزيرو في محاقن جاهزة للاستعمال لمرة واحدة، كمحلول جاهز للاستعمال. يبدأ طبيب خبير بعلاج مرضى HAE بعلاج الطفل، يدير العلاج ويتابعه.

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

### البالغون:

الجرعة الأولية الموصى بها هي 300 ملغ كل أسبوعين. إذا لم تتعرض لنوبة خلال وقت طويل، فقد يُغيَّر الطبيب جرعتك إلى 300 ملغ كل 4 أسابيع، لا سيما إذا كان وزن جسمك منخفضاً.

### المراهقون من عمر 12 إلى 18 سنة:

الجرعة الأولية الموصى بها هي 300 ملغ كل أسبوعين، إذا لم تتعرض لنوبة خلال وقت طويل، فقد يغير طبيبك جرعتك إلى 300 ملغ كل 4 أسابيع، لا سيما إذا كان وزن جسمك منخفضاً.

### من عمر 6 إلى 12 سنة:

الجرعة الأولية الموصى بها هي 150 ملغ كل أسبوعين، إذا لم يتعرض الطفل لنوبة خلال فترة طويلة، فقد يغير الطبيب جرعته إلى 150 ملغ كل 4 أسابيع.

### من عمر 2 إلى 6 سنوات:

الجرعة الموصى بها هي 150 ملغ كل 4 أسابيع.

## كيف يُحقن الدواء

تاكزيرو معد للحقن من قبل مُعالج طبي أو مُعالج الطفل. يجب على مُعالج الطفل أن يقرأ بعناية وأن يتبع التعليمات في البند 7، "تعليمات الاستعمال".

- تاكزيرو معد للحقن تحت الجلد ("حقنة تحت الجلد").
- يمكن إجراء الحقن من قبل الطاقم الطبي أو عن طريق مُعالج الطفل.
- على الطبيب، الصيدلي أو الممرضة أن يوضحوا لك كيف تحضّر وتحقن الدواء بشكل صحيح قبل أن تعطي تاكزيرو للمرة الأولى. لا تحقن الدواء حتى تتلقى إرشاداً حول كيفية حقنه.
- أدخل الإبرة في النسيج الدهني في البطن، الفخذ أو الذراع العلوية.
- احقن الدواء في موقع مختلف في كل مرة.
- استعمال كل محقنة جاهزة للاستعمال من تاكزيرو مرة واحدة فقط.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت أو أعطيت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى من المطلوب من تاكزيرو

إذا حصل الطفل على جرعة مفرطة أو إذا أعطيت الجرعة بوقت أبكر مما أوصى الطبيب، توجّه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحباً معك عبوة الدواء.

## إذا نسيبت تناول أو إعطاء الدواء

إذا تم تفويت جرعة من تاكزيرو، احقن الجرعة في أسرع وقت ممكن، يجب جدولة الجرعة التالية وفقاً للتواتر بحيث يكون:

- الفارق مدته 10 أيام، على الأقل، بين جرعة وأخرى لدى المتعالجين الذين يتلقون جرعة كل أسبوعين.
- الفارق مدته 24 يوماً على الأقل بين جرعة وأخرى لدى المتعالجين الذين يتلقون جرعة كل 4 أسابيع.

إذا لم تكن متأكدًا متى عليك حقن تاكزيرو بعد الجرعة التي قوتها، اسأل الطبيب، الصيدلي أو ممرضة الطفل.

عليك المواظبة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

يجب التحدث مع طبيب الطفل فيما يتعلق بالقرار بإيقاف العلاج بـ تاكزيرو. من المحتمل عودة ظهور الأعراض في فترة إيقاف العلاج.

حتى إذا طرأ تحسن على حالة الطفل الصحية، لا يجوز لك التوقف عن العلاج بهذا الدواء من دون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال تاكزيرو أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا يعاني الطفل من أيٍّ منها.

إذا اختبر الطفل رد فعل تحسسي حاد تجاه تاكزيرو مع أعراض مثل: طفح، ضغط في الصدر، صفير أثناء التنفس، أو نبض سريع، توجه إلى الطبيب فورًا.

أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا اختبرت أنت أو طفلك أعراضًا جانبية من الأعراض المفصلة التالية:

أعراض جانبية منتشرة جدا (قد تظهر لدى أكثر من متعالج واحد من بين 10 مُتعالجين):

- ردود فعل في موقع الحقن - تشتمل الأعراض على ألم، احمرار الجلد، كدمة، انزعاج، تورم، نزيف، حكة، تصلب الجلد، وخز، حُمى في موقع الحقن وطفح.

أعراض جانبية منتشرة (قد تظهر بتواتر حتى مُتعالج واحد من بين 10 مُتعالجين):

- ردود فعل أرجية تشتمل على الحكة، الانزعاج، واللسع في اللسان
- دوخة، الشعور بالإغماء
- طفح جلدي بارز
- ألم في العضلات
- فحوص دم تشير إلى تغييرات في الكبد.

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت أنت أو طفلك من أعراض جانبية لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يُخزّن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
  - لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين**
- يجب التخزين في التلاجة (2°C-8°C). يُمنع التجميد. احتفظ بالمحفنة الجاهزة للاستعمال بعبوة الكرتون الأصلية حفاظًا عليها من الضوء.
  - يمكن تخزين المحفنة الجاهزة للاستعمال بدرجة حرارة أقل من 25°C لفترة محدودة مدتها 14 يومًا، ولكن شريطة ألا تُخزّن بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. لا تُخزّن تاكزيرو في التلاجة ثانية بعد تخزينه بدرجة حرارة الغرفة.
  - عندما تقوم بإخراج محفنة واحدة جاهزة للاستعمال من عبوة تحتوي على عدة محاقن من التلاجة، يجب عليك إعادة المحاقن الأخرى الجاهزة للاستعمال إلى التلاجة إلى حين استعمالها.
  - يجب التخلص من المحفنة الجاهزة للاستعمال إذا لم يتم تخزينها في التلاجة، تم تجميدها أو عدم حفظها في عبوتها الأصلية بحيث تكون محمية من الضوء.
  - يُمنع خض تاكزيرو.
  - يُمنع استعمال هذا الدواء إذا لاحظت علامات تشير إلى أنه طرأت تغييرات على مظهره مثلًا إذ ظهرت جزيئات في المحفنة الجاهزة للاستعمال أو طرأت تغييرات على لون محلول الحقن.
  - يُمنع التخلص من أية أدوية في القمامة المنزلية أو مياه الصرف الصحي. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه الوسائل على الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على مواد غير فعالة:

water for injections, L-histidine, sodium chloride, sodium phosphate dibasic (dihydrate), citric acid monohydrate, polysorbate 80.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

يُسوق تاكزيرو كمحلول صاف، عديم اللون حتى لون مائل إلى الأصفر وهو معد للحقن ضمن محقنة جاهزة للاستعمال.

يمكن أن تحتوي عبوة المستحضر على:

- محقنة واحدة جاهزة للاستعمال (1 ملل/محقنة) في عبوة كرتون
- محقنتان جاهزتان للاستعمال (1 ملل/محقنة) في عبوة كرتون
- رزمة تحتوي على 3 علب كرتون، بحيث تحتوي كل عبوة كرتون على محقنتين جاهزتين للاستعمال (1 ملل/محقنة)، في المجلد 6 محاقن جاهزة للاستعمال.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه: تاكيدا إسرائيل م.ض.، شارع إفعال 25، بيتاح تكفا 4951125.


## 7. تعليمات الاستعمال

قبل حقن تاكزيرو، تأكد من أنك قرأت، فهمت، وتتبع مرحلة تلو الأخرى من التعليمات. اتصل بالطبيب، الصيدلي، أو ممرضة الطفل إذا كانت لديك أية أسئلة.

- يُمنع خضن تاكزيرو.

أجزاء المحقنة الجاهزة للاستعمال تاكزيرو قبل الاستعمال (رسم "أ").

الرسم "أ": محقنة جاهزة للاستعمال من تاكزيرو



## مرحلة 1: التحضير للحقن

أ. خذ ضمادة كحولية، طابخة قطنية/ضمادة شاش، شريط لاصق ووعاء للتخلص من الأغراض الحادة (الرسم "ب"), وضعها جميعها على مسطح نظيف في منطقة مضاءة بشكل جيد. هذه المعدات غير مشمولة في عبوة تاكزيرو.

## الرسم "ب": معدات



- ب. أخرج عبوة تاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال من التلاجة قبل الاستعمال بـ 15 دقيقة.
- يُمنع استعمال محقنة تاكزيرو جاهزة للاستعمال إذا كان ختم ضبط الفتح مفتوحًا أو معطوبًا.
  - الدواء حسّاس لدرجات الحرارة المرتفعة. يُمنع استعمال مصادر تسخين مثل الميكروويف أو ماء ساخن من أجل تسخين المحقنة الجاهزة للاستعمال.



- ج. افتح العبوة. أمسك جسم المحقنة وأخرج محقنة تاكزيرو الجاهزة للاستعمال من الصينية (الرسم "ج").

## الرسم "ج": أخرج المحقنة الجاهزة للاستعمال



- يُمنع إزالة غطاء الإبرة حتى تكون جاهزًا لإجراء الحقن.

- يُمنع لمس أو دفع المكبس حتى تكون جاهزاً لتحقن.
- د. اغسل يديك بالماء والصابون (الرسم "د"). جفف يديك تمامًا.

الرسم "د": غسل اليدين



- يُمنع لمس أي سطح أو أي منطقة من الجسم بعد غسل يديك قبل الحقن.

هـ. افحص تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) الموجود على جسم المحقنة (الرسم "هـ").


يُمنع استعمال محقنة تاكزيرو الجاهزة للاستعمال إذا كان تاريخ الصلاحية قد انقضى. إذا كانت محقنة تاكزيرو الجاهزة للاستعمال قد انتهت صلاحيتها، يجب عليك رميها في وعاء للأغراض الحادة والتوجه إلى الطبيب، الممرضة أو الصيدلي.

الرسم هـ: مكان تاريخ الصلاحية



- افحص المحقنة الجاهزة للاستعمال تاكزيرو لوجود أي علامة لضرر وتأكد من أنّ الدواء عديم اللون حتى لون مائل للأصفر (الرسم "و").
- يُمنع استعمال المستحضر إذا تواجد تلف في المحقنة – مثلاً، تشقق.
- يُمنع استعمال تاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال إذا غيّر الدواء لونه، إذا كان متعكراً أو إذا تواجد داخله رقائق أو جزيئات.
- من المحتمل أن تلاحظ فقاعات داخل المحقنة الجاهزة للاستعمال تاكزيرو. إنها ظاهرة سليمة التي لا تؤثر على الجرعة. إذا لم تتمكن من استعمال المحقنة الجاهزة للاستعمال، توجه إلى الطبيب، الممرضة أو الصيدلي.

## الرسم "و": فحص المحقنة الجاهزة



### المرحلة 2: اختر وحضّر موقع الحقن


أ. يجب تنفيذ الحقن بـ تاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال من قبل الطاقم الطبيّ في داخل المناطق التالية فقط (الرسم "ز"):

- الذراع العلويّة.
  - البطن
  - الفخذ
- يُمنع الحقن داخل منطقة في جسم الطفل التي يكون فيها الجلد مهتاجًا، أحمر، يحتوي على كدمات أو مُصاب بعدوى.
  - موضع موقع الحقن الذي تختاره يجب أن يكون بعيدًا 5 سم، على الأقل، عن أية ندب أو عن سرّة الطفل.

مهم:

يجب الحقن في مواقع حقن مختلفة من أجل الحفاظ على جلدك سليمًا. يجب تنفيذ كل حقنة جديدة بمسافة 3 سم على الأقل عن الموقع السابق الذي حقنت به.

## الرسم "ز": مناطق الحقن



ب. نظف موقع حقنك بضمادة كحولية واسمح للجلد أن يجف تمامًا (الرسم "ح").


- يُمنع التلويح بغرض أو نفخ الهواء على المنطقة النظيفة.
- يُمنع لمس المنطقة النظيفة مرّة أخرى قبل إعطاء الحقنة.

### الرسم "ح": نَظْف مكان الحقن



- ج. أمسك جيدًا في جزئها الأوسط من تاكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال بواسطة يد واحدة وباليد الثانية انزع بلطف غطاء الإبرة. (رسم "ط").
- يُمنع لمس أو دفع المكبس إلى أن تكون جاهزًا للحقن.
  - يُمنع استعمال المحقنة الجاهزة للاستعمال إذا تم إسقاطها وهي بدون غطاء الإبرة.
  - يُمنع استعمال المحقنة إذا تبيّن أن الإبرة قد تضررت أو إذا كانت ملتوية.
  - يُمنع لمس الإبرة أو أن تلامس الإبرة أي شيء.
- قد تلاحظ وجود فقاعات هواء داخل المحقنة الجاهزة للاستعمال تاكزيرو. إنها ظاهرة سليمة. يُمنع القيام بمحاولة إخراج الفقاعات.

### الرسم "ط": انزع غطاء الإبرة



- د. تخلص من غطاء الإبرة في الوعاء للأغراض الحادة.
- يُمنع وضع الغطاء مرة ثانية على الإبرة من أجل تجنب الإصابة من الإبرة.

### المرحلة 3: احقن تاكزيرو


- أ. أمسك المحقنة الجاهزة للاستعمال بيد واحدة مثل قلم رصاص (الرسم "ي").
- امتنع عن لمس الإبرة أو عن دفع المكبس.

الرسم "ي": طريقة إمساك المحقنة الجاهزة للاستعمال



- ب. باليد الثانية، أقرص بلطف طبية جلد، ما يقارب 3 سم، في موقع الحقن النظيف.
- استمر بقرص الجلد حتى الانتهاء من الحقن وإخراج الإبرة (الرسم "ي.أ").


الرسم "ي.أ": أقرص طبية جلد ذات 3 سم



- ج. بحركة واحدة، سريعة وقصيرة، أدخل الإبرة حتى النهاية داخل الجلد بزاوية 45 حتى 90 درجة. احرص على بقاء الإبرة في مكانها (الرسم "ي.ب").

مهم: احقن مباشرة في طبقة الدهون تحت الجلد (الحقن تحت الجلد)


الرسم "ي.ب": أدخل الإبرة



- د. اضغط المكبس ببطء حتى يتوقف (الرسم "ي.ج").

**مهم:** يُمنع اخراج الإبرة حتى يتم حقن الدواء بالكامل وإفراغ جسم المحقنة.  
في نهاية الحقن، يمكنك أن ترى أن السدادة موجودة في نهاية جسم المحقنة (الرسم "ي.د").  
هـ. أخرج الإبرة ببطء مع الحفاظ على المحقنة بزاوية ثابتة. حرر طية الجلد بلطف.

الرسم "ي.ج": ادفع المكبس حتى النهاية



الرسم "ي.د": السدادة في نهاية جسم المحقنة



نهاية جسم المحقنة

سدادة

- و. ضع طابطة قطنية أو ضمادة شاش على موقع الحقن، إذا لزم الأمر، وانتظر مدة 10 ثوانٍ.
- يُمنع فرك منطقة الحقن. من المحتمل ظهور نزيف خفيف لديك في موضع الحقن. هذه ظاهرة سليمة.
  - غطي موقع الحقن بشريط لاصق، إذا كانت حاجة لذلك.

**المرحلة 4: التخلص من محقنة جاهزة للاستعمال**

- تتخلص من تآكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال المستعملة في وعاء للأغراض الحادة فوراً بعد الاستعمال (الرسم "ط.و").
- يُمنع تغطية الإبرة بغطاء وذلك من أجل تجنب خطر الإصابة بالوخز.
- يُمنع إعادة استعمال تآكزيرو محقنة جاهزة للاستعمال أو بأي معدات أخرى المستعملة للحقن.
- يُمنع رمي المحقنة الجاهزة للاستعمال في القمامة المنزلية.
- يُمنع لمس الإبرة.

- **مهم:** يجب الحفاظ على وعاء القمامة الحادة بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال في كل حين.

الرسم "طو": ارم في الوعاء للأغراض الحادة



تم تحديث هذه النشرة وفقا لتعليمات وزارة الصحة في تاريخ: آذار 2024  
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 163-47-35885-00  
لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها، ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.